

ACADEMIA ROMÂNĂ

CONTRIBUȚIUNI

LA

FLORA BUCUREȘTILOR

ȘI A IMPREJURIMILOR

PARTEA IV.

DE

ZACH. C. PANȚU



EXTRAS DIN  
ANALELE ACADEMIEI ROMÂNE  
Seria II.—Tom. XXXIV.  
MEMORIILE SECȚIUNII ȘTIINȚIFICE.

Donațiunea

ION BOGDAN

BUCUREȘTI

LIBRĂRIILE SOCEC & Comp., C. SFETEA și LIBRĂRIA NAȚIONALĂ

VIENA  
GEROLD & COMP.

BERLIN  
R. FRIEDLAENDER & SOHN.

LIPSCA  
O. HARRASSOWITZ.

1912.

32.207.

Prețul 1 leu 60 bani.

**Analele Societății Academice Române. — Seria I :**

Tom. I—XI.—Sesiunile anilor 1867—1878.

**Analele Academiei Române. — Seria II :**

Tom. I—X.—Desbaterile și memoriile din anii 1879—1888.

Indice alfabetic al volumelor din *Anale* pentru 1878—1888.

Tom. XI—XX.—Desbaterile și memoriile Academiei în 1888—1898.

Indice alfabetic al volumelor din *Anale* pentru 1888—1898.

Tom. XXI.—Desbaterile Academiei în 1898—9	2.-
» XXII.—Desbaterile Academiei în 1899—1900	5.-
» XXIII.— <i>Memoriile Secțiunii Științifice</i>	6.-
» XXIII.—Desbaterile Academiei în 1900—1901	12.-
» XXIII.— <i>Memoriile Secțiunii Științifice</i>	5.-
» XXIV.—Desbaterile Academiei în 1901—2	8.-
» XXIV.— <i>Memoriile Secțiunii Științifice</i>	6.-
» XXV.—Desbaterile Academiei în 1902—3	7.-
» XXV.— <i>Memoriile Secțiunii Științifice</i>	5,5
» XXVI.—Desbaterile Academiei în 1903—4	6.-
» XXVI.— <i>Memoriile Secțiunii Științifice</i>	5.-
» XXVII.—Desbaterile Academiei în 1904—5	4.-
» XXVII.— <i>Memoriile Secțiunii Științifice</i>	8.-
Metoda stroboscopică aplicată la studiul comparativ al uterului de rotațiune a două discuri ce se mișcă în sens invers, de <i>D. Negreanu</i>	5.-
Relațiuni între forțele elastice ale vaporilor saturați și temperaturile absolute, de <i>D. Negreanu</i>	—,20
Despre un zăcămint de sulf la Verbilău și considerațiuni generale asupra genezei solfarelor din regiunile subcarpatice, de <i>L. Mrazec</i>	—,20
Aronicum bareense și <i>Goodyera repens</i> în România, de <i>Z. C. Panțu</i>	—,20
Rămășițe de <i>Dinotherium</i> în România găsite încă de pe la începutul secolului trecut, de <i>Gr. Ștefănescu</i>	—,20
Materiale pentru climatologia României. XX. Ploaie extraordinară în Septembrie 1904, de <i>St. C. Hepites</i>	—,20
Insemnătatea istoriei naționale din punctul de vedere militar, de <i>Generalul C. I. Brătianu</i>	—,50
Materiale pentru climatologia României. XXI. Repartițiunea ploii pe districte și pe basenuri în România în anul 1903 st. n., de <i>St. C. Hepites</i>	—,60
Materiale pentru climatologia României. XXII. Elemente climatologice din lustrul 1896—1900, de <i>St. C. Hepites</i>	—,30
Despre pătrunderea unor microbi prin suprafața corpului.—Observațiuni despre malaria în România și combaterea ei, de <i>Dr. V. Babeș</i>	—,20
Materiale pentru sismografia României. XI. Seismele din 1904 st. n., de <i>St. C. Hepites</i>	—,20
Materiale pentru climatologia României. XXIII. Clima anului 1904 st. n. la București-Filaret, de <i>St. C. Hepites</i>	—,20
Studii electrice asupra apelor minerale, de <i>D. Negreanu</i>	—,30
Variațiunea temperaturilor de topire cu presiunea. Relațiuni între temperaturile absolute de topire ale corpurilor și presiuni, de <i>D. Negreanu</i>	—,20
Din «Istoria Igienei». Scriere postumă, de <i>Dr. I. Felix</i>	1,60
Despre limbagiu și afazii, de <i>Dr. G. Marinescu</i>	—,30
Scrierea, turburările ei și grafologia, de <i>Dr. G. Marinescu</i>	—,30
Cercetări asupra prezenței bacililor specifici în faringele bolnavilor de febră tifoidă, de <i>Prof. Dr. M. Manicaticide</i>	—,10
Măsurarea și calcularea lungimii de undă a undulațiunilor luminoase cu o rețea de reflecțiune Rowland, de <i>Max Reinhard</i>	—,10
» XXVIII.—Desbaterile Academiei în 1905—6	5.-
» XXVIII.— <i>Memoriile Secțiunii Științifice</i>	8.-
Incrângătura viermilor. Clasa Annelida. Ordinul Rotifere, de <i>Dr. Leon C. Cosmovici</i>	1,50
Funcțiunile bio-chimice ale stomacului, de <i>Prof. Dr. E. Riegler</i>	—,60
Agricultura la Români. Creșterea albinelor, de <i>P. S. Aurelian</i>	—,30
Asupra variațiunii etaloanelor de masă. (A doua notă), de <i>I. St. Murat</i>	—,20
Suprafețe cu nivel isometric, de <i>Gheorghe Iuga</i>	—,50
Insemnătatea hartei țerii pentru istoria patriei și a neamului, de <i>Generalul C. I. Brătianu</i>	—,60
Observațiuni științifice, de <i>Spiru C. Haret</i>	—,20
Starea actuală a luptei în contra tuberculozei, de <i>Prof. Dr. V. Babeș</i>	—,20
Vallisneria Spiralis și Wolffia Arrhiza în România, de <i>Z. C. Panțu</i>	—,20
Spirochaete Pallida Schaudinn în Sifilisul ereditar. Contribuțiuni la studiul eredității spirilozelor, de <i>Dr. C. Levaditi</i>	—,20
Preciuziunea în cântăriri, de <i>I. St. Murat</i>	—,20

L. I

re 11/

LIBRĂRIE


CONTRIBUȚIUNI  
LA  
FLORA BUCUREȘTILOR  
ȘI A ÎMPREJURIMILOR

3045  
Dublet

DE  
ZACH. C. PANȚU  
Conservator al colecțiilor Institutului Botanic.

PARTEA IV.

Ședința dela 15 Maiu 1912.

B.C.U. Bucuresti  
  
C158337

158337

Din lucrarea noastră intitulată «Contribuțiuni la Flora Bucureștilor și a împrejurimilor» am publicat până acum trei părți. Partea I-a cuprinde plantele din subdespărțământul *Pteridophyta*, iar din subdespărțământul *Angiospermae* numai plantele din clasa *Monocotyledoneae*, în total 22 de familii. Partea a II-a și a III-a cuprind plantele din subclasa *Archichlamydeae*, care este reprezentată în erbariul nostru din Flora regiunii Bucureștilor prin numeroase și interesante specii de plante, grupate în 51 de familii.

În această a IV-a parte din lucrarea noastră publicăm plantele din subclasa *Metachlamydeae* sau *Sympetalae*, care împreună cu subclasa *Archichlamydeae*, publicată deja, formează clasa *Dicotyledoneae*.

Cu *Metachlamydeae*, această a doua și ultima subclasă din vastă și importanta clasă a *Dicotyledoneelor*, se sfârșește prin urmare întregul subdespărțământ al *Angiospermelor*.

Pentru a termina cu studiul plantelor vasculare, cari cresc în regiunea Bucureștilor și a împrejurimilor și cari formează prin ur-

mare Flora acestei regiuni, vom publică în acest memoriu subclasa *Metachlamydeae*, începând cu familia *Primulaceae* și sfârșind cu familia *Compositae*, una dintre cele mai mari și mai interesante familii de plante.

Totalitatea plantelor din subclasa *Metachlamydeae*, reprezentate în erbariul nostru din Flora regiunii Bucureștilor, să urcă la 319 specii, reunite în 127 de genuri, cari constituiesc împreună 22 de familii.

Printre speciile cuprinse în această a IV-a parte din «Contribuțiuni la Flora Bucureștilor și a împrejurimilor», sunt numeroase plante interesante sau rari precum: *Cynoglossum pallidiflorum* GRECESCU., *Anchusa Barrelieri* DC., *Calystegia silvatica* GRISEB., *Phlomis tuberosa* L., *Orobanche ramosa* L., *Cineraria procera* GRISEB. și *Centaurea jurineaefolia* BOISS., etc. etc. Altele sunt plante nouă pentru Flora regiunii Bucureștilor precum: *Scutellaria galericulata* L., *Galeopsis Tetrahit* L., *Elatinoides spuria* WETTSTEIN., *Plantago arenaria* W. et KIT., *Galium Schultesii* VEST., *Galium vernum* SCOP., *Campanula patula* L. var. *flaccida* WALLR., *Eupatorium cannabinum* L., *Aster Tripolium* L. var. *pannonicus* JACQ., *Inula Conyza* DC., *Achillea asplenifolia* VENT., *Achillea crithmifolia* W. et KIT., *Hieracium Auricula* L., *Lactuca muralis* FRESEN. și *Senecio tomentosus* HOST., specie foarte rară, care mai eră cunoscută până acum din Flora României numai din locurile umede dela Galați, pe lângă gura Prutului și din bălțile Dunării din Dobrogea; și în fine *Cuscuta lupuliformis* KROCKER., specie rarisimă, care mai este cunoscută din Flora României numai dela Vârciorova către Porțile-de-fier, indicată de KANITZ și BRÂNDZĂ după SIMONKAI. În fine altele fiind plante nouă pentru Flora României, le publicăm în această lucrare împreună cu descripția lor; astfel sunt: *Veronica Velenovskyi* UECHTR., *Digitalis ferruginea* L. și  $\times$  *Arctium ambiguum* ČELAK.; iar *Anchusa ochroleuca*  $\times$  *italica* NOVA HYBRIDA este descrisă pentru prima oară în lucrarea de față.

Acum după ce am terminat cu studiul sistematic al speciilor ce am întâlnit în numeroasele noastre excursiuni din jurul Bucureștilor, va trebui să completăm mai întâiu acest studiu prin contribuțiuni nouă suplimentare, pentru ca apoi pe baza acestor studii și pe baza studiilor celorlalți botaniști, cari au explorat regiunea noastră, să putem alcătui Flora completă a Bucureștilor și a împrejurimilor, unde fiecare plantă să fie descrisă, eventual și iconografiată, având

în vedere în acelaș timp și studiul vegetațiunii și al distribuțiunii geografice a plantelor, studii de mare importanță pentru agronomie, agrogeologie și dendrologie, căci vegetațiunea spontanee este expresiunea cea mai completă a condițiunilor climaterice.

Plantele enumerate în această publicațiune fac parte din erbariul Florei Bucureștilor și a împrejurimilor, care este proprietatea Muzeului Institutului botanic din București; iar unele specii adunate ca plante vii sau ca semințe, să cultivă în Grădina noastră botanică.

București, *Institutul botanic*, 24 Aprilie 1912.

## 2. *Metachlamydeae.*

(*Sympetalae.*)

### PRIMULACEAE.

***Androsace elongata*** L. Sp. pl. ed. 2. (1763). 1668. KOCH, Syn. ed. 2. 672. DC. Prodr. VIII. 53. LEDEB, fl. ross. III. 20. RCHB. Icon. fl. germ. et. helv. XVII. 46. t. 69. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 583. BOISS. fl. orient. IV. 17. FIEK, Fl. von Schlesien 366. HALLIER, Fl. von Deutschld. XIX. 203. t. 1961. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 919. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 565. PAX und KNUTH, Primulaceae în ENGLER, Das Pflanzenreich, Heft 22, pag. 213. NYMAN, Consp. 606. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 458. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 479. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 409 și Flora Dobrogei 334. GRECESCU, Conspect. fl. României 487 și Suplement 138. *Primula elongata* KRAUSE în LUTZ, J. Sturms Fl. von Deutschld IX. 267, fig. 59 dela pag. 268.

***Aretia elongata*** BUBANI. Prin locuri cu iarbă, pe coaste aride și năσιμοase, nu tocmai frecventă. București, lângă pădurea «Andronache», pe marginea drumului de fier; Pantelimon, lângă gară, pe marginea drumului de fier; Căciulați spre Balotești, pe marginea șoselei spre Căldărușani. ☉. Aprilie—Iulie.

***Lysimachia vulgaris*** L. Sp. pl. ed. I. (1753). 146 și ed. 2. (1762). 209. KOCH, Syn. ed. 2. 667. DC. Prodr. VIII. 65. LEDEB. fl. ross. III. 27. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 464. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XVII. 29. t. 45. fig. II și III. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 591. BOISS. fl. orient. IV. 8. FIEK, Fl. von Schlesien 365. HALLIER, Fl. von Deutschld. XIX. 169. t. 1943. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 925. KRAUSE în LUTZ, J. Sturms Fl. von Deutschld. IX. 246. t. 58. ROUY, Fl. Franc. X. 185. GARCKE, Ill. Fl. von. Deutschld. 568. COSTE, Fl. Franc. II. 536. PAX und KNUTH, Primulaceae în ENGLER, Das Pflanzenreich Heft 22. pag. 303. NYMAN, Consp. 599. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 457. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 475. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 406 și Flora Dobrogei 333. GRECESCU, Conspect. fl. României 486 și Suplement 138. *Lysimachia paludosa* Bmgt. — Vulg. Gălbășoară, Floare-de-lungoare, Gălbinele, Iarba-de-lingoare. — Prin fânețe umede, pe lângă păduri în locuri mlăștinoase, pe malurile umbroase ale apelor, adesea. București, la «Moara-lui-Ciurel» în lunca Dâm-

boviței; Copăceni, pe marginea Argeșului lângă podul de fier al șoselei spre Giurgiu; Chitila, pe marginea pădurii. Mănăstirea Pasărea, pe marginea pădurii «Pustnicu»; Mănăstirea Căldărușani, pe marginea lacului «Căldărușani», abundentă; Mănăstirea Țigănești, pe drumul dintre pădurea Ciolpani și Tâncăbești, în locuri umede frecventă; pe marginea pădurii Țigănești, în locuri umede. 4. Iunie — August.

**Lysimachia punctata** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 147 și ed. 2. (1762). 210. KOCH, Syn. ed. 2. 668. LEDEB. fl. ross. III. 28. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. 29. t. 43. fig. III. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 591. FIEK, Fl. von Schlesien 365. HALLIER, Fl. von Deutschld. XIX. 171. t. 1944. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 925. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld IX. 246 fig. 52. 2. dela pag. 247. COSTE, Fl. Franc. II. 536. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 568. PAX und KNUTH, Primulaceae în ENGLER, Das Pflanzenreich Heft. 22. pag. 267. NYMAN, Consp. 599. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 457. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 475. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 407. GRECESCU, Conspect. fl. României 486 și Suplement 138. PANȚU, Contrib. nouă la Fl. Ceahlăului 31. *Lysimachia punctata* JACQ. apud DC. Prodr. VIII. 65. BOISS. fl. orient. IV. 9. — Vulg. Floare-de-lingoare, Gâlbenele, Iarbă-de-lungoare, Rădăcină-de-lingoare. — Prin tufișuri și prin locurile umede și umbroase din păduri, pe lângă pâraie și mlaștini, adesea. Domnești, Ciutați în dumbravă; Mănăstirea Cernica, în pădurea «Cernica», în lăstari aproape de linia lui Ivan, abundentă și pe locurile umede de pe marginea pădurii, aproape de mănăstire; Mănăstirea Pasărea, pe marginea pădurii Cernica, lângă șoseaua care duce la Brănești; Mănăstirea Căldărușani, pe marginea pădurii Brânzeasca. 4. Iunie—Iulie.

β. **verticillata** BOISS. fl. orient. IV. 9. Folia ovato-oblonga, longius petiolata (petiolo saepe 1 cm. longo), obtusiora. Verticillastri saepe magis multiflori, floribus longius pedicellatis folia floralia saepe excedentibus. — Foile oval-oblonge, mai lung-pețiolate (cu pețiolul adesea de 1 cm. lung), mai obtuse. Verticilele adesea cu mai multe flori, florile mai lung pedunculate întrecând adesea foile florale. — GRECESCU, Conspect. fl. României 486. PAX und KNUTH. l. c. pag. 268. *Lysimachia verticillata* M. BIEB. Fl. Taurico—Cauc. I. 141. și III. 135. DC. Prodr. VIII. 65. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XVII pag. 29. t. 44. fig. I. *Lysimachia verticillata* PALL. apud GRISEB. Spicil. Fl. rumelic. et bithynic. II pag. 6. Mănăstirea Pasărea, în pădurea Pasărea.

**Lysimachia Nummularia** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 148 și ed. 2. (1762). 211. KOCH, Syn. ed. 2. 668. DC. Prodr. VIII. 66. LEDEB. fl. ross. III. 28. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 464. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XVII. 29. t. 43. fig. II. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 592. FIEK, Fl. von Schlesien 365.

HALLIER, Fl. von Deutschld. XIX. 175 t. 1946. COSTE, Fl. Franc. II. 536. ROUY, Fl. Franc. X. 186. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 568. NYMAN, Consp. 599. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 457. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 475. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 407 și Flora Dobrogei 333. GRECESCU, Conspect. fl. României 486. *Lysimachia nummularia* L. BOISS. fl. orient. IV. 9. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 925. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld IX. 248. fig. 52. 3 dela pag. 247. PAX und KNUTH, Primulaceae în ENGLER, Das Pflanzenreich Heft 22. pag. 258. *Nummularia prostrata* OPIZ., *Nummularia repens* GILIB., *Lysimachia suaveolens* SCHOENHEIT. — Vulg. Banu-popii, Drețe, Dumineceà, Duminiță, Galbenele, Gălbenele-de-pădure, Inima-pământului. — Prin locuri umede în păduri, fânețe și tufișuri, adesea. Măgurele, pe locurile umede de pe marginea Sabarului; Ciorogârla, în pădurea «Cotroceanca», abundentă; Tântava, în pădurea de pe malul Sabarului; Malul-Spart, în pădurea «Căscioreanca»; Călugăreni, Crucea-de-piatră, pe locurile umede de pe marginea pădurii «Uzun»; Chitila, pe marginea pădurii; Mănăstirea Pasărea, în pădurea «Pustnicu», abundentă și în pădurea «Pasărea»; Mănăstirea Căldărușani, în pădurea «Căldărușani» spre livadia Pârîta și în pădurea «Brânzeasca»; Mănăstirea Țigănești, pe marginea lacului «Bălteni», lângă pădurea «Ciolpani». 4. Iunie — Iulie.

*Anagallis arvensis* L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 148 și ed. 2 (1762). 211. STURM, Deutschlds Flora Heft 1. (1798). t. 2. KOCH, Syn. ed. 2. 668. DC. Prodr. VIII. 69. LEDEB. fl. ross. III. 29. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 467. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XVII. 26. t. 41. fig. 1. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 593. BOISS, fl. orient. IV. 6. FIEK, Fl. von Schlesien 367. HALLIER, Fl. von Deutschld. XIX. 150. t. 1935. A. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 927. COSTE, Fl. Franc. II. 538. ROUY, Fl. Franc. X. 180. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 569. PAX und KNUTH, Primulaceae în ENGLER, Das Pflanzenreich, Heft 22. pag. 322. NYMAN, Consp. 601. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 457. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 476. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române. 408 și Flora Dobrogei 333. GRECESCU, Conspect. Fl. României 487 și Supplement 138. *Anagallis phoenicea* LAMK. KRAUSE, în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. IX. 252. t. 60. fig. 1. *Anagallis phoenicea* SCOP. Fl. Carn. ed. 2. I. (1772). 139. *Anagallis mas* VILL. — Vulg. Scânteuță, Scânteoară, Intiță, Ochișor, Rocoină, Scilipeți. — Prin locuri cultivate, pe lângă drumuri, prin păduri și tufișuri, în poieni și pe marginea pădurilor, adesea. Domnești, Ciutați în dumbravă; Călugăreni, Crucea-de-piatră, pe marginea pădurii Uzun; Oltenița, pe marginea șoselei București-Oltenița; Mănăstirea Cernica, în pădurea «Cernica»; Mănăstirea Căldărușani, pe marginea pădurii «Brânzeasca»; Mănăstirea Țigănești, pe marginea pădurii «Ciolpani». ☉. Iunie — Septemvrie,



## PLUMBAGINACEAE.

**Statice Gmelini** WILLD. apud KOCH, Syn. ed. 2. 684. DC. Prodr. XII. 645. LEDEB. fl. ross. III. 460. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XVII, 62. t. 90. fig. II. BOISS. fl. orient. IV. 859. HALLIER, Fl. von Deutschld. XIX. 272. t. 1992. NYMAN, Consp. 609. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 462. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 481. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. Fl. române 413 și Flora Dobrogei 337. GRECESCU, Conspect. fl. României 485 și Suplement 137. *Statice scoparia* PALL., *Statice pseudolimonium* SCHUR., *Goniolimon speciosum* JANKA.—Vulg. Garofița-de-mare, Garofița-mării, Limba-boului, Limba-peștelui, Sică.—Prin fânețele umede și pe locurile mlăștinoase și sărate. Comana, prin fânețele umede de pe marginea râului Neajlov, întinzându-se până spre Grădiște. 4. Iulie—Septemvrie.

## OLEACEAE.

**Fraxinus excelsior** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 1057 și ed. 2. (1763). 1509. STURM, Deutschlds Flora Heft 44. t. 7. KOCH, Syn. ed. 2. 554. DC. Prodr. VIII. 276. LEDEB. fl. ross. III. 36. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 471. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XVII. 19. t. 31. fig. III—VI. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 470. BOISS. fl. orient. IV. 39. FIEK, Fl. von Schlesien 296. HALLIER, Fl. von Deutschld. XVI. 62. t. 1533. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 931. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. X. 44. t. 3. COSTE, Fl. Franc. I. 279. ROUY, Fl. Franc. IV. 142. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 574. DIPPEL, Handb. Laubholzkunde I. 82. KOEHNE, Deutsche Dendrologie 513. NYMAN, Consp. 495. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 393. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 378. BRÂNDZĂ, Prodr. Fl. române 340. GRECESCU, Conspect. fl. României 394.—Vulg. Frasin, Frasan.—Prin păduri în locuri umede, mai cu samă în lunci, adesea. Chitila, în pădure prin locurile umede de pe marginea Colentinei; Ciocănești, în pădurea «Popeasca»; Călugăreni, Crucea-de-piatră, în pădurea «Crucea-de-piatră». 5. Aprilie.—Maiu.

**Ligustrum vulgare** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 7 și ed. 2. (1762). 10. STURM, Deutschlds Flora Heft 14. t. 1. KOCH, Syn. ed. 2. 554. DC. Prodr. 293. LEDEB. fl. ross. III. 39. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 475. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XVII. 22. t. 33. fig. I și II. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 469. BOISS. fl. orient. IV. 37. FIEK, Fl. von Schlesien 296. HALLIER, Fl. von Deutschld. XVI. 56. t. 1531. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 932. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. X. 42. t. 1. COSTE, Fl. Franc. II. 541. ROUY, Fl. Franc. X. 220. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 573.

DIPPEL, Handb. Laubholzkunde I. 121. KOEHNE, Deutsche Dendrologie 501. NYMAN, Consp. 494. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 392. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 378. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 339 și Flora Dobrogei 266. GRECESCU, Conspect. fl. României 393. — Vulg. Lemn-cânesc, Lemnu-cânelui, Măliniță, Mălin-negru. — Arbust comun prin păduri, mai cu samă spre margini. *Ligustrum vulgare* L. constituie, adesea împreună cu mici arbori și cu alți arbuști, tufișuri și crânguri. Ciorogârla, în pădurea «Cotroceanca»; Călugăreni, Crucea-de-piatră în pădurea «Uzun»: Budești, în pădurea de pe marginea râului Argeș: Mănăstirea Cernica, în pădurea «Cernica»; Mănăstirea Pasărea, în pădurea «Pustnicu» și în pădurea «Pasărea», frecvent; Mănăstirea Căldărușani, pe marginea pădurii spre livadia «Pârîta» și pădurea «Brânzeasca». Ț. Maiu—Iunie.

Lemnul-cânesc este adesea cultivat prin parcuri și grădini pentru a formă garduri vii.

#### GENTIANACEAE.

**Erythraea Centaurium** PERS. apud KOCH, Syn. ed. 2. 566. GRISEB. în DC. Prodr. IX. 58. LEDEB fl. ross. III. 49. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 483. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XVII. 12. t. 20. fig. I. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 480. BOISS. fl. orient. IV. 68. FIEK, Fl. von Schlesien 302. HALLIER, Fl. von Deutschld. XVI. 176. t. 1570. COSTE, Fl. Franc. II. 554. ROUY, Fl. Franc. X. 237. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 582. NYMAN, Consp. 501. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 384. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 160 și Flora Dobrogei 272. GRECESCU, Conspect. fl. României 401 și Suplement 115. *Erythraea centaurium* PERS. apud KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. X. 13. t. 6. *Erythraea Centaurium* L. sub. *Gentiana* apud SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 399. *Centaurium umbellatum* GILIB. apud BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 935. *Gentiana Centaurium* L.  $\alpha$ . *Chironia Centaurium* WILLD. apud STURM, Deutschlds Flora, Heft 12. t. 3. — Vulg. Cintaură, Fierea-pământului, Floare-de-friguri, Frigurică, Potroacă, Țintaură. — Prin poieni și pe marginea pădurilor în fânețele umede, adesea. Ciorogârla, în pădurea «Cotroceanca»; Malul-Spart, în pădurea «Căscioreanca»; Domnești, Ciutați în dumbravă; Măgurele, pe locurile umede de pe marginea Sabarului; Comana, pe marginea pădurii; Mănăstirea, Cernica, în poieni și pe locurile umede de pe marginea pădurii «Cernica», frecventă; Mănăstirea Pasărea, în pădurea «Cernica» spre șoseaua ce duce la Brănești și în pădurea «Pasărea», abundentă; Mănăstirea Căldărușani, pe marginea pădurii «Brânzeasca», frecventă; Mănăstirea Țigănești, pe marginea

pădurii Ciolpani și pe drumul dintre pădurea Ciolpani și Tâncăbești. ☉.  
Iunie — August.

**Erythraea ramosissima** PERS. Syn. I. (1805). 283. GRISEB. în DC. Prodr. IX. 57. RCHB. Icon. fl. germ. et. helv. XVII. 13. t. 20. fig. V. BOISS. fl. orient. IV. 67. FIEK. fl. von Schlesien 302. ROUY, Fl. Franc. X. 243. GILG. în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. 2. Abt. pag. 73. GRECESCU, Conspect. fl. României 401 și Supplement 115. VLĂDESCU, Contribuțiuni la Flora României în Buletinul Erbarului Institutului botanic din București No. 1 (1901). pag. 166. *Erythraea pulchella* FRIES. apud KOCH, Syn. ed. 2. 567. LEDEB. fl. ross. III. 50. NEILR. fl. von Nieder-Oesterreich 481. HALLIER, Fl. von Deutschld. XVI. 182. t. 1572. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 582. NYMAN, Consp. 592. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 386. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 160 și Flora Dobrogei 272. *Erythraea pulchella* HORN. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 483. COSTE, Fl. Franc. II. 553. *Erythraea pulchella* SW. apud SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 399. *Centaurium inapertum* RAFN. apud BECK, Fl. von Nieder-Österreich 934. *Gentiana Centaurium* β. L., *Gentiana ramosissima* VILL., *Chironia inaperta* WILLD. — Vulg. Cintaură, Fiereea-pământului, Frigurică, Țintaulă. — Prin fânețe și poieni umede, în lunci pe matca râurilor, adesea. Călugăreni, Crucea-de-piatră în lunca Călniștei, frecventă; Comana, spre Grădiștea prin fânețele umede; Oltenița, lângă pădurea de pe marginea Dunării, aproape de gura Argeșului, în năsip. ☉. Iulie—August.

**Gentiana Pneumonanthe** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 228 și ed. 2. (1762). 330. STURM, Deutschlds Flora Heft 30. t. 4. KOCH, Syn. ed. 2. 561. DC. Prodr. IX. 111. LEDEB. fl. ross. III. 66. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 491. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XVII. 9. t. 10. fig. II. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 476. BOISS. fl. orient. IV. 74. FIEK, Fl. von Schlesien 300. HALLIER, Fl. von Deutschld XVI. 115. t. 1548. COSTE, Fl. Franc. II. 563. ROUY, Fl. Franc. X. 261. GARCKE, Ill. Fl. von. Deutschld. 579. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 396. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 381. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 159. GRECESCU, Consp. fl. României 398. *Gentiana pneumonanthe* L. apud BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 937. KRAUSE în LUTZ, Sturms fl. von Deutschld. X. 22. t. 9. NYMAN, Consp. 498. Prin tufișe și fânețe umede. Periș, pe locurile umede de lângă gară. (legit A. PROCOPIANU). 4. Iulie-Septemvrie.

**Menyanthes trifoliata** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 145 și ed. 2. (1762). 208. KOCH, Syn. ed. 2. 558. DC. Prodr. IX. 137. LEDEB. fl. ross. III. 76. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 497. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XVII. 1. t. 2. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 482. BOISS. fl. orient. IV. 64. FIEK, Fl. von Schlesien 298. HALLIER, Fl. von Deutschld. XVI. 80 t. 1536. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 942. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld.

X. 9. t. 4. COSTE, Fl. Franc. II. 566. ROUY, Fl. Franc. X. 272. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 575. NYMAN, Consp. 503. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 394. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 386. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 161. GRECESCU, Conspect. fl. României 396 și Suplement 112. — Vulg. Trifoiște, Trifoiu-amar, Trifoiu-de-baltă, Trifoiu-de-lac, Trei-frați.—Prin livezi umede, în mlaștini, bălți și prin lacuri, nu tocmai frecventă. București, în mlaștinile de sub cimitirul «Șerban-Vodă» (Belu), crește în abundență împreună cu *Aspidium Thelypteris* sw. 4. Aprilie—Maiu.

**Limnanthemum nymphaeoides** LINK. apud GILG în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. 2 Abteilung, pag. 108. ENGLER, Syllabus (1904). 184. HALLIER, Fl. von Deutschld. XVI. 84. t. 1537. GARCKE, III, Fl. von Deutschld. 574. *Limnanthemum Nymphaeoides* LINK. apud FIEK, Fl. von Schlesien 298. *Limnanthemum Nymhoides* LINK. apud KOCH, Syn. ed. 2. 558. DC. Prodr. IX. 138. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 497. *Limnanthemum nymphoides* LINK. apud LEDEB. fl. ross. III. 77. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XVII. 1. t. 1. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 161 și Flora Dobrogei 271. GRECESCU, Conspect. fl. României 397 și Suplement 113. *Limnanthemum nymphoides* HOFFM. et LINK. apud NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 482. *Limnanthemum nymphoides* L. sub *Menyanthe* apud BOISS. fl. orient. IV. 65. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 394. *Limnanthemum pellatum* GMEL. apud BECK, Fl. von Nieder-Österreich 942. NYMAN, Consp. 503. COSTE, Fl. Franc. II. 565. ROUY, Fl. Franc. X. 273. *Menyanthes Nymphoides* L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 145 și ed. 2. (1762). 207. *Menyanthes nymphoides* L. apud KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. X. 10. t. 5 *Villarsia nymphoides* VENT. — Vulg. Plutică. — Prin apele stagnante și lin curgătoare, adesea. București, la «Moara-lui-Ciurel» prin bălțile de pe marginea Dâmboviței; în lacurile Floreasca și Teiu, ambele formate de Valea Colentinei, abundență; Călugăreni, prin bălțile de pe marginea râului Neajlov; Comana, în apa Neajlovului, abundență. 4. Iulie—August.

#### APOCYNACEAE.

**Vinca herbacea** W. et KIT. Descr. et. icon. pl. rar. Hung. I. (1802). 8. t. 9. KOCH, Syn. ed. 2. 557. DC. Prodr. VIII. 383. LEDEB. fl. ross. III. 42. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XVII. 14. t. 22. fig. I. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 471. BOISS. fl. orient. IV. 45. HALLIER, Fl. von Deutschld. XVI. 197. t. 1578. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 944. SCHUMANN în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. 2 Abteilung 145. NYMAN, Consp. 497. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 393. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 380. BRÂNDZĂ, Prodr. Fl. române 366 și Flora Dobrogei 270. GRECESCU, Conspect. fl. Ro-

măniei 396 și Supplement 112. — Vulg. Borbănoc, Brăbănoc, Cununiță, Foaie-în-fir, Foiofoiu, Fonchiu, Merișor, Saschiu. — Prin livezi, locuri cu iarbă, pe coaste uscate, pe marginea pădurilor în tufișuri, adesea. Călugăreni, Crucea-de-piatră, pe marginea pădurii «Uzun», abundentă; Comana, prin tufișurile de pe marginea pădurii și prin rărișuri și poieni, frecventă; Mănăstirea Pasărea, pe marginea pădurii «Cernica», lângă șoseaua ce duce la Brănești și prin tufișurile de pe marginea pădurii «Pasărea», abundentă; Moara-Săracă, prin rărișuri și pe marginea pădurii «Brânzeasca». 4. Aprilie—Maiu.

#### ASCLEPIADACEAE.

**Vincetoxicum officinale** MOENCH. apud DC. Prodr. VIII. 524. LEDEB. fl. ross. III. 45. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 480. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XVII. 17. t. 26. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 472. BOISS. fl. orient. IV. 54. FIEK, Fl. von Schlesien 297. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 945. COSTE, Fl. Franc. II. 548. ROUY, Fl. Franc. X. 229. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 583. NYMAN, Consp. 496. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 366 și Flora Dobrogei 268. GRECESCU, Conspect. fl. României 395. *Cynanchum Vincetoxicum* R. BR. apud KOCH, Syn. ed. 2. 555. HALLIER, Fl. von Deutschld. XVI. 203. t. 1581. *Cynanchum Vincetoxicum* PERS. apud SCHUMANN în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. 2. Abteilung 252. *Asclepias Vincetoxicum* L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 216 și ed. 2. (1762). 314. STURM, Deutschlds Flora Heft 9. t. 8. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. X. 37. t. 13. — Vulg. Brilioancă, Iarba-fiarelor, Iarba-fierului, Rânduniță. — Prin păduri, în fânețe și prin tufișurile de pe coastele pietroase, adesea. Domnești, Ciutați în dumbravă; Călugăreni, Crucea-de-piatră în pădurea «Uzun» și în pădurea «Crucea-de-piatră». Comana, în pădure, frecvent; Mănăstirea Pasărea în pădurea «Pustnicu» și în pădurea «Pasărea», adesea; Mănăstirea Căldărușani, prin poienile și pe marginea pădurii «Brânzeasca», abundentă. 4. Maiu—Iulie.

#### CONVOLVULACEAE.

**Calystegia sepium** R. Br. Prodr. Fl. Holl. I. 483. apud DC. Prodr. IX. 433. LEDEB. fl. ross. III. 94. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XVIII. 83. t. 139. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich. 530. GARCKE, III. fl. von Deutschld. 584. NYMAN, Consp. 504. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 387. *Calystegia sepium* L. sub *Convolvulo* apud BOISS. fl. orient. IV. 111. ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV Teil. Abteilung 3. a. pag. 36. *Convolvulus sepium* L. Sp. pl.

ed. 1. (1753). 153 și ed. 2. (1762). 218. STURM, Deutschlds Flora Heft 1. t. 3. KOCH, Syn. ed. 2. 568. exclus. syn. w. et KIT. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 500. FIEK, Fl. von Schlesien 303. HALLIER, Fl. von Deutschld. XVI. 211. t. 1584. COSTE, Fl. Franc. II. 571. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. XI. 10. t. 1. ROUY, Fl. Franc. X. 346. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 400. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 367 și Flora Dobrogei 273. GRECESCU, Conspect. fl. României 418 și Suplement 120. *Volvulus sepium* BECK. Fl. von Nieder-Österreich 947. — Vulg. Cupa-vacii, Holbură, Volbură, Volbură-mare, Volbură-de-garduri. — Pe lângă garduri, în tufișuri, prin păduri umede, pe marginea râurilor, adesea. Măgurele, pe locurile umede de pe marginea Sabarului în tufișuri de Salcie; Călugăreni, Crucea-de-piatră, în pădurea «Crucea-de-piatră», pe locurile umede dela «Șipot»; Comana, pe marginea pădurii; Budești, în pădurea de pe marginea râului Argeș; Oltenița, în pădurea de pe marginea Dunării, aproape de gura Argeșului, abundentă; Chitila, pe marginea pădurii, în locuri umede; Mănăstirea Snagov, cătunul Fundu pe insulă. 4. Iulie—Septemvrie.

*Calystegia silvatica* GRISEB. Spicileg. Florae rumelicæ et bithynicæ II. (1844). 74. RCHB. Icon. Fl. germ. et helv. XVIII. 84. t. 140. *Calystegia silvatica* CHOISY în DC. Prodr. IX. 433. NYMAN, Consp. 504. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 387. *Calystegia silvatica* w. et KIT. sub *Convolvulo* apud BOISS. fl. orient. IV. 111. ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. Abteilung 3. a. pag. 36. *Convolvulus silvaticus* w. et KIT. Descr. et icon. pl. rar. Hung. III. (1812). pag. 290. t. 261. HEUFF. Enum. pl. Banat.-Temes. (1858). pag. 124. NEILR. Diagn. pag. 85. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 400. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 368. GRECESCU, Conspect. fl. României 418. *Calystegia silvestris* Röm. et. Schult. apud LEDEB. fl. ross. III. 93. *Volvulus sepium*  $\beta$ . *silvestris* WILLD. apud BECK, Fl. von Nieder-Österreich 947. — Vulg. Cupa-vacii, Volbură, Volvură. — Prin tufișuri și păduri, nu tocmai frecventă. Călugăreni, Crucea-de-piatră în pădurea «Uzun» și în pădurea «Crucea-de-piatră»; Comana, prin pădure adesea. 4. Maiu—Iunie.

*Convolvulus arvensis* L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 153 și ed. 2. (1762). 218. KOCH, Syn. ed. 2. 569. DC. prodr. IX. 406. LEDEB. fl. ross. III. 91. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 500. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XVIII. 82. t. 136. fig. III. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 530. BOISS. fl. orient. IV. 108. FIEK, Fl. von Schlesien 303. HALLIER. Fl. von Deutschld. XVI. 217. t. 1586. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 947. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. XI. 8. fig. 1. COSTE, Fl. Franc. II. 571. ROUY, Fl. Franc. X. 347. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 584. NYMAN, Consp. 506. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 400. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 388. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 368 și Flora Dobrogei 274. GRECESCU, Conspect. fl. României 418. — Vulg.

Cămașa-lui-Dumnezeu, Forfecari, Holbură, Poala-Maicei-Domnului, Poala-rânduniceii, Rochița-rândunelei, Volvură, Volbură. — Pe locuri cultivate și inculte, prin arături, grădini, pe lângă drumuri, comună. Mănăstirea Căldărușani, în livadia «Pârîta» și pe marginea drumului spre Moara-Săracă; Oltenița, pe marginea șoselei spre București, frecventă. 4. Iunie—August.

*Cuscuta europaea* L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 124 și ed. 2. (1762). 180. STURM, Deutschl. Flora Heft 10. t. 12. KOCH, Syn. ed. 2. 569. GREINER, GODR. Fl. Franc. II. 504. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 531. BOISS. fl. orient. IV. 117. FIEK, Fl. von Schlesien 304. HALLIER, Fl. von Deutschld. XVI. 223. t. 1589. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 948. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. XI. 13. t. 2. COSTE, Fl. Franc. II. 574. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 585. NYMAN, Consp. 507. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 400. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 389. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. II. 310. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 368 și Flora Dobrogei 275. GRECESCU, Conspect. fl. României 419 și Supplement 121. *Cuscuta major* DC. Prodr. IX. 452. RCHB. Icon. fl. germ. et. helv. XVIII. 86. t. 141. fig. IV. ROUY, Fl. Franc. X. 355. — Vulg. Borangie, Iniță, Iriță, Întorțiel, Lipici, Părul-Sft.-Mării, Steagul-zânelor, Tortel, Torțiel, Turtel. — Prin tufișuri, dundaie sau bălării parazită pe: Urzici, Căneapă, Hemeiu, pe Boz și pe alte plante, adesea. Călugăreni, Crucea-de-piatră în pădurea «Crucea-de-piatră», pe *Arctium minor* SCHRANK și pe *Ballota nigra* L. ☉. Iulie—August.

*Cuscuta Epithymum* L. apud KOCH, Syn. ed. 2. 569. GREINER, GODR. Fl. Franc. II. 504. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 531. BOISS. fl. orient. IV. 115. HALLIER, Fl. von Deutschld. XVI. 226. t. 1590. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 585. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 400. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 368 și Flora Dobrogei 275. GRECESCU, Conspect. fl. României 419 și Supplement 120. *Cuscuta epithymum* L. apud BECK, Fl. von Nieder-Österreich 949. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. XI. 13. Halácsy, Conspect. Fl. Graec. II. 311. *Cuscuta Epithymum* SMITH. apud RCHB. Icon. fl. germ. et. helv. XVIII. 86. t. 142. fig. III. *Cuscuta Epithymum* MURR. apud FIEK, Fl. von Schlesien 304. ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV Teil. Abteilung 3. a. pag. 39. NYMAN, Consp. 507. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 388. COSTE, Fl. Franc. II. 575. ROUY, Fl. Franc. X. 356. *Cuscuta europaea* β. *epithymum* L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 124 și ed. 2. (1762). 180. *Cuscuta minor* DC. Prodr. IX. 453. — Vulg. Borangie, Barba-dracului, Iniță, Iriță, Întorțiel, Lipiciu, Tortel, Turtel. — Prin livezi, fânețe, pe marginea pădurilor, prin poieni și rășișuri, adesea parazită pe specii de *Thymus*, *Trifolium*, *Genista*, *Cytisus*, etc. Mănăstirea Căldărușani, prin poieni, rășișuri și pe marginea pădurii «Brânzeasca», abundentă, parazită pe *Cytisus pallidus*

KERN. pe *Medicago falcata* L. și pe *Brunella alba* PAL.; Călugăreni, Crucea-de-piatră în pădurea «Uzun» pe *Cytisus*. ☉. Iulie—August.

*Cuscuta lupuliformis* KROCKER. Fl. Silesiaca I. (1787). pag. 261. t. 36. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XVIII. 85. t. 142. fig. I. ENGELMANN, Generis Cuscutae species secundum ordinem systematicum dispositae pag. 78. BOISS. fl. orient IV. 122. FIEK, Fl. von Schlesien 305. HALLIER, Fl. von Deutschld. XVI. 229. t. 1591. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 948. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. XI. 16. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 585. ENGLER, Nat. Pflanzenfamillien IV. Teil. Abteilung 3. a. pag. 39. NYMAN, Consp. 507. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 401. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 369. *Cuscuta monogyna* NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 532. și a altor autori, non VAHL, cnf. ENGELMANN l. c. Prin tufișurile de pe marginea râurilor parazită pe specii de *Salix*, *Populus* și pe alte plante. Oltenița, în tufișurile din pădurea de pe marginea Dunării, aproape de gura Argeșului, parazită pe *Rubus caesius* L, pe *Trifolium supinum* SAVI, etc. ☉. Iulie—August.

*Cuscuta lupuliformis* KROCKER. diferă de congenera sa *Cuscuta monogyna* VAHL., cu care a fost adesea confundată de mulți autori, mai cu samă prin stilul mult mai lung decât stigmatul globulos sau oval și adânc bilobat. ENGELMANN între altele zice în l. c.: «squamae breves, tubi inferiori parti adnatae, bifidae aut ad alas laterales crenulatas reductae; ovarium ovale, conicum, in stylum gracilem, stigmatate globoso aut ovali profunde bilobo multo longiorem attenuatum». La *Cuscuta monogyna* VAHL. stilul este foarte scurt și de aceeaș lungime cu stigmatul subglobulos și bilobat.

*Cuscuta lupuliformis* KROCKER. este o plantă rară, căci până acum n'a mai fost citată din România decât de DR. D. BRÂNDZĂ dela Vârciorova către Porțile de fier, parazită pe Soc (*Sambucus nigra*). Tot din această localitate și tot parazită pe *Sambucus nigra* este amintită și de AUGUST KANITZ în «Plantas Romaniae hucusque cognitae» la pag. 80. Dar nici BRÂNDZĂ, nici KANITZ n'au găsit ei înșiși planta, ci o citează numai după *Simkovics Lajos* în «Bánsági s Hunyadmegyeyi útazásom 1874-ben, Budapest 1878. Math. és természett közlem. vonatkozólag a hazai viszonyokra. Kiadja a Magy. Tud. Akad. math. és természett. állandó bizotts. XV. köt. p. 479—624», la pag. 581. Prin urmare constatarea acestei interesante și rari plante parazite la Oltenița este importantă, căci prin aceasta se confirmă pe deplin existența ei în România, indicându-se în acelaș timp și o nouă localitate în apropierea Bucureștilor.

*Cuscuta lupuliformis* KROCKER. crește prin Germania ostică și sudostică până la Oder, în Bohemia, Austria, Ungaria, Transilvania, în Serbia și prin Rusia meridională, etc.; iar *Cuscuta monogyna* VAHL., înrudită foarte mult



cu specia precedentă, este răspândită din Europa sudică prin Asia centrală în direcție sudostică. Este interesant faptul că la noi în România să întâlnească ambele aceste specii, căci într'adevăr botaniștii noștri indică pe *Ouscuta mongyna* VAHL. în Dobrogea, ba GRECESCU o indică și la Mizil pe dealurile dela Malul-Spart; cnf. GRECESCU, Suplement 121.

#### BORRAGINACEAE.

**Heliotropium europaeum** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 130 și ed. 2. (1762). 187. KOCH, Syn. ed. 2. 571. DC. Prodr. IX. 534. LEDEB. fl. ross. III. 99. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XVIII. 53. t. 93. fig. II. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 516. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 539, BOISS. fl. orient. IV. 130. LINDEMANN, Flora Chersonensis II. 16. HALLIER, Fl. von Deutschld. XIX. 23. t. 1881. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 959. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. XI. 30. COSTE, Fl. Franc. II. 609. ROUY, Fl. Franc. X. 276. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 588. GÜRKE, în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. Abteilung 3 a. pag. 94. NYMAN, Consp. 508. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 401. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 389. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. II. 316. BRÂNDZĂ, Prodr. Fl. române 369 și Flora Dobrogei 278. GRECESCU, Conspect. fl. României 403 și Suplement 115. — Vulg. Ochiu-soarelui, Vanilie-de-câmp, Vanilie-sălbatică. — Pe câmpuri, pe lângă garduri, prin locuri cultivate și năsiptoase, pe marginea drumurilor, adesea. Călugăreni, pe marginea șoselei; Comana, spre Grădiște pe câmp pe lângă grâne și pe marginea drumului de fier spre gara Mihaiu-Bravul; Oltenița, pe marginea șoselei spre București; Pantelimon, în plantația de Salcâmi la despărțirea drumului spre Mănăstirea Cernica; Mănăstirea Căldărușani, pe marginea drumului spre «Moara-Săracă». ☉. Iunie—August.

**Cynoglossum officinale** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 134. ed. 2. (1762). 192. STURM, Deutschlds Flora Heft 9. (1801). t. 7. KOCH, Syn. ed. 2. 572. DC. Prodr. X. 146. LEDEB. fl. ross. III. 165. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 536. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XVIII. 77. t. 129. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 517. BOISS. fl. orient. IV. 264. FIEK, Fl. von Schlesien 306. HALLIER, Fl. von Doutschld. XIX. 31. t. 1885. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 961. KRAUSE în LUTZ Sturms Fl. von Deutschld. XI. 37. t. 3. COSTE, Fl. Franc. II. 605. ROUY, Fl. Franc. X. 338. GARCKE, III. fl. von Deutschld. 589. GÜRKE în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV Teil. Abteilung 3 a. pag. 102. NYMAN, Consp. 521. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 402. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 403. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 371 și Flora Dobrogei 285. GRECESCU, Conspect. fl. României 413 și Suplement 117. — Vulg. Arăriel, Arățiel, Limba-cânelui. — Prin locuri incolte sterile și pietroase, pe coline

uscate, pe lângă garduri și pe marginea drumurilor, adesea. București, la «Moara-lui-Ciurel» prin lunca Dâmboviței; Ciorogârla, prin rărișurile și pe marginea pădurii Cotroceanca; Chitila, pe marginea drumului, pe lângă pădure, frecvent; Mănăstirea Cernica, pe câmp aproape de localitatea «La-Anini» și pe marginea pădurii «Cernica», adesea; Mănăstirea Pasărea, în pădurea «Cernica» și pe marginea pădurii «Pasărea»; Mănăstirea Căldărușani, pe marginea drumului; Mănăstirea Țigănești, în pădurea «Ciolpani» și pe marginea pădurii «Țigănești», aproape de satul Țigănești. ☺. Maiu—Iulie.

**Cynoglossum pallidiflorum** GREC. *Conspect. fl. României* 413. Prin dumbrăvile câmpene în locuri umbroase, pe marginea pădurilor, adesea. Comana, pe marginea pădurii; Chitila, pe marginea pădurii; Mănăstirea Cernica, prin rărișurile din pădurea «Cernica»; Mănăstirea Pasărea, în pădurea «Pasărea»; Mănăstirea Căldărușani, pe marginea drumului spre «Moara-Săraca». ☺. Maiu—Iunie.

Această interesantă plantă, cunoscută până acum numai din regiunea Bucureștilor, este mai aproape de *Cynoglossum officinale* L. de care diferă mai cu samă prin foile de un verde cam deschis opac, pe ambele fețe cu peri scurți aspri sparsiu dispuși fără reflex albicios, cei mai mulți având baza tuberculată, prin caliciul cu peri scurți aspri, culcați, răriți tuberculați la bază. Samănă mult și cu *Cynoglossum montanum* LAMK., însă nu are ca acesta carpelele mature cu protuberanțe tuberculoase printre peri glochidiați ce le acopere fața externă.

Proximum *C. officinale*. a quo praecipue differt foliis pallide viridibus, pilis plerumque basi tuberculatis utrinque adspersis, calyce pilis brevibus asperis, accumbentibus, raris, basi tuberculatis.

**Echinosperrum Lappula** LEHM. *Asperif.* (1818). 121. apud KOCH, *Syn. ed.* 2. 571. DC. *Prodr.* X. 136. LEDEB. *fl. ross.* III. 155. GREN. GODR. *Fl. Franc.* II, 535. RCHB. *Icon. fl. germ. et helv.* XVIII. 76. t. 128. fig. II. NEILR. *Fl. von Nieder-Oesterreich* 517. HALLIER, *Fl. von Deutschld.* XIX. 27. t. 1883. COSTE, *Fl. Franc.* II. 603. ROUY, *Fl. Franc.* X. 341. NYMAN, *Consp.* 523. VELENOVSKY, *Fl. Bulg.* 404. BRÂNDZĂ, *Prodr. fl. române* 369 și *Flora Dobrogei* 284. GRECESCU, *Conspect. fl. României* 412. *Echinosperrum Lappula* SW. apud STURM, *Deutschlds Flora Heft* 43 (1823). t. 1. *Echinosperrum Lappula* L. sub *Myosotide* apud BOISS. *fl. orient* IV. 249. SIMONKAI, *Enum. Fl. Transs.* 401. *Myosotis Lappula* L. *Sp. pl.* ed. 1 (1753). 131 și ed. 2. (1762). 189. *Lappula Myosotis* MOENCH apud FIEK, *Fl. von Schlesien* 305. GÜRKE în ENGLER, *Nat. Pflanzenfamilien* IV Teil. Abteilung 3 a. pag. 107. GARCKE, *Ill. Fl. von Deutschld.* 590. *Cynoglossum Lappula* SCOP. *Fl. Carn.* ed. 2. I. 125, KRAUSE în LUTZ, *Sturms Fl. von Deutschld.*

XI. 34. t. 6. *Lappula echinata* GILIB, apud BECK, Fl. von Nieder-Österreich 962. HALÁCSY, Conspectus Fl. Graec. II. 361. *Rochelia Lappula* ROEM. SCHULT.—Vulg. Lipici, Turiță. — Prin locuri năsiptoase și aride, cultivate și inculte, pe lângă drumuri în câmp și pe coline uscate, adesea. Ciorogârla, pe marginea șoselei; Călugăreni, Crucea-de-piatră, pe marginea pădurii «Crucea-de-piatră»; Gruiu, pe marginea șoselei București spre Oltenița; Chitila, pe marginea șoselei; Mănăstirea Cernica, pe marginea drumului; Ștefănești spre Dascălu, pe marginea șoselei; Mănăstirea Căldărușani, pe marginea drumului spre «Moara-Săracă»; Mănăstirea Țigănești, lângă podul peste râul Ialomița, aproape de satul Țigănești. ☉ și ☺. Iunie—Iulie.

**Asperugo procumbens** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 138 și ed. 2, (1762). 198. KOCK, Syn. ed. 2. 571. DC. Prodr. X. 146. LEDEB. fl. ross. III. 164. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 539. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XVIII. 74. t. 126. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 516. BOISS. fl. orient. IV. 275. FIEK, Fl. von Schlesien 305. HALLIER, Fl. von Deutschld. XIX. 25. t. 1882. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 962. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. XI. 39. fig. 4. dela pag. 40. COSTE, Fl. Franc. II. 607. ROUY, Fl. Franc. X. 344. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 589. NYMAN, Consp. 523. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 401. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 405. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 369 și Flora Dobrogei 284. GÜRKE în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. Abteilung 3 a. pag. 111. — Vulg. Lipicioasă. — Prin locuri cultivate și inculte, prin tufișuri, pe lângă garduri, ziduri, dărâmături și pe marginea drumurilor, adesea. Comana, pe marginea drumului în tufișuri. ☉ Maiu—Iulie.

**Symphytum officinale** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 136 și ed. 2. (1762). 195. STURM, Deutschlds Flora Heft 17. (1804). t. 4. KOCH, Syn. ed. 2. 575. DC. Prodr. X. 37. LEDEB. fl. ross. III. 114. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 511. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XVIII. 57. t. 102. fig. I. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 521. BOISS. fl. orient. IV. 171. FIEK, Fl. von Schlesien 309. HALLIER, Fl. von Deutschld. XIX. 56. t. 1898. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 963. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. XI. 69. t. 9. COSTE, Fl. Franc. II. 581. ROUY, Fl. Franc. X. 289. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 594. NYMAN, Consp. 509. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 403. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 390. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. II. 330. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 372 și Flora Dobrogei 283. GRECESCU, Conspect. fl. României 415 și Supplement 117. GÜRKE în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. Abteilung 3 a. pag. 112. — Vulg. Iarba-lui-Tatin, Iarbă-băloasă, Tătăneasă, Tatină. — Prin locuri umede, pe lângă drumuri, garduri, prin fânețele umede de pe marginea râurilor și pâraelor, adesea. Ciorogârla, în pădurea «Cotroceanca»; Călugăreni, Crucea-de-piatră în pădurea «Crucea-

de-piatră» pe locurile umede dela «Șipot»; Măgurele, pe locurile umede de pe marginea Sabarului; Oltenița, în pădurea de pe marginea Dunării, aproape de gura râului Argeș; Chitila, pe marginea pădurii; Mănăstirea Cernica, pe linia forturilor «La-Anini», Mănăstirea Căldărușani, pe marginea lacului «Căldărușani»; Mănăstirea Snagov, cătunul «Fundu», pe insulă; Mănăstirea Țigănești, pe marginea pădurii «Ciolpani». 4. Maiu — August.

**Symphytum tuberosum** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 136 și ed. 2. (1762). 195. KOCH, Syn. ed. 2. 576. DC. Prodr. X. 38. LEDEB. fl. ross. III. 115. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 511. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XVIII. 58. t. 103. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 521. BOISS. fl. orient. IV. 175. FIEK, Fl. von Schlesien 309. HALLIER, Fl. von Deutschld. XIX. 60. t. 1899. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 963. KRAUSE în LUTZ, Sturms. Fl. von Deutschld. XI. 72. COSTE, Fl. Franc. II. 582. ROUY, Fl. Franc. X. 290. GARCCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 595. NYMAN, Consp. 509. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 403. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 390. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 373 și Contribuțiuni nouă la Flora României (1889). pag. 19. GRECESCU, Conspect. fl. României 415 și Supplement 117. GÜRKE în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. Abteilung 3 a. pag. 112. Prin păduri umede și umbroase. Călugăreni, Crucea-de-piatră în pădurea «Crucea-de-piatră». 4. Aprilie—Maiu.

**Anchusa officinalis** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 133 și ed. 2. (1762). 191. STURM, Deutschlds Flora Heft 18. (1804). t. 1. KOCH, Syn. ed. 2. 573. DC. Prodr. X. 42. exclus. var.  $\gamma$ . et  $\delta$ . LEDEB. fl. ross. III. 117. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 512. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XVIII. 62. t. 107. fig. II. și t. 108. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 519. BOISS. fl. orient. IV. 151. FIEK, Fl. von Schlesien 308. HALLIER, Fl. von Deutschld. XIX. 44. t. 1891. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 965. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. XI. 63. t. 8. COSTE, Fl. Franc. II. 584. ROUY, Fl. Franc. X. 287. GARCCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 593. NYMAN, Consp. 510. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 402. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 390. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. II. 323. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 371 și Flora Dobrogei 285. GRECESCU, Conspect. fl. României 416 și Supplement 118. GÜRKE în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV Teil. Abteilung 3 a. pag. 115.—Vulg. Limba-boului, Miruță, Roșii. — Prin fânețe, pe locuri inculte și pietroase, pe marginea sămănăturilor, pe lângă garduri și pe marginea drumurilor, adesea. București, Filaret pe marginea drumului de fier; Călugăreni, pe marginea pădurii «Crucea-de-piatră»; Comana, pe marginea drumului; Budești, pe marginea pădurii de pe malul Argeșului; Chitila, pe marginea drumului. ☉ și uneori 4. Maiu—Septembrie.

**Anchusa ochroleuca** M. BIEB. Fl. Taurico-Cauc. I. (1808). 125. DC. Prodr.

X. 45. exclus. var.  $\beta$  et  $\delta$ . LEDEB. fl. ross. III. 119. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XVIII. 62. t. 107. fig. III. HEUFF. Enum. Pl. Banatu Temes. 125. NEILR. Diagn. 87. BOISS. fl. orient. IV. 153. exclus. synonym. Ledebourii. NYMAN, Consp. 510. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 392. HVLÁCSY, Conspect. Fl. Graec. II. 324. LINDEMANN, Fl. Cherson. II. 22. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 371 și Flora Dobrogei 286. GRECESCU, Conspect. fl. României 417 și Supplement 119. GÜRKE în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. Abteilung 3 a. pag. 115. Prin fânețe și pășuni năsiptoase, prin locuri sterile, pietrișuri cu iarbă și pe lângă drumuri, adesea. București, la «Moara-lui-Ciurel», pe marginea drumului; Comana, la «Fântâna-cu-nucu», prin poieni și rărișuri; Gruiu, pe marginea șoselei București—Oltenița; Mănăstirea Cernica, pe câmp. aproape de localitatea «La-Anini», abundentă cu flori galbene, rozee și albastre; Mănăstirea Pasărea, în rărișurile și poienile din pădurea «Pustnicu»; Mănăstirea Căldărușani, pe marginea pădurii spre livadia «Pârâta» și pe marginea pădurii «Brânzeasca», frecventă. ☉. Maiu—August.

**Anchusa ochroleuca**  $\times$  **italica** nova hybr. Plantă intermediară între *A. ochroleuca* M. BIEB. și *A. italica* RETZ., caracterizată mai cu seamă prin aspectul deosebit, care ne amintește pe ambii părinți; prin bracteele și caliciul hispidul cu lacinile mai lungulețe, obtusiuscule spre vârf adesea închis violacee, bracteele oval-oblonge spre vârf violacee; corola gălbuie sau palid cerulescentă cu tubul mai lung decât caliciul și squamele (fornicele) dens penicilate exerte, celelalte caractere ca la *Anchusa ochroleuca*.—Braeteis calycibusque hispidioribus, calycis laciniis longioribus obtusiusculis bracteisque apicem versus saepe violaceis, corollae luteae vel pallide caeruleascentis tubo calyce longiore, fornicibus dense penicillatis exertis; caetera ut in *A. ochroleuca*.—București, la Moara-lui-Ciurel, pe marginea drumului între părinți. ☉. Iunie—Iulie.

**Anchusa italica** RETZ. Observ. bot. I. (1779). 12. apud KOCH, Syn. ed. 2. 574. DC. Prodr. X. 47. LEDEB. fl. ross. III. 119. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 514. RCHB. Icon. Fl. germ. et helv. XVIII. 61. t. 106. fig. II. NEILR. Fl. von Nieder-Österreich 520. BOISS. fl. orient. IV. 154. HALLIER, Fl. von Deutschld. XIX. 48. t. 1893. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 965. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. XI. 59. COSTE, Fl. Franc. II. 584. ROUY, Fl. Franc. X. 285. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 593. NYMAN, Consp. 511. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 392. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. II. 326. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 372 și Flora Dobrogei 286. GRECESCU, Conspect. fl. României 417 și Supplement 119. GÜRKE în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. Abteilung 3 a. pag. 114. *Anchusa paniculata* Ait. Hort. Kew. I. (1789). 177.—Vulg. Limba-boului. — Prin pășuni, pe marginea sămănăturilor, pe lângă drumuri, adesea. București, la «Moara-lui-Ciurel», pe mar-

ginea drumului; Comana, pe marginea drumului; Mănăstirea Cernica, pe lângă drumuri; Mănăstirea Pasărea, pe marginea șoselei spre Pantelimon și pe marginea pădurii «Pasărea»; Mănăstirea Căldărușani, pe marginea drumului spre «Moara-Săracă». ☉. Maiu—Iulie.

**Anchusa Barrelieri** DC. Fl. française III. (1805). 632. No. 2731. DC. Prodr. X. 48. LEDEB. fl. ross. III. 120. HEUFF. Enum. pl. in Banatu Temes. sponte crescentium et frequentius cultarum (1858). pag. 125. No. 1191. LINDEMANN, Fl. Cherson. II. 23. COSTE, Fl. Franc. II. 584. NYMAN, Consp. 511. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 392. GÜRKE în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. Abteilung 3 a. pag. 114. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 371; Contrib. nouă la Flora României (1889). pag. 19 și Flora Dobrogei 286. GRECESCU, Conspect. fl. României 417 și Supplement 119. *Anchusa Barrelieri* ALL. sub *Buglossa* apud BOISS. fl. orient. IV. 155. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 403. *Anchusa Barrelieri* VITM. Summa. pl. I. 388. apud NEILREICH, Diagn. 87. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 965. PORCIUS, Diagn. 206. *Buglossum Barrelieri* ALL. Fl. Pedem. I. (1775). 48. apud REICHB. Icon fl. germ. et helv. XVIII. 61. t. 106. fig. I. *Myosotis obtusa* W. et KIT. Descr. et icon. Pl. rar. Hung. I. (1802). 103. t. 100. Prin livezi, în rărișuri, poieni și pe marginea pădurilor și în tufișurile de pe colinele pietroase, nu tocmai frecventă. Mănăstirea Cernica prin rărișurile din pădurea «Cernica», sporadică. 4 Maiu — Iunie.

**Nonnea pulla** DC. Fl. française ed. 3. III. (1805). 626 în Obs. DC. Prodr. X. 32 exclus. var. β. et γ. KOCH, Syn. ed. 2. 575. LEDEB. fl. ross. III. 111. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XVIII. 59. t. 101 fig. I. NEILR. Fl. von Nieder-Österreich 521. FIEK, Fl. von Schlesien 308. HALLIER, Fl. von Deutschld XIX. 53. t. 1897. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 594. NYMAN, Consp. 512. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 393. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 372. GRECESCU, Conspect. fl. României 416 și Supplement 118. GÜRKE în ENGLER Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. Abteilung 3-a. pag. 116. *Nonnea pulla* L. sub *Lycopsida*. apud BOISS. fl. orient. IV. 166. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 403. *Lycopsis pulla* L. Sp. pl. ed. 2. (1762). 198. *Anchusa pulla* M. BIEB. Fl. Tauric. Cauc. I. (1808). 125. No. 319. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. XI. 65 fig. 6 dela pag. 66. *Nonnea erecta* BERNH. (1800). apud BECK, Fl. von Nieder-Österreich 966. Prin livezi în locuri nășipoase și aride, pe locuri de cultură în câmpii, pe marginea drumurilor și a sămănăturilor, adesea. Călugăreni, Crucea-de-piatră, pe marginea pădurii «Uzun»; Comana, pe marginea drumului de fier, pe coastele expuse soarelui și pe marginea șoselei, frecventă. 4. Maiu — Iulie.

**Pulmonaria officinalis** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 135 și ed. 2. (1762). 194. STURM, Deutschlds Flora Heft 93. (1849). t. 2. KOCH, Syn. ed. 2. 578. DC. Prodr. X. 92. LEDEB. fl. ross. III. 137. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 528. RCHB.

Icon. fl. germ. et helv XVIII. 56. t. 116. fig. II. NEILR. Fl. von Nieder-Österreich 524. BOISS. fl. Orient. IV. 170. FIEK, Fl. von Schlesien 310. HALLIER, Fl. von Deutschld XIX. 83. t. 1912. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 967. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld XI. 55. t. 10. COSTE, Fl. Franc. II. 595. ROUY, Fl. Franc. X. 298. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld 591. KERNER, Monograph. Pulmonar. 24. NYMAN, Consp. 512. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 406. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 375. GRECESCU, Conspect. fl. României 407 și Suplement 116. GÜRKE în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. Abteilung 3 a. pag. 118.—Vulg. Cuscrișor, Iarba-plumânii, Mierea-ursului, Plâmânariță, Plumânărea.— Prin pădurile umbroase și umede, adesea. Ciorogârla, în pădurea Cotroceanca, abundentă; Malul-Spart, în pădurea «Căscioreanca»; Băcu, în pădurea «Ileana»; Copăceni, spre Jilava în pădurea de pe marginea șoselei; Călugăreni, Crucea-de-piatră și în pădurea «Uzun», în pădurea «Crucea-de-piatră» și în pădurea «Dadilov», frecventă; Comana, în pădure; Băneasa și Chitila, în pădure, adesea; Ciocănești în pădurea «Ciocănești» și în pădurea «Popeasca», frecventă; Mănăstirea Cernica, în pădurea «Cernica»; Mănăstirea Pasărea, în pădurea «Pustnicu»; Căciulași, în pădurea «Cort», legit ST. ZOTTU; Mănăstirea Căldărușani, în pădurea «Brânzeasca» și în pădurea «Căldărușani»; Mănăstirea Țigănești, în pădurea «Ciolpani» și în pădurea «Țigănești», frecventă. 4. Martie — Maiu.

**Pulmonaria mollissima** A. KERN. Monogr. Pulmon. (1878). 47. t. III. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 968. PORCIUS, Diagnos. 208. GÜRKE în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. Abteilung 3, pag. 118. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. XI. 57. GARCKE, Ill. Fl. von. Deutschld. 592. NYMAN, Consp. 513. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 407. GRECESCU, Conspect fl. României 407 și Suplement 116. *Pulmonaria angustifolia* BESS. Primit. Fl. Galic. I. 150. non L. *Pulmonaria mollis* BESS. Enum. pl. Volhyn. Podol. (1822). p. 42. No. 1345. LEDEB. fl. ross. III. 137. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 375. non WOLFF.—Vulg. Mierea-ursului.— Prin tufșuri și păduri, mai cu samă pe margini și prin rărișuri în locuri umbroase, adesea. Ciorogârla, în pădurea «Cotroceanca»; Băcu, în pădurea «Ileana»; Călugăreni, Crucea-de-piatră în pădurea «Uzun»; Comana, în pădure, frecventă; Herăstrău, prin tufșurile de pe marginea Colentinei; Băneasa, în pădurea «Tunăreanca»; Ciocănești, în pădurea Ciocănești; București, Colentina. în pădurea «Andronache»; Mănăstirea Cernica, în pădurea «Cernica», abundentă; Mănăstirea Pasărea, în pădurea Pustnicu și în pădurea «Pasărea», frecventă; Mănăstirea Căldărușani, în pădurea «Brânzeasca», abundentă. 4 Aprilie — Maiu.

**Myosotis palustris** ROTH. Tent. Fl. Germ. I. (1788). 87. in NEILR. Fl.

von Nieder-Oesterreich 527. COSTE, Fl. Franc. II. 599. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 596. GRECESCU, Conspect, fl. României 408 și Suplement 116. NYMAN, Consp. 519 GÜRKE în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. Abteilung 3, pag. 119. PANȚU, Contrib. nouă la Flora Ceahlăului 27. *Myosotis palustris* WITHER. Arrang. of. brit. pl. ed. 3. II (1796). 225. STURM, Deutschlds Flora Heft 42. (1822). t. 2. KOCH, Syn. ed. 2. 580. LEDEB. fl. ross. III. 143. GREN. CODR. Fl. Franc. II. 528. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XVIII. 70. t. 119. fig. III. BOISS. fl. orient. IV. 234. FIEK, Fl. von Schlesien 312. HALIER, Fl. von Deutschld. XIX. 103. t. 1921. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. XI. 49. t. 14. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 401. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 377 și Flora Dobrogei 287. *Myosotis palustris* L. pro var. *M. scorpioides* apud BECK, Fl. von Nieder-Österreich 969. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 408. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. II. 351. *Myosotis scorpioides* β. *palustris* L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 131 și ed. 2. (1762). 188. — Vulg. Ochiul-șearpelui, Ochii-păsăruicii, Urechea-șoa-recelui, Nu-mă-uită. — Prin păduri în locuri umede, în livezi, poieni și rășișuri, pe lângă bălți, râuri și părae, adesea. București, la Cotroceni pe locurile umede proprietatea Carol-Davila; Măgurele, pe locurile umede, nășipoase de pe marginea Sabarului; Călugăreni, Crucea-de-piatră, pe locuri mlăștinoase și în pădurea «Crucea-de-piatră», pe locurile umede dela «Șipot», abundant; Comana, pe marginea bălții; Chitila, pe locuri umede; Băneasa, pe marginea «Colentinei», frecvent. 4. Maiu — August.

*Myosotis caespitosa* SCHULTZ. Fl. Starg. Suppl. (1819). pag. 12 în STURM, Deutschlds Flora Heft 42. (1822). t. 7. KOCH, Syn. ed. 2580. DC. Prodr. 105. BOISS. fl. orient. IV. 235. FIEK, Fl. von Schlesien 312. HALLIER, Fl. von Deutschld. XIX. 106. t. 1922. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. XI. 49. t. 15. COSTE, Fl. Franc. II. 599. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 596. NYMAN, Consp. 519. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 408. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 402. GÜRKE în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. Abteilung 3 a. pag. 119. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 378. ROUY, Fl. Franc. X. 321. considerată numai ca rasă a speciei de mai sus *M. palustris*. *Myosotis lingulata* LEHM. Asperifol. (1818). 110. apud GREN. GODR. Fl. Franc. II. 529. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XVIII. 71. t. 120. fig. I. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. II. 351. GRECESCU, Conspect. fl. României 409. Prin fânețele umede și mlăștinoase, pe marginea apelor și pe locuri cari au fost inundate, mult mai rară decât specia precedentă. Malul-Spart, pe locuri umede în pădurea «Căscioreanca». ☉. sau 4. Maiu — Iulie.

*Myosotis arenaria* SCHRAD. în SCHULTZ, Fl. Starg. Suppl. (1819). 12. apud BECK, Fl. von Nieder-Österreich 971. FIEK, Fl. von Schlesien 312. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. XI. 47. GARCKE, Ill. Fl. von



Deutschld 596. GÜRKE în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. Abteilung 3 a. pag. 119. *Myosotis stricta* LINK. Enum. hort. Berol. I. (1819). 164. apud. KOCH, Syn. ed. 2. 582. DC. Prodr. X. 109. LEDEB. fl. ross. III. 147. GREIN. GODR. Fl. Franc. II. 530. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XVIII. 73. t. 123. fig. II. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 529. BOISS. fl. orient. IV. 239. HALLIER, Fl. von Deutschld XIX. 118. t. 1928. COSTE, Fl. Franc. II. 600. ROUY, Fl. Franc. X. 328. NYMAN, Consp. 520. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 410. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 402. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. II. 356. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 379 și Flora Dobrogei 288. GRECESCU, Conspect. fl. României 411 și Suplement 117. *Myosotis arvensis* SIBTH. apud STURM, Deutschlds Flora Heft 42. (1822). t. 14 și 15. Prin locuri nășipoase cultivate și necultivate, adesea. Ciorogârla, prin poienile din pădurea «Cotroceanca»; Păslari spre Pârliți, prin vii, abundent; București, Colentina, pe marginea pădurii «Andronache»; Mănăstirea Pasărea, prin sămănăturile de pe marginea pădurii «Pustnicu» și pe marginea pădurii «Pasărea»; Mănăstirea Țigănești pe marginea pădurii «Ciolpani». ☉. Aprilie — Maiu.

*Myosotis hispida* SCHLECHTD. în Mag. naturf. Fr. Berlin VIII. (1817). 229. apud. KOCH, Syn. ed. 2. 582. DC. Prodr. X. 108. LEDEB. fl. ross. III. 146. GREIN. GODR. Fl. Franc. II. 531. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XVIII. 72. t. 122. fig. II și III. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 528. BOISS. fl. orient. IV. 239. FIEK, Fl. von Schlesien 312. HALLIER, Fl. von Deutschld. XIX. 114. t. 1926. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 971. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. XI. 47. t. 18. COSTE, Fl. Franc. II. 600. ROUY, Fl. Franc. X. 328. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 597. GÜRKE în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. Abteilung 3 a. pag. 119. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 379 și Flora Dobrogei 287. *Myosotis collina* HOFFM. apud. NYMAN, Consp. 520. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 410. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 403. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. II 355. GRECESCU, Conspect. fl. României 411 și Suplement 117. *Myosotis collina* RCHB. în STURM, Deutschlds Flora Heft 42. (1822). t. 11. Pe coline uscate expuse soarelui, pe câmpuri, prin iarba în locuri pietroase, nășipoase și uscate, adesea. Chitila, pe marginea sămănăturilor; Mănăstirea Căldărușani, pe marginea pădurii «Brânzeasca» spre «Moara-Săracă»; Mănăstirea Țigănești, pe marginea pădurii «Ciolpani». ☉. Maiu — Iulie.

*Myosotis intermedia* LINK. Enum. hort. Berol. I. (1821). 164. STURM, Deutschlds Flora Heft 42. (1822). t. 13. KOCH, Syn. ed. 2. 581. DC. Prodr. 108. LEDEB. fl. ross. III. 146. GREIN. GODR. Fl. Franc. II. 532. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XVIII. 73. t. 122. fig. I. NEILR. Fl. von Nieder-Österreich 528. BOISS. fl. orient. IV. 239. FIEK, Fl. von Schlesien 313. HALLIER, Fl.

von Deutschld XIX. 112. t. 1925. COSTE, Fl. Franc. II. 601. ROUY, Fl. Franc. X. 330. GARCCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 597. NYMAN, Consp. 520. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 403. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 378 și Flora Dobrogei 287. GRECESCU, Conspect. fl. României 411 și Suplement 117. GÜRKE în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. Abteilung 3 a. pag. 119. *Myosotis scorpioides* *a. arvensis* L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 131 și ed. 2. (1762). 188. *Myosotis arvensis* L. pro var. *M. scorpioides*. apud BECK, Fl. von Nieder-Österreich 971. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 409. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. II 355. — Vulg. Ochiu-șearpelui. — Prin păduri în poieni și livezi, pe câmpii, prin pășuni și locuri necultivate, frecvent. București, la «Moara-lui-Ciurel»; Domnești, Ciutați în dumbravă; Ciorogârla, în pădurea «Cotroceanca»; abundent; Malul-Spart, în pădurea «Căscioceanca»; Călugăreni, Crucea-de-piatră în pădurea «Uzun»; Comana, prin pădure, frecvent; Chitila, în pădure. Mănăstirea Cernica, în pădurea «Cernica»; Mănăstirea Pasărea, în pădurea «Pasărea»; Mănăstirea Căldărușani, pe marginea pădurii, spre livadia «Pârâta»; Mănăstirea Țigănești, pe drumul dintre pădurea «Ciolpani» și Tâncăbești. ☉. rar 4. Maiu — Iulie.

**Myosotis sparsiflora** MIKAN. în HOPPE Taschenb. (1807). 74. apud. STURM, Deutschlds Flora Heft 42. (1822). t. 10. KOCH, Syn. ed. 2. 582. DC. Prodr. X. 112. LEDEB. fl. ross. III. 148. RCHB. Icon. fl. germ. et. helv. XVIII. 71. t. 123. fig. III. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 529. BOISS. fl. orient. IV. 241. FIEK, Fl. von Schlesien 313. HALLIER, Fl. von Deutschld. XIX. 121. t. 1929. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 969. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. XI. 44. t. 20. GARCCKE, Ill. Fl. von Deutschld 597. NYMAN, Consp. 520. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 410. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 403. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 379 și Flora Dobrogei 288. GRECESCU, Conspect. fl. României 412 și Suplement 117. Prin păduri și tufșuri umede, adesea. Călugăreni, Crucea-de-piatră în pădurea «Crucea-de-piatră»; Comana, prin pădure; Mănăstirea Pasărea, prin pădurea «Pustnicu», frecvent. ☉. Aprilie — Maiu.

**Lithospermum officinale** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 132. ed. 2. (1762). 189. STURM, Deutschlds Flora Heft 5. (1798). t. 3. KOCH, Syn. ed. 2. 579. DC. Prodr. X. 76. GREN. GODR Fl. Franc. II. 520. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XVIII. 67. t. 112. fig. I. NEILR. Fl. von Nieder-Österreich 526. BOISS. fl. orient. IV. 218. FIEK, Fl. von Schlesien 311. HALLIER, Fl. von Deutschld XIX. 94. t. 1917. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 972. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. XI. 52. t. 13. COSTE, Fl. Franc. II. 589. ROUY, Fl. Franc. X. 316. GARCCKE, Ill. Fl. von Deutschld 595. NYMAN, Consp. 518. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 407. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 400. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. II. 348. GÜRKE în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV.

Teil. Abteilung 3 a. pag. 124. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 376 și Flora Dobrogei 280. GRECESCU, Conspect. fl. României 406 și Suplement 116. — Vulg. Mărgelușe, Meiu-păsăresc. — Prin păduri și tufișuri în locuri aride și pietroase, adesea. Roșu, lângă București, în pădurea tăiată, abundent; Comana, pe marginea pădurii; Budești, în pădurea de pe marginea râului Argeș; Chitila, în pădure spre margine; Mănăstirea Pasărea, în pădurea «Pusnicu» și în pădurea «Pasărea», abundent; Mănăstirea Țigănești, pe marginea pădurii «Ciolpani», 4. Maiu — Iulie.

**Lithospermum arvense** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 132 și ed. 2. (1762). 190. KOCH, Syn. ed. 2. 580. DC. Prodr. X. 74. LEDEB. fl. ross. III. 129. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 520. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 526. BOISS. fl. orient. IV. 216. FIEK, Fl. von Schlesien 311. HALLIER, Fl. von Deutschld. XIX. 99. t. 1919. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 972. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. XI. 51. COSTE, Fl. Franc. II. 589. ROUY, Fl. Franc. X. 316. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 596. NYMAN, Consp. 518. SIMONKAI; Enum. Fl. Transs. 407. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 400. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. II. 348. GÜRKE în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil Abteilung 3 a. pag. 124. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 377. și Flora Dobrogei 281. GRECESCU, Conspect. fl. României 406 și Suplement 116. *Rhytispermum arvense* LINK. apud RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XVIII. 68. t. 113. fig. V. — Vulg. Mărgelușe, Meiu-păsăresc. — Prin locuri inculte și aride, pe câmpuri și pe marginea drumurilor, adesea. Ciorogârla, pe marginea pădurii «Cotroceanca», frecvent; Copăceni, spre Jilava lângă pădurea de pe marginea șoselei; Călugăreni, Crucea-de-piatră, pe marginea pădurii «Uzun; Chitila, pe marginea sămănăturilor; Ciocănești, lângă pădurea Ciocănești; București, Colentina, pe marginea pădurii «Andronache»; Mănăstirea Cernica, pe coaste aproape de localitatea «La-Anini»; Mănăstirea Căldărușani, pe marginea drumului spre «Moara-Săracă» și pe marginea pădurii «Brânzeasca», frecvent. ☉. Aprilie — Iunie.

**Lithospermum purpureo-coeruleum** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 132 și ed. 2. (1762). 190. KOCH, Syn. ed. 2. 580. DC. Prodr. X. 82. LEDEB. fl. ross. III. 131. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 519. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XVIII. 67. t. 112. fig. II. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 526. BOISS, fl. orient. IV. 218. HALLIER, Fl. von Deutschld. XIX. 96. t. 1918. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 972. COSTE, Fl. Franc. II. 589. ROUY, Fl. Franc. X. 315. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 595. NYMAN, Consp. 518. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 407. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 400. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. II. 348. GÜRKE în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. Abteilung 3 a. pag. 124. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 376 și Flora Dobrogei 281. GRECESCU, Conspect. fl. României 406. *Lithospermum violaceum* LAMK. (1778).

KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld XI. 52. Prin păduri și tufișuri, adesea. Ciorogârla, în pădurea «Cotroceanca»; Copăceni, spre Jilava pe marginea pădurii de lângă șoseă; Călugăreni, Crucea-de-piatră în pădurea «Crucea-de-piatră» și în pădurea «Dadilov»; Comana, în pădure, frecvent; Mănăstirea Cernica, în pădurea «Cernica», adesea; Mănăstirea Pasărea, în pădurea «Pustnicu» și în pădurea «Pasărea», frecvent; Mănăstirea Căldărușani, pe marginea pădurii și în pădurea «Brânzeasca», adesea; Mănăstirea Țigănești, în pădurea «Ciolpani». 4. Aprilie — Maiu.

**Cerinth minor** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 137 și ed. 2. (1762). 196. STURM, Deutschlds Flora Heft 68. (1835). 1. KOCH, Syn. ed. 2. 577. DC. Prodr. X, 2. LEDEB. fl. ross. III. 102. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 509. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XVIII. 54. t. 94. fig. I. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 523. BOISS. fl. orient. IV. 148. FIEK, Fl. von Schlesien 307. HALLIER, Fl. von Deutschld XIX. 71. t. 1905. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 975. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld XI. 73. t. 11. COSTE, Fl. Franc. II. 579, ROUY, Fl. Franc. X. 281. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 597. NYMAN, Consp. 513. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 405, VELENOVSKY, Fl. Bulg. 396. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. II. 219. GÜRKE în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. Abteilung 3 a. pag. 127. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 374 și Flora Dobrogei 281. GRECESCU, Conspect. fl. României 403 și Suplement 115. — Vulg. Cerițică, Pidosnic, Somno roasă. — Prin livezi, fânețe și tufișuri, pe marginea pădurilor, câmpurilor și pe lângă drumuri, adesea. București, la «Moara-lui-Ciurel»; Comana, pe marginea pădurii; Mogoșoaia, în pădurea închisă spre margine; Chitila, pe marginea șoselei; Mănăstirea Cernica, pe câmp, aproape de localitatea «La-Anini» și în pădurea «Cernica», prin poieni și răișuri, frecventă; Mănăstirea Pasărea, pe marginea pădurii «Pustnicu» și prin răișurile din pădurea «Pasărea»; Mănăstirea Țigănești, pe marginea pădurii «Țigănești». ☉ sau 4. Maiu — Iulie.

β. **maculata** VIS. apud ROUY, Fl. Franc. X. 281. Foile albmaculate, adesea puțin emarginate, corola mai mare și prevăzută cu 5 pete purpurii subt sinusurile lobilor, uneori chiar și lobii corolei mai mult sau mai puțin purpurii. β. **maculata** C. A. MEYER, în LEDEB. fl. ross. III. 102. GRECESCU, Conspect. l. c. *Cerinth maculata* M. BIEB. Fl. Tauric. Cauc. I. 134. *Cerinth maculata* L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 137. Comana, pe marginea pădurii împreună cu forma tipică.

**Echium vulgare** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 139 și ed. 2. (1762). 200. STURM, Deutschlds Flora Heft 18. (1804). t. 2. KOCH, Syn. ed. 2. 577. DC. Prodr. X. 18. LEDEB. fl. ross. III. 104. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 522. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XVIII. 68. t. 97. fig. II. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 523. BOISS. fl. orient. IV. 206. FIEK, Fl. von Schlesien 309. HALLIER, Fl.

von Deutschld. XIX. 77. t. 1908. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 973. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld XI. 78. t. 21. COSTE, Fl. Franc. II. 594. ROUY, Fl. Franc. X. 305. GARCCKE, III. Fl. von Deutschld 598. NYMAN, Consp. 514. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 405. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 397. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. II. 338. GÜRKE în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. Abteilung 3 a. pag. 129. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 374 și Flora Dobrogei 279. GRECESCU, Conspect. fl. României 404 și Supplement 115. — Vulg. Iarba-șearpelui, Ochiu-mâței. — Prin locuri pietroase și aride necultivate, în câmpii și pe marginea drumurilor, adesea. Roșu lângă București, pe marginea pădurii «Roșu»; Ciorogârla, pe marginea pădurii «Cotroceanca»; Călugăreni, Crucea-de-piatră, pe marginea pădurii «Uzun» și pe marginea pădurii «Crucea-de-piatră»; Comana, pe marginea drumului; Chitila, pe marginea drumului; Cățelu, pe lângă linia fortului; Mănăstirea Cernica, pe marginea pădurii; Mănăstirea Pasărea, pe lângă pădurea «Pasărea»; Mănăstirea Căldărușani pe marginea drumului spre «Moara-Săracă» și pe marginea pădurii «Brânzeasca», frecvent. ☉. Iunie — Septemvrie.

*Echium rubrum* JACQ. Fl. Austr. V. Append. pag. 27. t. 3. (1778). apud KOCH, Syn. ed. 2. 578. DC. Prodr. X. 20. LEDEB. fl. ross. III. 164. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XVIII. 69. t. 98, fig. III. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 524. BOISS. fl. orient. IV. 204. HALLIER, Fl. von Deutschld XIX 80. t. 1909. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 973. NYMAN, Consp. 514. SIMONKAI, Enum. Fl. Trans. 406. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 396. GÜRKE în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. Abteilung 3 a. pag. 129. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 374 și Flora Dobrogei 279. GRECESCU, Conspect. fl. României 405. *Echium acutifolium* Lehm. Prin rășișuri și poieni, prin livezi în fânețe, pe coline în locuri aride, năsișoase și expuse soarelui, nu tocmai adesea. Comana, prin poieni, rășișuri și pe marginea pădurii, frecvent; Mănăstirea Cernica, pe marginea pădurii «Cernica» și prin rășișuri, adesea; Mănăstirea Pasărea, în pădurea «Pasărea» prin poieni și rășișuri, frecvent; Mănăstirea Căldărușani, prin poienile și pe marginea pădurii «Brânzeasca», abundant. ☉. Maiu — Iunie.

*Echium italicum* L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 139 și ed. 2. (1762) 200. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 521. BOISS. fl. orient. IV. 205. COSTE, Fl. Franc. II 593. NYMAN, Consp. 515. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 396. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. II. 337. GRECESCU, Conspect. fl. României 404 și Supplement 116. *Echium italicum* L. subspec. *pyrenaicum* I. apud ROUY, Fl. Franc. X. 304. *Echium pyramidatum* DC Prodr. X. 23. LEDEB. fl. ross. III. 105. *Echium brachystachyum* PALL. în herb. WILLD. — «ramis floridis patentibus in paniculam pyramidatam dispositis». — cnf. DC. l. c. Pe locuri sterile, pie-

trișuri, pe coaste și pe marginea drumurilor din câmpii, nu tocmai frecventă. Păslari spre Pârliți, pe marginea drumurilor, între vii, rară; Gruiu, pe marginea șoselei dintre București — Oltenița. ☉. Iunie — August.

### VERBENACEAE

**Verbena officinalis** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 20 și ed. 2. (1762). 29. STURM, Deutschlids Flora Heft 3. (1797). t. 2. KOCH, Syn. ed. 2. 664. LEDEB. fl. ross. III. 329. DC. Prodr. XI. 547. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 718. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XVIII. 52. t. 91 fig. II. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 513. BOISS. fl. orient. IV. 534. FIEK, Fl. von Schlesien 361. HALLIER, Fl. von Deutschld XIX. 5. t. 1879. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 976. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. XI. 82. t. 22. COSTE, Fl. Franc. III. 141. GARCKE, III. Fl. von Deutschld 599. ROUY, Fl. Franc. XI. 216. NYMAN, Consp. 563. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 455. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 441. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. II. 462. BRIQUET în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. Abteilung 3 a. pag. 148. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 379 și Flora Dobrogei 331. GRECESCU, Conspect. fl. României 452, — Vulg. Măturiță, Sporic, Sporici, Verbină, Verbină-de-câmp. — Prin locuri inculte, pe lângă ziduri și garduri prin dărâmături și pe marginea drumurilor, adesea. Ciorogârla, lângă pădurea «Cotroceanca»; Budești, lângă pădurea de pe marginea râului Argeș; Oltenița, în pădurea de pe marginea Dunării, aproape de gura râului Argeș; Chitila, pe marginea pădurii; București, Fundeni pe marginea Colentinei; Mănăstirea Țigănești, pe marginea pădurii «Ciolpani» și pe lângă pădurea «Țigănești», frecventă». 4. Iunie — Septemvrie.

### LABIATAE

**Ajuga reptans** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 561 și ed. 2. (1762). 785. KOCH, Syn. ed. 2. 661. BENTH. în DC. Prodr. XII. 595. LEDEB. fl. ross. III. 446. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 706. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XVIII. 20. t. 33. fig. III. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 510. BOISS. fl. orient. IV. 798. FIEK, Fl. von Schlesien 360. HALLIER, Fl. von Deutschld. XVIII. 367. t. 1866. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 1024. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld XI. 88. fig. 8. COSTE, Fl. Franc. III. 133. GARCKE, III. Fl. von Deutschld 601. ROUY, Fl. Franc. XI. 228. ca subspecie. NYMAN, Consp. 567. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 453. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 443. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. II. 466. BRIQUET în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien

IV. Teil. Abteilung 3 a. pag. 210. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 403 și Flora Dobrogei 328. GRECESCU, Conspect. fl. României 481. *Bugula reptans* MOENCH. (1794). — Vulg. Cearta-casei, Lavrentină, Tămâiță, Vinețică, Vineriță. — Prin livezi, în pășuni și fânețe; pe marginea pădurilor și prin rărișurile și poienile din păduri în locuri umede, adesea. Ciorogârla, în pădurea «Cotroceanca» și cu florile roșii carnee; Călugăreni, Crucea-de-piatră pe marginea pădurii «Uzun», în pădurea «Crucea-de-piatră» și în pădurea «Dadilov», frecventă; Ciocănești, în pădurea «Ciocănești» și în pădurea «Popeasca», adesea; Mănăstirea Pasărea, în pădurea «Pustnicu». 4. Maiu — Iunie.

*Ajuga genevensis* L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 561 și ed. 2. (1762). 785. KOCH, Syn. ed. 2. 661. BENTH în DC. Prodr. XII. 596. LEDEB. fl. ross. III. 448. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 706. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XVIII. 19. t. 33. fig. I. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 510. BOISS. fl. orient. IV. 799. FIEK, Fl. von Schlesien 360. HALLIER, Fl. von Deutschld XVIII. 370. t. 1867. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 1024. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld XI. 86. fig. 9. 2. dela pag. 89. COSTE, Fl. Franc. III. 133. GARCKE III. Fl. von Deutschld. 601. ROUY, Fl. Franc. XI. 232. ca subspecie dela *A. vulgaris* ROUY. NYMAN, Consp. 567. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 453. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 443. BRIQUET în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. Abteilung 3 a. pag. 210. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 403 și Flora Dobrogei 328. GRECESCU, Conspect. fl. României 481. *Ajuga alpina* L. Mant. I. (1762). 80. *Bugula genevensis* SCOP. Fl. Carn. ed. 2. I. (1772). 416. — Vulg. Suliman, Vinețică. — Prin livezi, grădini, pe marginea pădurilor, în fânețe și pășuni nășipoase și prin rărișurile și poienile din păduri, frecventă. Ciorogârla, în pădurea «Cotroceanca», adesea împreună cu specia precedentă; Comana, pe marginea pădurii; Chitila, pe marginea pădurii și cu florile roșii; Mănăstirea Cernica, pe câmp aproape de localitatea «La-Anini» și prin pădurea «Cernica» frecventă, uneori și cu florile roșii sau chiar albe; Mănăstirea Căldărușani, pe marginea pădurii «Căldărușani» și în pădurea «Brânzeasca», frecventă; Mănăstirea Țigănești, în pădurea «Ciolpani». 4. Maiu—Iunie.

*Ajuga Chamaepitys* SCHREB. Unilab. 24. (1773). apud KOCH, Syn. ed. 2. 661. BENTH. în DC. Prodr. XII. 601. LEDEB. fl. ross. III. 449. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 707. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XVIII. 20. t. 34. fig. II. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 511. FIEK, Fl. von Schlesien 360. HALLIER, Fl. von Deutschld XVIII. 376. t. 1869. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 1023. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld XI. 90. COSTE, Fl. Franc. III. 134. GARCKE, III. Fl. von Deutschld 602. ROUY, Fl. Franc. XI. 233. NYMAN, Consp. 568. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 444. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 404 și Flora Dobrogei 328. GRECESCU, Conspect. fl. României 482.

*Ajuga Chamaepithys* L. apud BRIQUET în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. Abteilung 3 a. pag. 210. *Ajuga Chamaepithys* L. sub *Teucrio* apud BOISS. fl. orient. IV. 802. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 454. *Ajuga chamaepithys* L. apud. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. II. 467. *Teucrium Chamaepithys* L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 562 și ed. 2. (1762). 787. *Bugula Chamaepithys* SCOP. Fl. Carn. ed. 2. I. (1772). 417. — Vulg. Tămăiță-de-câmp. — Pe locuri aride și calcare, în câmpii năsiptoase, pe lângă drumuri și locuri necultivate. Comana, pe marginea drumului de fier, nu tocmai frecventă.

☉. Maiu — Septembrie.

**Teucrium Scordium** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 565 și ed. 2. (1762). 790. KOCH, Syn. ed. 2. 662. BENTH. în DC. Prodr. XII. 586. GREIN. GODR. Fl. Franc. II. 709. LEDEB. fl. ross. III. 443. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XVIII. 22. t. 38. fig. II. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 512. BOISS. fl. orient. IV. 812. FIEK, Fl. von Schlesien 361. HALLIER, Fl. von Deutschld XVIII. 385. t. 1873. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 1022. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. XI. 93. fig. 11 dela pag. 92. COSTE, Fl. Franc. III. 136. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld 603. ROUY, Fl. Franc. XI. 236. pro. parte. NYMAN, Consp. 565. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 454. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 442. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. II. 471. BRIQUET în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. Abtheilung 3 a. pag. 212. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 405 și Flora Dobrogei 329. GRECESCU, Conspect. fl. României 482 și Suplement 137. *Chamaedrys Scordium* MOENCH. (1794.), *Scordium alliaceum* GILIB. — Iarbă-usturoasă, Dumbăt, Usturoiu-de-lac. — Prin locuri umede și mlăștinoase, pe lângă râuri, lacuri și bălți, priu fănețe umede, nu tocmai frecvent. Chitila, pe marginea pădurii în locuri umede; Călugăreni, Crucea-de-piatră, pe marginea pădurii în locuri umede; Oltenița, pe marginea șoselei București — Oltenița în locuri umede și în pădurea de pe marginea Dunării, aproape de gura Argeșului. 7. Iulie — August.

**Teucrium Chamaedrys** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 565 și ed. 2. (1762). 790. KOCH, Syn. ed. 2. 662. BENTH. în DC. Prodr. XII. 587. GREIN. GODR. Fl. Franc. II. 711. LEDEB. fl. ross. III. 444. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XVIII. 23. t. 38 fig. IV. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 512. BOISS. fl. orient. IV. 816. HALLIER, Fl. von Deutschld XVIII. 389. t. 1875. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 1022. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld XI. 93. fig. 12 dela pag. 94. COSTE, Fl. Franc. III. 138. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 603. ROUY, Fl. Franc. XI. 239. NYMAN, Consp. 565. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 454. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 442. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. II. 472. BRIQUET în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. Abteilung 3 a. pag. 212. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 405 și Flora Dobrogei 330. GRECESCU, Conspect. fl. României 483 și Suplement 137. *Chamaedrys officina-*



*nalis* MOENCH. Meth. 383. (1794). — Vulg. Buruiană de spulburături, Dumbăt, Dumbet, Jugărel, Jugăreț, Spulburătură. — Prin tufișuri, pe marginea pădurilor prin locuri aride și pietroase, cu deosebire pe calcar, adesea. București, la «Moara-lui-Ciurel» în iunca Dâmboviței; Călugăreni, Crucea-de-piatră, pe marginea pădurii «Uzun» și pe marginea pădurii «Crucea-de-piatră»; Comana, pe marginea pădurii și la «Fântâna-cunucu», frecvent; Mănăstirea Cernica, în pădurea «Cernica»; Mănăstirea Pasărea în pădurea «Pustnicu» și în pădurea «Pasărea»; Mănăstirea Căldărușani, pe marginea pădurii «Brânzeasca»; Mănăstirea Țigănești, pe marginea pădurii «Ciolpani», frecvent. 4. Iunie. — August.

β. *viride* BECK. Fl. von Nieder-Oesterreich 1022. — Tulpina în partea superioară împreună cu frunzele și caliciul mai mult sau mai puțin dens glandulos-păroasă. — Mănăstirea Căldărușani, în livadia «Pârîta»; Mănăstirea Țigănești, pe marginea pădurii «Ciolpani», uneori împreună cu forma tipică, însă mult mai rară.

*Scutellaria altissima* L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 600 și ed. 2. (1762). 836. BENTH. în DC. Prodr. XII. 420. LEDEB. fl. ross. III. 396. HEUFF. Enum. pl. Banat. Temes. (1858). 145. No. 1413. NEILREICH, Diagn. 103. BOISS fl. orient. IV. 688. BECK. Fl. von Nieder-Oesterreich 1005. PORCIUS, Diagn. 237. NYMAN. Consp. 573. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 452. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 449. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 401 și Flora Dobrogei 327. GRECESCU, Conspect. fl. României 479 și Suplement 137. *Scutellaria peregrina* W. et KIT. Descript. et. icon. pl. rar. Hung. II. (1805). 132. t. 125 non L. *Scutellaria commutata* GUSS. (1820). apud RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XVIII. 32. t. 56. fig. II. — Vulg. Gura-lupului. — Prin păduri și tufișuri în locuri umbroase. Ciorogârla, în pădurea «Cotroceanca»; Malul-Spart, în pădurea «Căscioreanca»; Călugăreni, «Crucea-de-piatră» în pădurea «Crucea-de-piatră»; Comana, în pădure, frecventă; Mănăstirea Cernica în pădurea «Cernica», abundentă; Mănăstirea Pasărea, în pădurea «Pustnicu»; Mănăstirea Căldărușani, în pădure la margine spre livadia «Pârîta»; Mănăstirea Țigănești, în pădurea «Ciolpani», frecventă și în pădurea «Țigănești», aproape de satul Țigănești, abundentă. 4. Maiu — Iunie.

*Scutellaria galericulata* L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 599 și ed. 2. (1762). 835. KOCH, Syn. ed. 2. 659. BENTH, în DC. Prodr. XII. 425. LEDEB. fl. ross. III. 398. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 702. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XVIII. 32. t. 55. fig. II. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 508. BOISS. fl. orient. IV. 600. FIEK, Fl. von Schlesien 358. HALLIER, Fl. von Deutschld XVIII. 348. t. 1859. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 1005. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. XI. 183. fig. 30. COSTE, Fl. Franc. III. 128. GARCKE, III Fl. von Deutschld 623. ROUY Fl. Franc. XI. 252. NYMAN, Consp. 573. SI-

MONKAI, Enum. Fl. Transs. 452. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 450. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. II. 495. BRIQUET în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. Abteilung 3 a. pag. 227. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 401 și Flora Dobrogei 327. GRECESCU, Conspect. fl. României 479. Prin pădurile umede și umbroase, prin tufișurile de pe malul râurilor și pâraelor, pe lângă bălți și lacuri, în lunci și zăvoaie, adesea. Măgurele, pe locurile umede de pe marginea Sabarului; Oltenița, în pădurea de pe marginea Dunărei, aproape de gura râului Argeș; Chitila, pe locurile umede de pe marginea pădurii, frecventă; Mănăstirea Țigănești, la marginea pădurii «Ciolpani» în «Valea-Schitului», pe marginea lacului «Bălteni», pe drumul dintre pădurile Ciolpani și Tâncăbești și pe locurile umede de pe marginea pădurii «Țigănești», aproape de satul Țigănești, abundentă; Mănăstirea Snagov, cătunul «Fundu», pe marginea lacului «Snagov», frecventă. 4. Iulie — August.

*Scutellaria galericulata* L. este o plantă nouă pentru regiunea Bucureștilor, căci n'a mai fost citată până acum de nimenea din această regiune.

*Scutellaria hastifolia* L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 599 și ed. 2. (1762). 835. KOCH, Syn. ed. 2. 659. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 701. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XVIII. 32. t. 55. fig. I. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 509. BOISS, fl. orient IV. 691. FIEK, Fl. von Schlesien 358. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 1005. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld XI. 184. COSTE, Fl. Franc. III. 129. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 623. ROUY, Fl. Franc. XI. 251. NYMAN, Consp. 573. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 453. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 450. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 401 și Flora Dobrogei 327. GRECESCU, Conspect. fl. României 479. *Scutellaria hastaefolia* L. BENTH în DC. Prodr. XII. 425. LEDEB. fl. ross III. 399. HALLIER, Fl. von Deutschld XVIII. 351. t. 1860. BRIQUET în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. Abteilung 3 a. pag. 227. *Cassida hastifolia* SCOP. Fl. Carn. ed. 2. I. (1772). 430. Prin livezi umede, prin lunci în fânețe, pe lângă bălți și lacuri, prin păduri și tufișuri în locuri umede și mlăștinoase, adesea. Domnești, Ciutați în dumbravă; Ciorogârla, în pădurea «Cotroceanca» pe locuri umede; Malul-spart, în pădurea «Căscioreanca», pe locuri umede; Comana, la «Padina-lui-Vasile»; Mănăstirea Cernica, în pădurea «Cernica», frecventă; Mănăstirea Pasărea în pădurea «Pustnicu» și în pădurea «Pasărea», abundentă; Mănăstirea Căldărușani, în pădurea «Brânzeasca» frecventă; Mănăstirea Țigănești, pe drumul dintre pădurea Ciolpani și Tâncăbești, pe locuri umede, adesea. 4. Iunie — August.

*Marrubium vulgare* L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 583 și ed. 2. (1762). 816. KOCH, Syn. ed. 2. 657. BENTH. în DC. Prodr. XII. 453. LEDEB. fl. ross. III. 406. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 699. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XVIII. 13. t. 23. fig. I. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 508. BOISS. fl. orient IV.

703. FIEK, Fl. von Schlesien 357. HALLIER, Fl. von Deutschld XVIII. 343. t. 1856. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 1010. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld XI. 127. fig. 21 dela pag. 128. COSTE, Fl. Franc. III. 127. GARCKE, III. Fl. von. Deutschld 603. ROUY, Fl. Franc. XI. 263. NYMAN, Consp. 582. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 451. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 460. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. II. 503. BRIQUET în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. Abteilung 3 a. pag. 230. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 398 și Flora Dobrogei 314. GRECESCU, Conspect. fl. României. 477 și Supplement 136. — Vulg. Bălțătură, Cătușnică-sălbatică, Unguraș, Voronic. — Prin locuri inculte și aride, pe locuri virane pe lângă garduri și pe marginea drumurilor, adesea. Călugăreni, Crucea-de-piatră, pe marginea șoselei, foarte mult; Comana, spre Grădiște, pe marginea drumului, frecvent. 4. Iunie — Septemvrie.

**Sideritis montana** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 575 și ed. 2. (1762). 802. STURM, Deutschlds Flora Heft 4. (1798). t. 9. KOCH, Syn, ed. 2. 656. BENTH. în DC. Prodr. XII. 446. LEDEB. fl. ross. III. 401. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XVIII. 15. t. 25. fig. II. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 507. BOISS. fl. orient. IV. 706. HALLIER, Fl. von Deutschld XVIII. 336. t. 1852. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 1009. COSTE, Fl. Franc. III. 125. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 603. ROUY, Fl. Franc. XI. 258. NYMAN, Consp. 584. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 450. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 460. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. II. 500. BRIQUET în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. Abteilung 3 a. pag. 231. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 398 și Flora Dobrogei 314. GRECESCU, Conspect. fl. României 475 și Supplement 136. *Hesiodia bicolor* MOENCH., *Hesiodia montana* DUMORT. *Burgsdorfia montana* RCHB. Fl. germ. excurs. 327. — Vulg. Incheietoare, Urechea-șoarecelui, Urechea-șoarecului. — Pe câmpuri nășipoase, pe dealuri aride și pietroase în locuri expuse soarelui, adesea. Călugăreni, Crucea-de-piatră, pe marginea pădurii «Uzun»; Cățelu, pe lângă linia fortului, frecventă; Mănăstirea Cernica, pe câmpie aproape de localitatea «La-Anini»; Mănăstirea Pasărea, pe câmp lângă pădurea «Pasărea». ☉. Iunie—August.

**Dracocephalum Moldavica** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 595 și ed. 2. (1762). 830. KOCH, Syn. ed. 2. 647. BENTH. în DC. Prodr. 401. LEDEB. fl. ross. III. 388. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XVIII. 24. t. 39. fig. I. LINDEMANN, Fl. Cherson. II. 88. HALLIER, Fl. von Deutschld XVIII. 247. t. 1818. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. XI. 150. t. 28. GARCKE, III. Fl. von Deutschld 612. NYMAN, Consp. 585. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 447. BRIQUET în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. Abteilung 3 a. pag. 240. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 392. GRECESCU, Conspect. fl. României 467. *Melissa turcica* TABERN., *Moldavica punctata* MOENCH. — Vulg. Busuiocu-

stupului, Mătăcine, Mătăciune, Mătăciune-moldovenească, Mătăciune-turcească, Melisă-turcească, Roiniță. — Această plantă originară din Siberia ostică și din Himalia, să cultivă mult și prin părțile noastre, devenind uneori subsponanee. Mănăstirea Cernica, cultivată și sălbătăcită. ☉. Iunie — August.

Din această plantă prepară călugării noștri *Apa-de-melisă*, care să găsește în comerț.

**Nepeta Cataria** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 570 și ed. 2. (1762). 796. STURM, Deutschlands Flora Heft 84. (1841). t. 7. KOCH, Syn. ed. 2. 646. BENTH. în DC. Prodr. XII. 383. LEDEB. fl. ross. III. 374. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 675. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XVIII. 25. t. 41. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 495. BOISS. fl. orient. IV. 643. FIEK, Fl. von Schlesien 350. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 1004. HALLIER, Fl. von Deutschld XVIII. 233. t. 1813. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld XI. 146. t. 24. COSTE, Fl. Franc. III. 104. GARCKE, III. Fl. von Deutschld 611. ROUY, Fl. Franc. XI. 236. NYMAN, Consp. 585. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 446. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 461. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. II. 534. BRIQUET în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. Abteilung 3 a. pag. 236. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 390 și Flora Dobrogei 324. GRECESCU, Conspect. fl. României 466 și Supplement 134. *Cataria vulgaris* MOENCH. — Vulg. Cătușnică, Iarba-mâței, Iarbă-flocoasă, Iarba-vântului, Minta-mâței. — Prin locuri pietroase, pe lângă garduri, ziduri, pe locuri virane, pe marginea pădurilor și pe lângă drumuri, adesea. Băcu, Arcuda pe lângă filtre, Budești, în pădurea de pe marginea râului Argeș; Chitila, pe marginea drumului; Mănăstirea Țigănești, pe marginea pădurii «Țigănești», aproape de satul Țigănești; Mănăstirea Snagov, pe insulă prin dărâmăturile zidurilor. 4. Iunie — August.

**Nepeta nuda** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 570 și ed. 2. (1762). 797. STURM, Deutschlands Flora Heft 84. (1841). t. 10. KOCH, Syn. ed. 2. 646. BENTH. în DC. Prodr. XII. 387. LEDEB. fl. ross. III. 377. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 676. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XVIII. 25. t. 42. fig. III. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 496. BOISS. fl. orient. IV. 663. FIEK, Fl. von Schlesien 350. HALLIER, Fl. von Deutschld XVIII. 239. t. 1815. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. XI. 148. t. 25. COSTE, Fl. Franc. III. 104. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 611. ROUY, Fl. Franc. XI. 239. NYMAN, Consp. 585. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. II. 536. BRIQUET în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. Abteilung 3 a. pag. 238. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 391 și Flora Dobrogei 325. GRECESCU, Conspect. fl. României 466 și Supplement 134. *Cataria nuda* MOENCH. — Vulg. Poala-Sfintei-Mariei. — Prin rășiuri, poieni și pe marginea pădurilor, în crânguri și tufișuri, adesea.

București, Căramidari pe marginea drumului; Comana, pe marginea pădurii la «Fântâna-cu-nucu», frecventă; Budești, în pădurea de pe marginea râului Argeș; Mănăstirea Pasărea, pe marginea pădurii «Pustnicu», și pe marginea pădurii «Pasărea», frecventă; Mănăstirea Căldărușani, în livadia «Pârîta»; Mănăstirea Snagov, cătunul Fundu pe insulă; Mănăstirea Țigănești, în pădurea Ciolpani. 4. Iunie — August.

**Glechoma hederacea** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 578 și ed. 2. (1762). 807. STURM, Deutschlands Flora Heft 8. (1800). t. 10. KOCH, Syn. ed. 2. 646. GREIN. GODR. Fl. Franc. II. 678. RCHB. Icon. fl. germ. et. helv. XVIII. t. 40. fig. I. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 496. BOISS. fl. orient. IV. 670. FIEK, Fl. von Schlesien 350. HALLIER, Fl. von Deutschld. XVIII. 241. t. 1816. COSTE, Fl. Franc. III. 106. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 611. ROUY, Fl. Franc. XI. 270. NYMAN, Consp. 587. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 447. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 461. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. II. 534. BRIQUET în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. Abteilung 3 a. pag. 238. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 391 și Flora Dobrogei 324. GRECESCU, Conspect. fl. României 467 și Suplement 134. *Nepeta Glechoma* BENTH. în DC. Prodr. XII. 391. LEDEB. fl. ross. III. 379. RCHB. l. c. pag. 24. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 1003. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. XI. 145. t. 27. *Calamintha hederacea* SCOP. Fl. Carn. ed. 2. I. (1772). 423. *Chamoeclema hederacea* MOENCH. — Vulg. Coarda-ielelor, Nejelnică, Olbalt, Pelungoasă, Prelungoasă, Pristinioară, Rânunchioară, Rătungioară, Silnic, Sâlnică. — Prin locurile umede din livezi, prin păduri și tufișuri umede și umbroase, adesea. Măgurele, spre Neftiu, pe locurile umede de pe marginea Sabarului; Călugăreni, Crucea-de-piatră în pădurea «Dadilov» pe marginea Călniștei, frecvent; Mănăstirea Cernica, pe locuri umede «La-Anini», abundentă. 4. Aprilie — Maiu.

**Glechoma hirsuta** W. et KIT. Descript. et icon. pl. rar. Hung. II. (1805). 124. t. 119. KOCH, Syn. ed. 2. 647. HALLIER, Fl. von Deutschld. XVIII. 245. t. 1817. NYMAN, Consp. 587. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 447. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 462. BRIQUET în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien 238. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 391 și Flora Dobrogei 324. GRECESCU, Conspect. fl. României 467. *Nepeta Glechoma*  $\beta$ . *hirsuta* BENTH. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XVIII. pag. 24. t. 40. fig. III. DC. Prodr. XII. 391. *Glechoma hederacea* L.  $\beta$ . *hirsuta* BOISS. fl. orient. IV. 670. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 496. *Nepeta rigida* BECK. Fl. von Nieder-Oesterreich 1004. Prin păduri și tufișuri umede și umbroase, adesea. Ciorogârla, în pădurea «Cotroceanca»; Malul-Spart, în pădurea «Căscioreanca», abundentă; Copăceni, spre Jilava în pădurea de pe marginea șoselei; Călugăreni, Crucea-de-piatră în pădurea «Crucea-de-piatră»; Comana, în pădure, frecventă; Chitila, în pădure, abun-

dentă; Ciocănești, în pădurea «Popeasca» și în pădurea «Ciocănești»; București, Colentina în pădurea «Andronache»; Mănăstirea Cernica, în localitatea «La-Anini»; Mănăstirea Pasărea, în pădurea «Pasărea»; Mănăstirea Caldărușani, în pădurea «Brânzeasca»; Mănăstirea Țigănești, în pădurea «Ciolpani», frecventă. 4. Aprilie — Maiu.

**Brunella vulgaris** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 600 și ed. 2. (1762). 837. STURM, Deutschlds Flora Heft 5. (1798). t. 11. KOCH, Syn. ed. 2. 659. excl. var.  $\beta$ . et  $\gamma$ . GREN. GODR. Fl. Franc. II. 703. BOISS. fl. orient. IV. 691. FIEK, Fl. von Schlesien 359. HALLIER, Fl. von Deutschld XVIII. 357. t. 1862. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 1006. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld XI. 181. t. 30. COSTE, Fl. Franc. III. 131. GARCKE, III. Fl. von Deutschld, 619. ROUY, Fl. Franc. XI. 272. NYMAN, Consp. 573. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 453. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 450. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. II. 496. excl.  $\beta$ . BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 402. GRECESCU, Conspect. fl. României 479 și Supplement 137. *Brunella officinalis* CRANTZ. (1772). — Vulg. Busuioc-de-câmp, Busuioc-roșu, Busuioc-sălbatic, Coroabă, Iarbă-neagră, Șopârlaiță. — Prin livezi, în poieni, rărișuri și pe marginea pădurilor, adesea. Ciorogârla, în pădurea «Cotroceanca»; Domnești, Ciutați în dumbravă; Măgurele, prin locurile umede de pe marginea Sabarului printre sălcii; frecventă; Călugăreni, Crucea-de-piatră, pe marginea pădurii «Uzun», adesea; Budești, în pădurea de pe marginea râului Argeș; Oltenița, pe marginea șoselei București-Oltenița; Băneasa, pe marginea apei Colentina; Chitila, în pădure; Mănăstirea Cernica, în pădurea «Cernica»; Mănăstirea Pasărea, în pădurea «Pasărea», frecventă; Mănăstirea Caldărușani, în pădurea «Brânzeasca»; Mănăstirea Țigănești, pe drumul dintre pădurile «Ciolpani» și «Tâncăbești». 4. Iunie — Septembrie.

**Brunella alba** PALLAS. apud M. BIEB. Fl. Taur. — Cauc. II. (1808). 67. KOCH, Syn. ed. 2. 660. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 704. BOISS. fl. orient. IV. 692. HALLIER, Fl. von Deutschld XVIII. 363. t. 1864. KRAUSE în LUTZ Sturms. Fl. von Deutschld XI. 180. COSTE, Fl. Franc. III. 131. GARCKE, III. Fl. von Deutschld 619. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 450. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 403 și Flora Dobrogei 323. GRECESCU, Conspect. fl. României 480 și Supplement 137. PANȚU, Contrib. nouă la Fl. Ceahlăului pag. 30. *Brunella laciniata* L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 600. pro. var.  $\gamma$ . dela specia *Brunella vulgaris*. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 1007. BRIQUET în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. Abteilung 3 a. pag. 241. NYMAN, Consp. 573. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. II. 496. Prin livezi, pe locuri pietroase expuse soarelui, pe marginea pădurilor, în tufișuri, prin poieni și rărișuri, adesea. Ciorogârla, în pădurea «Cotroceanca»; Călugăreni, Crucea-de-piatră, pe marginea pădurii «Crucea-de-piatră»; Mănăstirea Cernica, în pădurea «Cernica»;

Mănăstirea Pasărea, în pădurea «Pustnicu» și în pădurea «Pasărea», abundentă; Mănăstirea Căldărușani în pădurea «Brânzeasca». 4. Iunie — August.

**Brunella grandiflora** JACQ. apud KOCH, Syn. ed. 2. 660. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 510. FIEK, Fl. von Schlesien 359. HALLIER, Fl. von Deutschld XVIII. 360. t. 1863. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld XI. 179. fig. 29. COSTE, Fl. Franc. III, 131. GARCKE, III. Fl. von Deutschld 620. NYMAN, Consp. 573. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 450. BRIQUET în ENGLER Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. Abteilung 3 a. pag. 241. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 402 și Flora Dobrogei 322. *Brunella grandiflora* MOENCH. Meth. (1794). 414. apud BENTH. în DC. Prodr. XII. 409. LEDEB. fl. ross. III. 392. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XVIII. 13. t. 22. fig. IV. BOISS. fl. orient. IV. 692. ROUY, Fl. Franc. XI. 274. GRECESCU, Conspect. fl. României 480 și Suplement 137. *Brunella grandiflora* L. pro var.  $\beta$ . *Br. vulgaris*. apud BECK, Fl. von Nieder-Österreich 1006. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 453. *Prunella vulgaris*  $\beta$ . *grandiflora* L. Sp. pl. ed. 1. (1753), 600 și ed. 2. (1762). 837. Prin fânețele uscate, pe colinele aride, pe marginea pădurilor, în rărișuri și poieni prin tufișuri, adesea; Mănăstirea Pasărea, în pădurea «Pasărea», nu tocmai frecventă. 4. Iunie — August.

**Phlomis tuberosa** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 586 și ed. 2. (1762). 819. KOCH, Syn. ed. 2. 658. BENTH. în DC. Prod. XII. 544. LEDEB. fl. ross. III. 437. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XVIII. 11. t. 20. fig. I. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 506. BOISS. fl. orient. IV. 792. HALLIER, Fl. von Deutschld. XVIII. 303. t. 1838. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 1021. LINDEMANN, Fl. Chers. II. 101. NYMAN, Consp. 581. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 452. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 459. BRIQUET în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. Abteilung 3 a. pag. 249. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 400 și Flora Dobrogei 320. GRECESCU, Conspect. fl. României 478 și Suplement 136. *Phlomidoides tuberosa* MOENCH., *Phlomidopsis tuberosa* LINK. — Vulg. Solovârfiță. — Pe locuri uscate pietroase, pe lângă drumuri și măracinișuri și pe marginea pădurilor din regiunea câmpiilor, rară. Mănăstirea Cernica, pe marginea pădurii «Cernica» cam în dreptul șoselei ce duce la «Cozieni»; Mănăstirea Pasărea, pe marginea pădurii «Pustnicu», aproape de cantonul No. 8., rară. 4. Maiu — Iulie.

**Lamium amplexicaule** L. Sp. pl. ed. 1. (1753) și ed. 2. (1762). 809. KOCH, Syn. ed. 2. 648. BENTH. în DC. Prodr. XII. 508. LEDEB. fl. ross. III. 427. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 679. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XVIII. 2. t. 3. fig. II. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 498. BOISS. fl. orient. IV. 760. FIEK, Fl. von Schlesien 351. HALLIER, Fl. von Deutschld XVIII. 261. t. 1823. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 1018. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl.

von Deutschld. XI. 133. fig. 22 dela pag. 134. COSTE, Fl. Franc. III. 107. GARCKE, Ill Fl. von Deutschld. 614. ROUY, Fl. Franc. XI. 294. NYMAN, Consp. 575. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 447. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 452. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. II. 513. BRIQUET în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. Abteilung 3 a. pag. 255. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 393 și Flora Dobrogei 318. GRECESCU, Conspect. fl. României 468. *Pollichia amplexicaulis* WILLD., *Galeobdolon amplexicaule* MOENCH. Pe locuri cultivate și inculte, pe lângă garduri și pe marginea drumurilor, comună. Copăceni, spre Jilava, lângă pădurea de pe marginea șoselei; Grădiștea, prin năsipuri, pe marginea râului Argeș; Gara Pantelimon, spre Mănăstirea Pasărea, pe marginea drumului de fier; Mănăstirea Cernica, în localitatea «La-Anini»; Mănăstirea Pasărea, pe marginea pădurii Pasărea. ☉. Martie — Octomvrie.

**Lamium purpureum** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 579 și ed. 2. (1762). 809. KOCH, Syn. ed. 2. 649. BENTH. în DC. l. c. LEDEB. fl. ross. III. 428. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 680. RCHB. l. c. pag. 3. fig. III. NEILR. l. c. BOISS. fl. orient. IV. 766. FIEK, Fl. von Schlesien 352. HALLIER, Fl. von Deutschld XVIII. 264. t. 1824. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 1018. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld XI. 136. fig. 23. COSTE, Fl. Franc. III. 108. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 614. ROUY, Fl. Franc. XI. 296. NYMAN, Consp. 575. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 448. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 452. HALÁCSY. Conspect. Fl. Graec. II. 511. BRIQUET în Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. Abteilung 3 a. pag. 255. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 468 și Flora Dobrogei 318. GRECESCU, Conspect. fl. României 468. *Lamium nudum* CRANTZ. — Vulg. Urzică-moartă, Pizda-Țigăncii, Sugel, Țigăncă. — Prin locuri cultivate și inculte, pe lângă garduri și pe marginea drumurilor, adesea împreună cu specia precedentă. Ciorogârla, pe marginea pădurii «Cotroceanca»; Călugăreni, Crucea-de-piatră, pe lângă pădurea «Crucea-de-piatră»; Grădiștea, prin năsipuri, pe marginea râului Argeș; Chitila, pe marginea drumului; Băneasa, pe marginea șoselei, lângă pădure; Mănăstirea Cernica, «La-Anini», frecventă și pe marginea pădurii «Cernica»; Mănăstirea Pasărea, în pădurea «Pustnicu», pe marginea bălții și pe lângă pădurea «Pasărea»; Mănăstirea Căldărușani, pe marginea lacului în livadia «Pârîta», abundent și pe lângă pădurea «Brânzeasca». ☉. Martie—Septemvrie.

**Lamium maculatum** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 579 pro var. β. *Lam. album*; ed. 2. (1762). 809. KOCH, Syn. ed. 2. 649. BENTH. în DC. Prodr. XII. 510. LEDEB. fl. ross. III. 430. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 681. RCHB. Icon. fl. germ. et. helv. XVIII. 3. t. 4. fig. II. și III. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 498. BOISS. fl. orient. IV. 763. FIEK, Fl. von Schlesien 352. HALLIER,



Fl. von Deutschld XVIII. 268. t. 1825. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 1019. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld XI. 134. COSTE, Fl. Franc. III. 109. GARCKE, III. Fl. von Deutschld 615. ROUY, Fl. Franc. XI. 297. NYMAN, Consp. 574. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 448. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 452. HALÁCSY, Consp. Fl. Graec. II. 511. BRIQUET în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. Abteilung 3 a. pag. 255. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 393 și Flora Dobrogei 318. GRECESCU, Conspect. fl. României 468 și Supplement 135. — Vulg. Urzică-moartă. — Prin pădurile și tufșurile umede și umbroase, adesea. Ciorogârla, în pădurea «Cotroceanca»; Copăceni, spre Jilava, în pădurea de pe marginea șoselei; Călugăreni, Crucea-de-piatră, în pădurea «Uzun», în pădurea «Crucea-de-piatră» și în pădurea «Dadilov»; Comana, prin pădure, frecvent; Chitila, în pădure, adesea; Ciocănești, în pădurea «Popeasca»; Mănăstirea Cernica în pădurea «Cernica»; Mănăstirea Pasărea, în pădurea «Pustnicu», frecvent; Mănăstirea Căldărușani, în pădure la margine, spre livadia «Pârîta»; Căciulați, în pădurea «Cort», (leg. ST. ZOTTU); Mănăstirea Țigănești, în pădurea «Ciolpani», frecvent. 4. Martie — August.

**Lamium Galeobdolon** CRANTZ. Stirp. austr. IV. 262. apud BENTH. în DC. Prodr. XII. 512. LEDEB. fl. ross. III. 431. Gren. Godr. Fl. Franc. II. 682. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XVIII. 4. t. 5. fig. III. FIEK, Fl. von Schlesien 352. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 1018. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld XI. 132. t. 40. COSTE, Fl. Franc. III. 110. GARCKE, III. Fl. von Deutschld 615. BRIQUET în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. Abteilung 3. pag. 256. *Lamium Galeobdolon* L. sub *Galeopside*. apud BOISS fl. orient. IV. 756. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 448. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 451. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. II 509. *Galeobdolon luteum* HUDS. Fl. Angl. ed. 2. (1762). 258. apud KOCH, Syn. ed. 2. 650. STURM, Deutschlands Flora Heft 90. (1845). t. 12. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 499. HALLIER, Fl. von Deutschld XVIII. 274. t. 1827. ROUY, Fl. Franc. XI. 299. NYMAN, Consp. 575. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 394. GRECESCU Conspect. fl. României 469 și Supplement 135. *Galeopsis Galeobdolon* L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 580 și ed. 2. (1762). 810. *Galeobdolon vulgare* PERS. (1807). — Vulg. Gălbiniță, Sugel-galben. — Prin păduri și tufșuri, în locuri umede și umbroase, adesea. Ciorogârla, în pădurea «Cotroceanca», abundant; Copăceni, spre Jilava, în pădurea de pe marginea șoselei; Călugăreni, Crucea-de-piatră în pădurea «Crucea-de-piatră», frecvent; Chitila, în pădure; Ciocănești, în pădurea «Ciocănești» și în pădurea «Popeasca»; București, Colentina în pădurea «Andronache»; Mănăstirea Pasărea, în pădurea «Pustnicu», frecvent; Mănăstirea Căldărușani, în pădure spre livadia «Pârîta» și în

pădurea „Brânzeasca“; Mănăstirea Țigănești, în pădurea «Ciolpani». 4. Aprilie — Maiu.

**Galeopsis Ladanum** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 579. și ed. 2. (1762). 810. KOCH, Syn. ed. 2. 650. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 500. HALLIER, Fl. von Deutschld XVIII. 277. t. 1828. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 1014. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld 618. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 448. BRIQUET în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Abteilung 3 a. pag. 253; variază :

Subsp. **intermedia** VILL. pro specie apud BRIQUET în l. c. *Galeopsis Ladanum* L.  $\gamma$ . *intermedia* VILL. apud BECK, Fl. von Nieder-Österreich 1015. *Galeopsis intermedia* VILL. apud GREN. GODR. Fl. Franc. II. 684. COSTE, Fl. Franc. III. 113. ROUY, Fl. Franc. XI. 284. NYMAN, Consp. 576. *Galeopsis Ladanum* L. pro parte. STURM, Deutschlands Flora Heft 62. (1833). t. 3. FIEK, Fl. von Schlesien 353. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 453. GRECESCU, Conspect. fl. României 469 și Supplement 135. *Galeopsis Ladanum* RCHB. Fl. Germ. exc. 322. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 394. *Galeopsis Ladanum* L.  $\alpha$ . *latifolia* HOFFM. în GARCKE. l. c. *Galeopsis latifolia* HOFFM. apud RCHB Icon. fl. germ. et helv. XVIII. 17. t. 27. fig. III. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld XI. 139. t. 32. *Galeopsis Ladanum*  $\alpha$ . *latifolia* WIMM. et GRAB. — Vulg. Chipu-mâței, Fața-mâței, Balbisă, Tapoșnic, Zeabre. — Prin sămănături, pe locuri deschise nășipoase, pe lângă tufișuri și păduri, nu tocmai adesea. Mănăstirea Căldărușani, pe marginea pădurii «Brânzeasca»; Ștefănești, spre Dascălu, pe marginea șoselei între kilometrii 18 și 19; Mănăstirea Țigănești, pe drumul dintre pădurea «Ciolpani» și «Tâncăbești». ☉. Iulie — August.

Această plantă este nouă pentru regiunea Bucureștilor, căci n'a mai fost menționată de nimeni din această regiune.

**Galeopsis Tetrahit** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 579 și ed. 2. (1762). 810. STURM, Deutschlands Flora Heft 62. (1833). t. 6. KOCH, Syn. ed. 2. 651. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 686. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XVIII. 17. t. 30. fig. I. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 501. BOISS. fl. orient. IV. 752. FIEK, Fl. von Schlesien 353. HALLIER, Fl. von Deutschld XVIII. 286. t. 1830. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 1015. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. XI. 141. t. 35. COSTE, Fl. Franc. III. 112. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 618. ROUY, Fl. Franc. XI. 288. NYMAN, Consp. 576. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 448. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 452. BRIQUET în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. Abteilung 3 a. pag. 253. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 395. GRECESCU, Conspect. fl. României 470 și Supplement 135. — Vulg. Lungurică. — Pe câmpuri la marginea drumurilor, pe lângă garduri în tufișuri, pe marginea pădurilor. Mănăstirea Țigănești, prin tu-

fișurile de pe marginea pădurii «Ciolpani», nu tocmai frecventă. ☉. Iulie—August.

*Galeopsis Tetrahit* L. este o plantă nouă pentru regiunea Bucureștilor, căci n'a mai fost citată de nici un botonist din această regiune.

*Galeopsis speciosa* MILL. Dict. ed. 8. (1768). no. 3. FIEK, Fl. von Schlesien 354. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 1015. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld XI. 143. t. 37. COSTE, Fl. Franc. III. 112. GARCKE, III. Fl. von Deutschld 619. ROUY, Fl. Franc. XI. 287. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 449. BRIQUET în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil Abteilung 3 a. pag. 253. GRECESCU, Conspect. fl. României 470 și Suplement 135. *Galeopsis versicolor* CURT. Fl. Lond. VI. t. 38. apud STURM, Deutschlands Flora Heft 62. (1833). t. 8. KOCH, Syn. ed. 2. 651. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XVIII. 18. t. 30. fig. III. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 501. BOISS fl. orient. IV. 753. HALLIER, Fl. von Deutschld XVIII. 289. t. 1832. NYMAN, Conspect. 576. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 452. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 395 și Flora Dobrogei 323. *Galeopsis Tetrahit* β. L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 580 și ed. 2. (1762). 810. *Galeopsis Tetrahit* β. *cannabina* L. Mant. ed. 2. (1771). 411. *Galeopsis cannabina* ROTH. *Galeopsis Tetrahit* γ. *grandiflora* BENTH. în DC. Prodr. XII. pag. 498. Prin păduri umbroase și umede, în văi pe lângă izvoare și părae, adesea. Ciorogârla, în pădurea «Cotroceanca», nu tocmai frecvent; Călugăreni, Crucea-de-piatră în pădurea «Crucea-de-piatră»; Oltenița, în pădurea de pe marginea Dunării, aproape de gura râului Argeș; Chitila, în pădure; Mănăstirea Pasărea, în pădurea «Pustnicu», destul de frecvent; Mănăstirea Țigănești, în pădurea Ciolpani și pe drumul dintre pădurile «Ciolpani» și «Tâncăbești», abundent. ☉. Iulie—August.

*Leonurus Cardiaca* L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 584 și ed. 2. (1762). 817. STURM, Deutschlands Flora Heft 9. (1801). t. 10. KOCH, Syn. ed. 2. 558. BENTH. în DC. Prodr. XII. 500. LEDEB. fl. ross. III. 422. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 683. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XVIII. 19. t. 31 și 32. fig. II. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 505. BOISS. fl. orient. IV. 753. FIEK, Fl. von Schlesien 357. HALLIER, Fl. von Deutschld. XVIII. 329. t. 1849. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 1017. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld XI. 130. t. 41. COSTE, Fl. Franc. III. 110. GARCKE, III. Fl. von Deutschld 613. ROUY, Fl. Franc. XI. 317. NYMAN, Consp. 580. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 451. VELENOVSKI, Fl. Bulg. 458. HALÁCSY, Consp. Fl. Graec. II. 534. BRIQUET, în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. Abteilung. 3 a. pag. 256. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 399 și Flora Dobrogei 319. GRECESCU, Conspect. fl. României 477. *Cardiaca vulgaris* MOENCH. (1794). *Cardiaca triloba* LAMK. (1778).—Vulg. Cione, Coadă-leului, Creasta-cocoșului, Iarbă-flocoasă, Somnișor, Talpa-gâștei.—Pe marginea

drumurilor, pe locuri necultivate, pe lângă locuințe, comună. Domnești, Ciutați în dumbravă; Budești, în pădurea de pe marginea râului Argeș; Mănăstirea Cernica, pe marginea pădurii; Mănăstirea Caldărușani, pe marginea pădurii «Brânzeasca»; Mănăstirea Snagov, cătunul Fundu, pe insulă prin dărâmurile zidurilor. ♀; Iunie—August.

β. **villosus** DESF.—tulpina și foile dens vilozase.—*Leonurus villosus* DESF. Cat. h. paris. 73. (1804). RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XVIII. 19. t. 31. fig. II. LEDEB. fl. ross. III. 423. GRECESCU, Conspect. I. c. *Leonurus Cardiaca* L. β. *hirsutus* *Hormen.* apud. ROUY, Fl. Franc. XI. 317. Călugăreni, Crucea-de-piatră, pe marginea pădurii «Crucea-de-piatră»; Mănăstirea Caldărușani, pe marginea pădurii «Brânzeasca», uneori împreună cu forma tipică.

**Leonurus Marrubiastrum** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 584 și ed. 2. (1762). 817. BENTH. în DC. Prodr. XII. 501. LEDEB. fl. ross. III. 424. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 683. BOISS. fl. orient. IV. 754. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 1017. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld XI. 129. t. 42. COSTE, Fl. Franc. III. 111. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 614. NYMAN, Consp. 580. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. II. 534. BRIQUET în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. Abteilung 3 a. pag. 256. GRECESCU, Conspect. fl. României 477. *Chaiturus Marrubiastrum* EHRH. apud RCHB. Fl. germ. 317. STURM, Deutschlands Flora Heft 84. (1841). t. 12. KOCH, Syn. ed. 2. 658. RCHB, Icon. fl. germ. et helv. XVIII. 18. t. 32. fig. I. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 506. FIEK, Fl. von Schlesien 358. HALLIER, Fl. von Deutschld. XVIII. t. 1850. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 459. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 400. *Chaiturus Marrubiastrum* L. sub *Leonuro* apud SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 452. *Chaeturus leonuroides* Willd. apud ROUY, Fl. Franc. XI. 318. *Cardiaca Marrubiastrum* SCHREB.—Vulg. Coadă-mâței, Poala-Sfinte i-Mării. Talpa-lupului. — Prin locuri inculte ruderales, pe lângă garduri, pe marginea drumurilor, pe lângă păduri, adesea. Ciorogârla, pe marginea pădurii «Cotroceanca»; Roșu lângă București, pe lângă pădurea «Roșu»; Budești, pe marginea pădurii de lângă râul Argeș; Mănăstirea Cernica, pe marginea pădurii «Cernica»; Mănăstirea Țigănești, pe marginea pădurii «Ciolpani», pe drumul dintre pădurea «Ciolpani» și pădurea «Tâncăbești», și pe marginea pădurii «Țigănești», aproape de satul Țigănești, frecvent. ☉. Iunie—August.

**Ballota nigra** L. Sp. pl. ed. 1 (1753). 582 și ed. 2. (1762). 814. KOCH, Syn. ed. 2. 657. BENTH. în DC. Prodr. XII. 520. LEDEB. fl. ross. III. 434. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XVIII. 10. t. 17. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 505. BOISS. fl. orient. IV. 775. FIEK, Fl. von Schlesien 357. HALLIER, Fl. von Deutschld. XVIII. 300. t. 1837. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 1020. COSTE, Fl. Franc. III. 122. GARCKE, III. Fl. von Deutschld 616. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 451. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 459. HA-

LÁCSY, Conspect. Fl. Graec. II. 532. BRIQUET în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. Abteilung 3 a. pag. 259. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 399 și Flora Dobrogei 322. GRECESCU, Conspect. fl. României 477. *Ballota foetida* LAMK. apud ROUY, Fl. Franc. XI. 320. — Vulg. Cățușe. — Pe locuri inculte pe lângă locuințe, garduri, drumuri, prin tufișuri pe marginea pădurilor, comună. București, la Filaret în câmp pe marginea drumului de fier; «Moara-lui-Ciurel», în lunca Dâmboviței; Băcu-Arcuda, pe lângă filtre; Ciorogârla, pe marginea pădurii «Cotroceanca»; Pâslari, spre Pârliți printre vii; Comana, pe marginea drumului, frecvent; Budești, pe marginea pădurii de pe malul râului Argeș; Oltenița, pe marginea șoselei București-Oltenița; Chitila, pe marginea șoselei; Mănăstirea Snagov, pe insulă prin dărâmurile zidurilor. 4. Iunie — August.

*Stachys officinalis* TREV. (1842). apud BRIQUET în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. Abteilung 3 a. pag. 261. ROUY, Fl. Franc. XI. 304. *Betonica officinalis* L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 573 și ed. 2. (1762). 810. KOCH, Syn. ed. 2. 654. BENTH. în DC. Prodr. 460. LEDEB. fl. ross. III. 407. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 695. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 504. BOISS. fl. orient. IV. 752. FIEK, Fl. von Schlesien 356. HALLIER, Fl. von Deutschld XVIII. 293. t. 1834. COSTE, Fl. Franc. III. 121. NYMAN, Consp. 577. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 450. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 453. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. II. 514. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 397 și Flora Dobrogei 326. GRECESCU, Conspect. fl. României 475 și Suplement 136. *Stachys Betonica* BENTH. apud RCHB. Icon. fl. germ. et helv XVIII. 5. t. 16. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 1013. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld XI. 113. fig. 17 dela pag. 114. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 617. — Vulg. Crețișor, Cuișoriță, Frunza tăieturii, Iarbă-de-rane, Iarbă-tăieturii, Vindeceă. — Prin livezi, în poieni, rășișuri și pe marginea pădurilor în tufișuri, adesea. Ciorogârla, în pădurea «Cotroceanca»; Domnești, Ciutați în dumbravă; Călugăreni, Crucea-de-piatră, pe marginea pădurii «Uzun»; Comana, prin poieni și rășișuri «La-Fântâna-cu-nucu», adesea; Mănăstirea Cernica, în pădurea «Cernica»; Mănăstirea Pasărea, în pădurea «Pasărea»; Mănăstirea Căldărușani, în pădurea «Brânzeasca». 4. Iunie — August.

*Stachys germanica* L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 581. și ed. 2. (1762). 812. STURM, Deutschlands Flora Heft. 83. (1841). t. 11. KOCH, Syn. ed. 2. 652. BENTH. în DC. Prodr. XII. 464. LEDEB. fl. ross. III. 411. GREN. GODR. Fl. Franc. XII. 687. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XVIII. 6. t. 9. fig. I. și II. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 502. FIEK, Fl. von Schlesien 354. HALLIER, Fl. von Deutschld. XVIII. 305. t. 1839. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 1011. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. XI. 121. t. 43.

COSTE, Fl. Franc. III. 120. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 616. NYMAN, Consp. 577. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 449. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 453. BRIQUET în ENGLER, Nat Pflanzenfamilien IV. Teil. Abteilung 3 a. pag. 261. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 395 și Flora Dobrogei 320. GRECESCU, Conspect. fl. României 470 și Suplement 135. *Stachys germanicus* L. apud ROUY, Fl. Franc. XI. 305. *Stachys lanata* CRANTZ. non JACQ. — Vulg. Jale, Jaleș, Pavăză. — Prin fânețe și pășuni, pe coline expuse soarelui, aride și calcare, prin rărișuri, poieni și pe marginea pădurilor în tufișuri, adesea. București, la «Moara-lui-Ciurel» în lunca Dâmboviței; Ciorogârla, în pădurea «Cotroceanca», frecventă; Domnești, Ciutați în Dumbravă; Călugăreni, Crucea-de-piatră în pădurea «Uzun»; Comana, pe coastele expuse soarelui; Budești, pe marginea pădurii de pe malul râului Argeș; Oltenița, pe marginea șoselei București-Oltenița; Cățelu, pe lângă linia fortului; Mănăstirea Pasărea, pe marginea pădurii «Pustnicu»; Mănăstirea Căldărușani, în livadia «Pârîta»; Mănăstirea Țigănești, pe marginea pădurii «Ciolpani» și în pădurea Țigănești, aproape de satul Țigănești, frecvent. ☉. rar 4. Iulie—August.

***Stachys silvatica*** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 580 și ed. 2. (1762). 811. STURM Deutschlands Flora Heft 84. (1841). t. 1. KOCH, Syn. ed. 2. 653. BENTH. în DC. Prodr. XII. 469. LEDEB. fl. ross. III. 413. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 688. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XVIII. 7. t. 10. fig. II. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 502. BOISS. fl. orient. IV. 726. FIEK, Fl. von Schlesien 355. HALLIER, Fl. von Deutschld XVI. 311. t. 1842. I. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 1012. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. XI. 119 t. 44. COSTE, Fl. Franc. III. 119. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 617. NYMAN, Consp. 578. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 449. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 455, HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. II. 522. BRIQUET în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. Abteilung 3 a. pag. 263. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 396 și Flora Dobrogei 321. GRECESCU, Conspect. fl. României 471 și Suplement 136. *Stachys silvaticus* L. apud Rouy, Fl. Franc. XI. 309. — Vulg. Bălbisă. — Prin păduri umede și umbroase, în tufișuri, adesea. Ciorogârla, în pădurea «Cotroceanca», frecvent; Malul-Spart, în pădurea «Căscioreanca»; Comana, prin pădure, abundant; Mănăstirea Cernica, în pădurea «Cernica», adesea; Mănăstirea Pasărea, în pădurea Pustnicu, frecvent; Mănăstirea Căldărușani, în pădure la margine spre livadia «Pârîta»; Mănăstirea Țigănești, în pădurea «Ciolpani». 4. Iunie—August.

***Stachys palustris*** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 580 și ed. 2. (1762). 811. STURM, Deutschlands Flora Heft 18. (1804). t. 12. KOCH, Syn. ed. 2. 653. BENTH. în DC. Prodr. XII. 470. LEDEB. fl. ross. III. 414. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 689. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XVIII. 7. t. 10. fig. I. NEILR. Fl.

von Nieder-Oesterreich 502. BOISS. fl. orient. IV. 726. FIEK, Fl. von Schlesien 355. HALLIER, Fl. von Deutschld. XVIII. 315. t. 1843. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 1012. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. XI. 120. t. 45. COSTE, Fl. Franc. III. 118. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 618. ROUY, Fl. Franc. XI. 309. NYMAN, Consp. 578. SIMONKAY, Enum. Fl. Transs. 449. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 455. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. II. 523. BRIQUET în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. Abtheilung 3 a. pag. 263. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 396 și Flora Dobrogei 321. GRECESCU Conspect. fl. României 471 și Supplement 136. Pe locuri umede mlăștinoase, pe lângă ape în lunci, prin livezi umede, în șanțuri și gropi, pe lângă drumuri, adesea. București, proprietatea Carol Davila în locuri umede; Măgurele, pe locurile umede de pe marginea Sabarului; Malul-Spart, pe locurile umede în pădurea «Căscioareanca»; Călugăreni, Crucea-de-piatră în pădure pe locurile umede de lângă Șipot; Comana, pe marginea bălții; Budești, în pădurea de pe marginea râului Argeș; Oltenița, pe marginea șoselei spre București și în pădurea de pe marginea Dunării, aproape de gura râului Argeș, frecvent; Băneasa, pe marginea Colentinei; Mănăstirea Țigănești, pe marginea pădurii «Ciolpani» spre lacul «Bălteni», pe drumul dintre pădurea «Ciolpani» și pădurea «Tâncăbești» și pe locurile umede dela marginea pădurii «Țigănești», aproape de satul Țigănești, abundent. 4. Iunie—August.

**Stachys annua** L. Sp. pl. ed. 2. (1762). 813. STURM, Deutschlands Flora Heft. 84. (1841). t. 5. KOCH, Syn. ed. 2. 653. BENTH. în DC. Prodr. XII. 481. LEDEB. fl. ross. III. 415. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 691. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XVIII. 9. t. 11. fig. II. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 503. FIEK, Fl. von Schlesien 356. HALLIER, Fl. von Deutschld XVIII. 321. t. 1845. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 1011. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. XI. 115. t. 47. COSTE, Fl. Franc. III. 117. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 618. NYMAN, Consp. 579. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 450. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 457. BRIQUET în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. Abtheilung 3 a. pag. 266. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 396 și Flora Dobrogei 321. GRECESCU, Conspect. fl. României 472 și Supplement 136. *Stachys annuus* L. apud. ROUY, Fl. Franc. XI. 315. *Betonica annua* L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 573. Prin locuri cultivate și necultivate, pe câmpuri prin sămănături, prin vii pe teren calcaros și argilos, pe lângă drumuri și garduri, adesea. București, Grozăvești-Cărămidari, pe marginea drumului și la «Moara-lui-Ciurel» în lunca Dâmboviței; Cățelu pe lângă linia forului; Ștefănești spre Dascălu, pe marginea șoselei; Mănăstirea Căldărușani, pe câmp la marginea pădurii «Brânzeasca» și pe marginea drumului

spre «Moara-Săracă», frecvent; Mănăstirea Țigănești, pe marginea pădurii «Ciolpani», adesea. ☉. rar ☺. Iunie—August.

**Stachys arenariaeformis** ROUY în Bull. Soc. bot. de France XII. ser. II. (1890) pag. 166. GRECESCU, Conspect. fl. României 473 și Supplement 136. Pe marginea drumurilor, pe câmp, printre vii, prin rărișuri, poieni și pe marginea pădurilor, adesea. Păslari spre Pârliți, printre vii; Gogoșari-Varlam, printre tufișurile de pe marginea sămănăturilor; Călugăreni, Crucea-de-piatră pe marginea pădurii «Uzun», frecvent; Comana, pe marginea drumului și prin poienile din pădure, adesea. Gruiu, pe marginea șoselei București-Oltenița; Mănăstirea Cernica, pe marginea drumului și prin rărișurile din pădure, frecvent; Mănăstirea Pasărea, prin rărișurile și poienile din pădurea «Pasărea»; Mănăstirea Căldărușani, pe marginea pădurii «Brânzeasca», frecvent. 4. Iunie—Iulie.

**Salvia verticillata** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 26 și ed. 2. (1762). 37. KOCH, Syn. ed. 2. 639. BENTH. în DC. Prodr. XII. 357. LEDEB. fl. ross. III. 368. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 670. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XVIII. 31. t. 54. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 491. FIEK, Fl. von Schlesien 349. BOISS. fl. orient. IV. 634. HALLIER, Fl. von Deutschld. XVIII. 178. t. 1793. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 1000. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld XI. 100. COSTE, Fl. Franc. III. 100. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld 622. ROUY, Fl. Franc. XI. 330. NYMAN, Consp. 571. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 441. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 448. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. II. 483. BRIQUET în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. Abteilung 3 a. pag. 286. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 385 și Flora Dobrogei 312. GRECESCU, Conspect. fl. României 456. — Vulg. Jaleș, Șălvie, Urechea-porcului. — Prin tufișuri, locuri inculte și cultivate, pe câmpuri, pe lângă păduri și pe marginea drumurilor, adesea. Călugăreni, Crucea-de-piatră, pe marginea șoselei și pe marginea pădurii «Crucea-de-piatră»; Comana, pe marginea pădurii și pe marginea drumului; Chitila, prin sămănături și pe marginea pădurii; Mănăstirea Cernica, pe marginea drumului; Mănăstirea Căldărușani, pe marginea pădurii «Brânzeasca» și pe marginea drumului spre «Moara-Săracă»; Mănăstirea Țigănești, pe drumul dintre pădurea «Ciolpani» și pădurea «Tâncăbești». 4. Iunie—August.

**Salvia glutinosa** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 26 și ed. 2. (1762). 37. STURM, Deutschlands Flora Heft 17. (1804). t. 3. KOCH, Syn. ed. 2. 637. BENTH. în DC. Prodr. XII. 276. LEDEB. fl. ross. III. 359. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 671. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XVIII. 26. t. 45. fig. I. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 488. BOISS. fl. orient. IV. 609. FIEK, Fl. von Schlesien 348. HALLIER, Fl. von Deutschld. XVIII. 156. t. 1786. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 1001. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld XI. 105.



t. 49. COSTE Fl. Franc. III. 100. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 620. ROUY, Fl. Franc. XI. 324. NYMAN, Consp. 569. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 439. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 444. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. II. 483. BRIQUET în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. Abteilung 3 a. pag. 274. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 383 și Flora Dobrogei 311. GRECESCU, Conspect. fl. României 456. — Vulg. Brânca-porcului, Cinsteț, Cocean-căpresc, Jale-cleioasă, Lăpuș-de-capră, Miericică. — Prin pădurile umede și umbroase, pe lângă părae, mai cu samă la munte. Călugăreni, Crucea-de-piatră în pădurea «Crucea-de-piatră», pe lângă «Șipot», rară. 4. Iunie — August.

**Salvia Aethiopsis** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 27 și ed. 2. (1762). 39. KOCH, Syn. ed. 2. 637. BENTH. în DC. Prodr. XII. 283. LEDEB. fl. ross. III. 361. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 671. RCHB, Icon. fl. germ. et. helv. XVIII. 27. t. 47. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 489. BOISS. fl. orient. IV. 616. HALLIER, Fl. von Deutschld. XVIII. 159. t. 1787. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 1001. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld XI. 104. COSTE, Fl. Franc. III. 101. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld 621. ROUY, Fl. Franc. XI. 325. NYMAN, Consp. 569. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 445. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. II. 486. BRIQUET în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. Abteilung 3 a. pag. 275. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 383 și Flora Dobrogei 311. GRECESCU, Conspect. fl. României 457 și Suplement 131. — Vulg. Șerlai, Iarba-lui Sftu-Ioan. — Prin fânețe și pășuni năsiptoase, în locuri aride și pietroase, pe lângă drumuri și pe marginea pădurilor. Călugăreni, Crucea-de-piatră, pe marginea pădurii «Crucea-de-piatră», rar. ☉. Iunie — August.

**Salvia pratensis** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 25 și ed. 2. (1762). 35. KOCH, Syn. ed. 2. 638. BENTH. în DC. Prodr. XII. 289. LEDEB. fl. ross. III. 363. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 672. RCHB, Icon. fl. germ. et. helv. XVIII. 28. t. 51. exclus. var. *transsilvanica*. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 490. FIEK, Fl. von Schlesien 349. HALLIER, Fl. von Deutschld XVIII. 168. t. 1790. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 1002. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld XI. 102. fig. 16. COSTE, Fl. Franc. III. 101. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 622. ROUY, Fl. Franc. XI. 325. NYMAN, Consp. 569. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 439. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 446. BRIQUET în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. Abteilung 3 a. pag. 276. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 384. GRECESCU, Conspect. fl. României 457 și Suplement 131. — Vulg. Jale, Jaleș-de-câmp, Salvie-de-câmpuri. — Pe coline aride în fânețe și pășuni uscate, în tufișe, prin rărișuri, poieni și pe marginea pădurilor, adesea. Călugăreni, Crucea-de-piatră, pe marginea pădurii «Uzun»; Comana, pe marginea pădurii în fânețe, frecventă; Chitila, pe marginea pă-

durii. Mănăstirea Cernica, în pădurea «Cernica» prin rărișuri spre margine, cam în dreptul șoselei ce duce la Cozieni; Mănăstirea Pasărea prin rărișurile și poienile din pădurea «Pasărea», frecvent; Mănăstirea Țigănești, în pădurea «Ciolpani», adesea. 4. Maiu — August. Variază cu florile mai mari sau mai mici.

β. **dumetorum** ANDZ. în BESS. Enum. pl. Volhin. (1822). pag. 3 și 40, pro specie. BENTH. în DC. Prodr. XII. 290. LEDEB. fl. ross. III. 364. GRECESCU, Conspect. fl. României 457 și Suplement 131. Mănăstirea Cernica, în pădurea «Cernica» spre margine, cam în dreptul șoselei ce duce la Cozieni; Mănăstirea Pasărea în pădurea «Pustnicu» și în pădurea «Pasărea», împreună cu forma tipică, însă mai rară.

**Salvia silvestris** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 24 și ed. 2. (1762). 34. KOCH, Syn. ed. 2. 638. BENTH. în DC. Prodr. 292. LEDEB. fl. ross. III. 365. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XVIII. 29. t. 52. fig. I. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 490. HALLIER, Fl. von Deutschld. XVIII. 172. t. 1791. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld XI. 101. fig. 15. COSTE, Fl. Franc. III. 102. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld 622. NYMAN, Consp. 570. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 440. BRIQUET în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. Abteilung 3 a. pag. 277. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 384 și Flora Dobrogei 312. GRECESCU, Conspect. fl. României 458 și Suplement 131. — Vulg. Coadavacei, Jale, Jale-de-câmp, Jale-sălbatică. — Pe câmpuri, coline pe locuri necultivate, pe lângă păduri și pe marginea drumurilor, adesea. Domnești, Ciutați în dumbravă; Comana, pe marginea drumului; Băneasa, pe marginea pădurii dela capul șoselei; Chitila, pe marginea pădurii și pe lângă drum, frecventă; Mănăstirea Cernica, pe câmp; Mănăstirea Pasărea, pe marginea pădurii «Pustnicu» și pe marginea pădurii «Pasărea»; Mănăstirea Căldărușani, în livadia «Pârîta». 4. Iunie — August.

β. **nemorosa** L. apud GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld 622. GRECESCU, Conspect. fl. României 458 și Suplement 131. *Salvia nemorosa* L. Sp. pl. ed. 2. (1762). 35. apud BECK, Fl. von Nieder-Österreich 1002. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 440. VELENVOSKY, Fl. Bulg. 446. BRÂNDZĂ, Flora Dobrogei 312 în Observare. BRIQUET în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. Abteilung 3 a. pag. 277. Călugăreni, Crucea-pe-piatră, pe marginea pădurii «Uzun»; Comana, pe marginea pădurii; Gruiu, pe marginea șoselei București-Oltenița; Oltenița, pe marginea șoselei spre București.

**Melissa officinalis** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 592 și ed. 2. (1762). 827. STURM, Deutschlands Flora Heft. 11. (1802). t. 6. KOCH, Syn. ed. 2. 645. BENTH. în DC. Prodr. XII. 240. LEDEB. fl. ross. III. 356. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 668. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XVIII. 34. t. 60. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 494. BOISS. fl. orient. IV. 584. FIEK, Fl. von Schle-

sien 348. HALLIER, Fl. von Deutschld XVIII. 224. t. 1810. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 1000. COSTE, Fl. Franc. III. 97. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 610. ROUY, Fl. Franc. X. 331. NYMAN, Consp. 587. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 446. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 462. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. II. 539. BRIQUET în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. Abteilung. 3 a. pag. 295. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 390. GRECESCU, Conspect. fl. României 465 și Suplement 134. *Thymus melissa* KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld XI. 177. t. 55.—Vulg. Floarea-stupilor, Iarba-roilor, Iarba-stupului, Mătăciune, Melisă, Mintă-turcească, Roiniță, Roiște.—Pe locuri pietroase în păduri și tufșuri, nu tocmai adesea. Călugăreni, Crucea-de-piatră în pădurea «Uzun» și în pădurea «Crucea-de-piatră», frecventă; Mănăstirea Țigănești, pe marginea pădurii «Ciolpani». 4. Iunie—August.

Această plantă foarte aromatică este mult căutată de albine, din care cauză se cultivă adesea prin stupării.

**Calamintha officinalis** MOENCH. Meth. (1794). 409. STURM, Deutschlands Flora Heft 70 (1836). t. 2. KOCH, Syn. ed. 2. 644. LEDEB. Fl. ross. III. 352. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 663. BOISS. Fl. orient. IV. 577. HALLIER, Fl. von Deutschld. XVIII. 213. t. 1806. excl. synonym. *Hostii*. NYMAN, Consp. 588. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 462. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. II. 541. COSTE, Fl. Franc. III. 96. BRÂNDZĂ, Flora Dobrogei 317. GRECESCU, Conspect. fl. României 464. și Suplement 134. *Melissa Calamintha* L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 593 și ed. 2. (1762). 827. *Calamintha silvatica* BROMFIELD. apud BENTH. în DC. Prodr. XII. 228. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 389. *Calamintha officinalis* MOENCH. a. *vulgaris* RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XVIII. 44. t. 75. fig. II. *Melissa intermedia* BMGT. Enum. transs. II. (1816). 184. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 446. *Satureja Calamintha* (L). SCHEELE. apud BRIQUET în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV Teil. Abteilung 3 a. pag. 301. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. pag. 609. *Satureia Calamintha* SCHEELE ca specie dela *Satureia vulgaris* ROUY, Fl. Franc. XI. 334. *Thymus calamintha* KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. XI. 174. t. 53.—Vulg. Ism a-pădurilor, Ismă, Ismușoară, Mintă-sălbatică.—Prin pădurile și tufșurile dela câmp și dela munte, adesea. Mănăstirea Cernica, pe marginea pădurii «Cernica», frecventă; Mănăstirea Pasărea, în pădurea «Pustnicu» și în pădurea «Pasărea», adesea; Mănăstirea Căldărușani, în pădurea «Brânzeasca» și în pădurea «Căldărușani». 4. Iulie—August.

**Calamintha Acinos** CLAIRVILL. în GAUD. Fl. helv. IV. (1829). 84. STURM, Deutschlands Flora Heft 70. (1836). t. 5. KOCH, Syn. ed. 2. 643. BENTH. în DC. Prodr. 465. LEDEB. Fl. ross. III. 353. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 666. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 493. FIEK, Fl. von Schlesien 347. HALLIER,

Fl. von Deutschld XVIII. 205 t. 1803. COSTE, Fl. Franc. III. 95. NYMAN, Consp. 589. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 463. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 388 și Flora Dobrogei 317. GRECESCU, Conspect. fl. României 465. *Calamintha Acinos* a. *vulgaris* RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XVIII. 42. t. 73. fig. III. *Thymus Acinos* L. Sp. pl. ed. 1 (1753). 591 și ed. 2 (1762). 826. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld XI. 175. t. 52. *Calamintha Acinos* L. sub *Thymo*. BOISS. Fl. orient. IV. 582. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. II. 546. *Melissa Acinos* L. sub *Thymo*. apud SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 444. *Acinos thymoides* MOENCH. *Calamintha arvensis* LAMK. Fl. franç. II. (1778). 394. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 999. *Acinos vulgaris* PERS. *Satureia Acinos* (L.) BRIQUET. apud GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld 608. *Satureia Acinos* SCHEELE apud ROUY, Fl. Franc. XI. 338. BRIQUET în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. Abteilung 3 a. pag. 302. Pe locuri incolte uscate, aride și pietroase năsiptoase, pe marginea drumurilor, adesea. Gogoșari spre Varlam, prin tufișurile de pe marginea sămănăturilor; Călugăreni, Crucea-de-piatră, pe marginea pădurii «Uzun»; Comana, pe coastele uscate; Gruiu pe marginea șoselei București-Oltenița; Chitila pe marginea șoselei; Cățelu pe lângă linia fortului; Mănăstirea «Pasărea» pe marginea șoselei spre Brănești, lângă pădurea «Cernica»; Mănăstirea Căldărușani, pe marginea drumului spre «Moara-Săracă», abundentă. ☉. rar ☉. sau 4. Iunie—August.

**Calamintha Clinopodium** BENTH. în DC. Prodr. XII. 233. LEDEB. Fl. ross. III. 355. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 667. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XVIII. 42. t. 73. fig. I. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 494. BOISS. Fl. orient. IV. 579. FIEK, Fl. von Schlesien 347. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 998. COSTE, Fl. Franc. III. 94. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. II. 540. *Melissa Clinopodium* BENTH., *Clinopodium vulgare* L. Sp. pl. ed. 1 (1753). 587 și ed. 2 (1762). 821. KOCH, Syn. ed. 2. 644. HALLIER, Fl. von Deutschld XVIII. 221. t. 1809. NYMAN, Consp. 587. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 446. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 462. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 389 și Flora Dobrogei 316. GRECESCU, Conspect. fl. României 465. *Satureia Clinopodium* L. apud BRIQUET în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. Abteilung 3 a. pag. 302. *Satureia Clinopodium* (SPENNER) BRIQUET. apud GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 610. *Satureia Clinopodium* CARUEL apud ROUY, Fl. Franc. XI. 336. *Thymus Clinopodium* KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld XI. 176. fig. 28 dela pag. 177.—Vulg. Apărătoare, Somnișor.—Prin păduri și tufișuri, în locuri necultivate, prin vii și pe lângă garduri, adesea. Călugăreni, Crucea-de-piatră, pe marginea pădurii «Uzun» și în pădurea «Crucea-de-piatră», frecventă; Comana în pădure; Chitila în pădure; Mănăstirea Pasărea, pe marginea pădurii «Cernica», spre șoseaua ce duce la

«Brănești» și în pădurea «Pasărea», adesea; Mănăstirea Căldărușani, în pădurea «Brânzeasca»; Mănăstirea Țigănești, în pădurea «Ciolpani» și pe drumul dintre pădurea «Ciolpani» și pădurea Tâncăbești, frecvent. 4. Iunie—August.

**Origanum vulgare** L. Sp. pl. ed. 1 (1753). 590 și ed. 2 (1762). 824. STURM, Deutschlands Flora Heft 3. (1797). t. 13. KOCH, Syn. ed. 2. 639. BENTH. în DC. Prodr. XII. 193. LEDEB. Fl. ross. III. 343. GREIN. GODR. Fl. Franc. II. 656. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XVIII. 35. t. 61. fig. I. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 491. FIEK, Fl. von Schlesien 346. HALLIER, Fl. von Deutschld XVIII. 182. t. 1794. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 993. COSTE, Fl. Franc. III. 84. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 606. ROUY, Fl. Franc. XI. 346. NYMAN, Consp. 592. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 441. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 467. BRIQUET în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. Abteilung 3 a. pag. 309. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 385 și Flora Dobrogei 315. GRECESCU, Supplement la Conspect. fl. României 132. *Thymus origanum* KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. XI. 167. t. 56.—Vulg. Boască, Dost, Milot, Sovârf, Sovâre, Sovârv, Șovârf, Solovârf, Sovovârv.—Prin fânețe, livezi, vii, în tufișuri, prin poieni, rărișuri și pe marginea pădurilor, adesea. Chitila, pe marginea pădurii; Mănăstirea Pasărea, în pădurea «Pustnicu» și în pădurea «Pasărea». 4. Iunie—August.

Afară de forma tipică, care este foarte rară, distingem și următoarele 2 varietăți.

var. **virens** BENTH. în DC. Prodr. XII. 193, var.  $\delta$ . LEDEB. Fl. ross. III. 343. var.  $\gamma$ . cnf. PORCIUS, Diagn. 226. GRECESCU, Supplement 132—bracteele verzi și florile alburii. Ciorogârla, în pădurea «Cotroceanca», rară numai la marginea despre «Bolintinu-din-deal»; Budești, în pădurea de pe marginea râului Argeș.

var. **Barcense** SIMK. Enum. Fl. Transs. 441. pro. specie. PORCIUS, Diagn. 227. GRECESCU, Conspect. fl. României 459 și Supplement 132.—Florile purpurescente tot ca la forma tipică, dar bracteele și caliciul, de culoare purpurie închisă, sunt presărate cu mici punctulețe glandulare aurii.—Băcu, pe marginea pădurii; Ciorogârla, în pădurea «Cotroceanca», frecventă; Călugăreni, Crucea-de-piatră, pe marginea pădurii «Uzun»; Comana prin rărișuri și pe marginea pădurii, adesea; Mănăstirea «Cernica» în pădurea «Cernica»; Mănăstirea Pasărea, în pădurea «Pustnicu», abundentă; Mănăstirea Căldărușani, în pădurea «Brânzeasca»; Mănăstirea Țigănești, în pădurea «Ciolpani», frecventă.

Var. **virens** BENTH. este nouă pentru Flora Bucureștilor, căci n'a mai fost citată la noi decât dela «Cheia-Argeșului»; iar var. **Barcense** SIMK. este forma cea mai răspândită în România.

**Thymus montanus** w. et KIT. Deser. et icon. pl. rar. Hung. I (1802). 72. t. 71. HEUFFEL, Enum. pl. Banat — Temes. (1858). 140 No. 1367. PORCIUS, Diagn. 229. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 443. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. II. 566. BRIQUET în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV Teil. Abteilung 3 a. pag. 312. GRECESCU, Conspect. fl. României 460 și Suplement 133. *Thymus Serpyllum* L.  $\beta$ . *montanus* BENTH. în DC. Prodr. XII. 201. exclus. synonym. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XVIII. 37. t. 67. fig. I. *Thymus ovatus* MILL.  $\gamma$ . *montanus* BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 995. Prin livezi, locuri cu iarbă în tufişuri, prin rărişuri, poieni și pe marginea pădurilor, adesea. Bucureşti la «Moara-lui-Ciurel», pe marginea Dâmboviței; Ciorogârla, în pădurea «Çotroceanca»; Mănăstirea Pasărea, la marginea pădurii «Cernica», spre șoseaua ce duce la Brănești, abundent; Mănăstirea Căldărușani, în pădurea «Brânzeasca», frecvent; Mănăstirea Țigănești, în pădurea «Ciolpani» și pe marginea pădurii Țigănești, lângă satul Țigănești. 4. Iunie — August.

**Thymus Marschallianus** WILLD. Sp. pl. III. (1800). 141. M. BIEB. Fl. Tauric-Cauc. III. (1819). 403. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 996. PORCIUS, Diagn. 228. BRÂNDZĂ, Flora Dobrogei 316. GRECESCU, Conspect fl. României 461 și Suplement 133. *Thymus Serpyllum* (L.) BRIQ. var. *Marschallianus* (WILLD.). BRIQUET în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. Abteilung 3 a. pag. 312. BOISS. Fl. orient. IV. 555. *Thymus lanuginosus* MILL.  $\beta$ . *Marschallianus* WILLD. apud HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. II. 565. *Thymus Serpyllum* L. B. *angustifolius*  $\alpha$ . *glabrescens* et  $\beta$ . *Marschallianus* RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XVIII. 37. t. 66. fig. III. et t. 67. fig. II. Prin locuri cu iarbă, livezi în tufişuri, prin rărişuri, poieni și pe marginea pădurilor, adesea. Jilava, pe marginea drumului de fier; Călugăreni, Crucea-de-piatră, pe marginea pădurii «Crucea-de-piatră» și pe marginea pădurii «Uzun», frecvent; Cernica pe marginea pădurii «Cernica», aproape de mănăstire, adesea; Mănăstirea Pasărea, în pădurea «Pasărea», abundent. 4. Iunie — August.

**Lycopus europaeus** L. Sp. pl. ed. 1 (1753). 21 și ed. 2 (1762.). 30. KOCH, Syn. ed. 2. 630. BENTH. în DC. Prodr. XII. 178. LEDEB. Fl. ross. III. 341. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 655. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XVIII. 51. t. 90. fig. I. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 488. BOISS. Fl. orient. IV. 545. FIEK, Fl. von Schlesien 345. HALLIER, Fl. von Deutschld XVIII. 143. t. 1782. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 992. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld XI. 162. fig. 26 dela pag. 163. COSTE, Fl. Franc. III. 83. GARCKE, III. Fl. von Deutschld 606. ROUY, Fl. Franc. XI. 392. NYMAN, Consp. 597. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 439. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 473. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. II. 568. BRIQUET, în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. Abteilung 3 a. pag. 317. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 382

și Flora Dobrogei 310. GRECESCU, Conspect. fl. României 455. *Lycopus aquaticus* MOENCH., *Lycopus palustris* LAMK., *Lycopus vulgaris* PERS. — Vulg. Cervană, Ciorvană, Carvană, Corvană, Țervane. — Prin lunci, șanțuri, gropi și prin locurile umede de pe marginea apelor, specie comună. București, la «Moara-lui-Ciurel» în lunca Dâmboviței; Măgurele, în locurile umede de pe marginea Sabarului, frecventă; Călugăreni, Crucea-de-piatră, pe locurile mlăștinoase de pe marginea pădurii «Uzun» și în pădurea «Crucea-de-piatră», pe lângă «Șipot»; Budești, în pădurea de pe marginea râului Argeș; Oltenița, în pădurea de pe marginea Dunărei, aproape de gura Argeșului; Băneasa, pe marginea «Colentinei»; Chitila, pe locurile umede de pe marginea pădurii; Cățelu, pe locurile umede, lângă linia forturilor; Mănăstirea Pasărea, pe marginea lacului «Pasărea»; Mănăstirea Căldărușani, pe marginea lacului «Căldărușani»; Mănăstirea Țigănești, pe marginea pădurii «Ciolpani» în locuri umede și pe drumul dintre pădurea «Ciolpani» și pădurea «Tâncăbești». 4. Iulie—August.

**Lycopus exaltatus** L. fil. (1781). Suppl. 87. KOCH, Syn. ed. 2. 636. BENTH. în DC. Prodr. XII. 179. LEDEB. Fl. ross. III. 342. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XVIII. 51. t. 90. fig. II. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 488. BOISS. Fl. orient. IV. 545. HALLIER, Fl. von Deutschld XVIII. 146. t. 1783. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 992. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. XI. 164. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 606. NYMAN, Consp. 597. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 439. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 473. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. II. 568. BRIQUET în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. Abteilung 3 a. pag. 317. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 382 și Flora Dobrogei 310. GRECESCU, Conspect. fl. României 456. *Lycopus pinnatifidus* PALL. Aceleași numiri vulgare ca și la specia precedentă cu care crește adesea împreună. Pe locuri umede în lunci pe malurile apelor. București, la «Moara-lui-Ciurel» în lunca Dâmboviței; Băcu-Arcuda, pe lângă filtre; Ciorogârla, pe locurile umede din pădurea «Cotroceanca»; Malul-spart, în pădurea «Căscioreanca» pe locuri umede; Budești, în pădurea de pe marginea râului Argeș; Oltenița, pe locurile umede de pe marginea șoselei București-Oltenița și în pădurea de pe marginea Dunărei, aproape de gura Argeșului, frecvent; Mănăstirea Pasărea în pădurea «Pustnicu». 4. Iulie—August.

**Mentha Pulegium** L. Sp. pl. ed. 1 (1753). 577 și ed. 2 (1762). 807. BENTH. în DC. Prodr. XII. 175. LEDEB. Fl. ross. III. 340. GREN. GOOR. Fl. Franc. II. 654. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XVIII. 50. t. 89. fig. II. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 487. BOISS. Fl. orient. IV. 545. FIEK, Fl. von Schlesien 345. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 981. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. XI. 157. COSTE, Fl. Franc. III. 81. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 605. ROUY, Fl. Franc. XI. 357. NYMAN, Consp. 597. SI-

MONKAI, Enum. Fl. Transs. 439. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 472. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. II. 572. BRIQUET în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. Abteilung 3 a. pag. 318. BRÂNDZĂ. Prodr. fl. române 381 și Flora Dobrogei 313. GRECESCU, Conspect. fl. României 455. *Pulegium vulgare* MILL. apud KOCH, Syn. ed. 2. 636. HALLIER, Fl. von Deutschl. XVIII. 140. t. 1781. — Vulg. Busioc-de-câmp, Busuiocu-cerbilor, Apărătoare, Ismă-proastă. — Pe locurile umede și mlăștinoase de pe marginea apelor, pe lângă bălți, râuri, în fânețe umede, prin șanțuri, gropi și locuri scurse, adesea. București, la «Moara-lui-Ciurel»; Măgurele, pe locurile umede de pe marginea șoselei, frecventă; Ciorogârla, pe locurile umede de pe marginea șoselei, abundentă și pe lângă pădurea «Cotroceanca»; Pâslari spre Pârliți în «Valea-Crividon»; Călugăreni, Crucea-de-piatră, pe marginea pădurii «Uzun» și pe locurile umede mlăștinoase din lunca Călniștei, frecventă; Comana spre Grădiște, pe locuri umede; Budești, pe lângă pădurea de pe marginea râului Argeș; Oltenița, în pădurea de pe marginea Dunărei, aproape de gura Argeșului; Chitila, pe locurile umede de pe marginea pădurii; Cățelu, pe lângă linia forturilor; Mănăstirea Cernica, pe locurile umede de pe marginea pădurii «Cernica», abundentă; Mănăstirea Pasărea, pe marginea pădurii «Pustnicu» și pe marginea lacului «Pasărea», abundentă; Ștefănești spre Dascălu pe marginea șoselei între kilometrul 18 și 19, frecventă; Mănăstirea Căldărușani, pe marginea pădurii «Brânzeasca»; Mănăstirea Țigănești, pe locurile umede de pe marginea pădurii «Ciolpani», pe drumul dintre pădurea «Ciolpani» și «Tâncăbești», și pe marginea șoselei între satul Țigănești și drumul la satul Ciolpani, frecventă. 4. Iulie—August.

β. *alba* — floribus albis. — Această formă cu florile de tot albe am aflat-o numai la Ștefănești spre Dascălu, pe marginea șoselei între kilometrul 18 și 19, împreună cu forma tipică, însă cu mult mai rară.

*Mentha arvensis* L. Sp. pl. ed. 1 (1753). 577 și ed. 2 (1762). 806. KOCH, Syn. ed. 2. 635. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 653. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XVIII. 50. t. 88. FIEK, Fl. von Schlesien 345. HALLIER, Fl. von Deutschld XVIII. 137. t. 1780. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 990. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld XI. 155. fig. 24 dela pag. 154. COSTE, Fl. Franc. III. 81. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 605. ROUY, Fl. Franc. XI. 381. NYMAN, Consp. 597. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 438. BRIQUET în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. Abteilung 3 a. pag. 319, BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 381. GRECESCU, Conspect. fl. României 455 și Suplement 131. *Mentha arvensis* L. var. e. et g. BENTH în DC. Prodr. XII. 172. Pe locuri umede și umbroase, în fânețele umede mlăștinoase, în lunci pe malurile apelor. Măgurele, pe locurile umede de pe marginea Sabarului, adesea;



Oltenița în pădurea de pe marginea Dunărei, aproape de gura Argeșului; Mănăstirea Căldărușani în pădurea «Brânzeasca»; Mănăstirea Țigănești, pe drumul dintre pădurea «Ciolpani» și pădurea «Tâncăbești» și pe locurile umede de pe marginea pădurii «Țigănești», aproape de satul Țigănești, frecventă. 4. Iulie — August.

**Mentha aquatica** L. Sp. pl. ed. 1 (1753). 576 și ed. 2 (1762). 805. KOCH, Syn. ed. 2. 634. BENTH în DC. Prodr. XII. 170 exclus. var.  $\gamma$ . et  $\delta$ . LEDEB Fl. ross. III. 337. GREIN. GODR. Fl. Franc. II. 651. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XVIII. 49. exclus. var. b. t. 85. fig. I. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 485. BOISS. Fl. orient. IV. 544. FIEK, Fl. von Schlesien 344. HALLIER, Fl. von Deutschld XVIII. 127. excl. var.  $\delta$ . t. 1777. I. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 987. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld XI. 153. COSTE, Fl. Franc. III. 80. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 605. ROUY, Fl. Franc. XI. 279. NYMAN, Consp. 596. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 437. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 472. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. II. 571. excl. var.  $\gamma$ . BRIQUET în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. Abteilung 3 a. pag. 320. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 380 și Flora Dobrogei 313. GRECESCU, Conspect. fl. României 454 și Suplement 131. — Vulg. Isma-broaștei, Isma-broaștelor, Isma-bălților, Ismă-broștească, Minta-broaștei, Minta-broaștelor. — Prin locuri mlăștinoase, șanțuri, gropi, bălți, părae și pe marginea apelor, în lunci și zăvoaie. Măgurele, pe locurile umede de pe marginea Sabarului; Păslari spre Pârliți în «Valea-Crividon»; Călugăreni, Crucea-de-piatră, pe locurile mlăștinoase de pe marginea pădurii «Uzun» și în pădurea «Crucea-de-piatră», pe locurile umede dela «Șipot»; Comana, pe locuri umede; Chitila, pe marginea bălții; Băneasa, pe marginea «Colentinei», frecventă; Mănăstirea Pasărea, pe marginea lacului Pasărea; Mănăstirea Țigănești, pădurea «Ciolpani», pe marginea lacului «Bălteni»; Mănăstirea Snagov, cătunul Fundu, pe marginea lacului «Snagov» și pe insulă, abundent. 4. Iulie — August.

**Mentha silvestris** L. Sp. pl. ed. 2 (1762). 804. KOCH, Syn. ed. 2. 632. BENTH. în DC. Prodr. XII. 166. LEDEB. Fl. ross. III. 336. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XVIII. 48 exclus. *nepetoides* și *piperita*. t. 82. fig. I—III. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 484. FIEK, Fl. von Schlesien 343. HALLIER, Fl. von Deutschld XVIII. 118. t. 1775. COSTE, Fl. Franc. III. 80. GARCKE, III. Fl. von Deutschld 604. NYMAN, Consp. 595. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 436. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 472. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 380 și Flora Dobrogei 313. GRECESCU, Conspect. fl. României 452 și Suplement 131. *Mentha longifolia* HUDS. Fl. angl. (1762). 221. apud BRIQUET în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV Teil. Abteilung 3 a. pag. 321. ROUY, Fl. Franc. XI. 363. *Mentha longifolia* L. Sp. pl. ed. 1 (1753). 576. pro var.  $\beta$ .

*Menthae spicatae*. BECK. Fl. von Nieder-Oesterreich 983. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. II. 569. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld XI. 156. — Vulg. Ismă, Ismă-proastă, Ismă-sălbatică, Mintă, Minta-calului, Mintă-de-cămpuri, Mintă-sălbatică, Voestinița, Voestniță. — Prin lunci în tufșuri umede, pe lângă izvoare, pe locurile umede de pe marginea apelor; specie comună și foarte polimorfă. 4. Iulie — August. Variază:

var. *candicans* CRANTZ. pro specie. BENTH. în DC. Prodr. XII. 166. BECK Fl. von Nieder-Oesterreich 983. GRECESCU, Conspect. fl. României 452 și Suplement 131. Ciorogârla, în pădurea «Cotroceanca», abundentă; Budești, pădurea de pe marginea râului Argeș; Mănăstirea Pasărea, pădurea «Pasărea»; Ștefănești spre Dascălu, pe marginea șoselei; Mănăstirea Snagov, cătunul «Fundu», pe insulă.

var. *vulgaris* BENTH. în DC. Prodr. XII. 167. GRECESCU, Conspect. fl. României 453 și Suplement 131 București la «Moara-lui-Ciurel»; Băcu-Arcuda pe lângă filtre; Măgurele pe locurile umede de pe marginea Sabarului; Păslari spre Pârliți în «Valea-Crividon»; Călugăreni, Crucea-de-piatră pe marginea șoselei; Oltenița în pădurea de pe marginea Dunărei, aproape de gura Argeșului; Băneasa, pe marginea Colentinei; Cățelul pe linia forturilor; Mănăstirea Pasărea pe marginea lacului; Mănăstirea Țigănești, pe marginea pădurii «Ciolpani», pe drumul dintre pădurea «Ciolpani» și pădurea «Tâncăbești», frecvent.

*Mantha nepetoides* LEJ. apud KOCH, Syn. ed. 2. 633. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 650. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XVIII. 48. t. 82. fig. IV. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 485. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 985. NYMAN Consp. 596. GRECESCU, Conspect. fl. României 454. *Mentha pubescens* WILLD., *Mentha dumetorum* SCHULT. β. *pubescens* ROUY, Fl. Franc. XI 376. *Mentha silvestris* L. var. *nepetoides* RCHB. l. c. *Mentha aquatica* × *silvestris*, *Mentha longifolia* × *aquatica*, *Mentha brachystachya* BOBB. in litt. apud GRECESCU, l. c. Pe locuri umede, șanțuri, gropi, pe marginea apelor. Mănăstirea Snagov, cătunul Fundu, pe marginea lacului Snagov. 4. Iulie — August.

## SOLANACEAE

*Lycium vulgare* DUN. în DC. Prodr. XIII. sect. I (1852). 509. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 952. COSTE, Fl. Franc. II. 611. ROUY, Fl. Franc. X. 369. WETTSTEIN în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. Abteilung 3 b. pag. 13. NYMAN, Consp. 524. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 411. GRECESCU, Conspect. fl. României 420 și Suplement 121. *Lycium barbarum* L. Sp. pl. ed. 2 (1762). 277. pro parte. HALLIER, Fl. von Deutschld XVI. 240. t. 1595.

*Lycium afrum* RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XX. t. 14. fig. I. non L. sed in texte pro *Lycium barbarum* descriptum. — Vulg. Cățină, Cățină-de-garduri, Licină, Lițian, Răchișoara, Zaharică. — Originar din sudul Europei, mult cultivat pentru garduri vii, azi a devenit subspontanu și prin părțile noastre. Mănăstirea Pasărea pe gardul mănăstirii; Păslari, spre Pârliți printre vii, Domnești, Ciutați, pe marginea drumului; Comana, în gardul unei vii de pe marginea Neajlovului; Olteniță, pe marginea șoselei spre București, frecvent. ♣. Iunie — August.

**Hyoscyamus niger** L. Sp. pl. ed. 1 (1753). 179 și ed. 2 (1762). 257. STURM, Deutschlands Flora Heft 3. (1797). t. 4. KOCH, Syn. ed. 2. 585. DUNAL în DC. Prodr. XIII. sect. I. 546. LEDEB. Fl. ross. III. 183. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 546. NEILR, Fl. von Nieder-Oesterreich 535. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XX. 2. t. 2. fig. II. BOISS. Fl. orient. IV. 294. FIEK, Fl. von Schlesien 316. HALLIER, Fl. von Deutschld XVI. 270. t. 1606. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 953. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. X. 62. t. 15. COSTE, Fl. Franc. II. 618. ROUY, Fl. Franc. X. 370. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 627. NYMAN, Consp. 524. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 412. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 405. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. II. 363. WETTSTEIN în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. Abteilung 3 b. pag. 18. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 343 și Flora Dobrogei 291. GRECESCU, Conspect. fl. României 422. — Vulg. Măsălarită, Măsălar, Nebunariță, Sunătoare. — Pe locuri cultivate și inculte, pe lângă locuințe, prin dărâmături, pe lângă garduri și pe marginea drumurilor, comună. București la «Moara-lui-Ciurel» și spre Fabrica regiei monopolului tutunului pe marginea drumului; Mănăstirea Căldărușani, pe marginea drumului spre «Moara-Săracă». ☉ sau ☺. Iunie — Iulie.

**Physalis Alkekengi** L. Sp. pl. ed. 1 (1753). 183 și ed. 2 (1762). 262. KOCH, Syn. ed. 2. 584. LEDEB. Fl. ross. III. 183. DUNAL în DC. Prodr. XIII. sect. I. 438. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 545. NEILR, Fl. von Nieder-Oesterreich 534. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XX. 6. t. 9. BOISS. Fl. orient. IV. 287. FIEK, Fl. von Schlesien 315. HALLIER, Fl. von Deutschld XVI. 258. t. 1602. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 954. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld X. 59. fig. 3. dela pag. 60. COSTE, Fl. Franc. II. 614. ROUY, Fl. Franc. X. 367. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 624. NYMAN, Consp. 525. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 411. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 405. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. II. 366. WETTSTEIN în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. Abteilung 3 b. pag. 19. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 342 și Flora Dobrogei 289. GRECESCU, Conspect. fl. României 421. *Physalis Halicacabum* SCOP. Fl. Carn. ed. 2. I (1772). 160. *Alkekengi officinarum* OPIZ. — Vulg. Beșicuri, Buruiană-de-a-bubă, Cireașa-evrei-

lor, Gogoase, Iarba-bubei, Păpălăi, Păpălău, Papele. — Prin păduri și tufișuri prin vii, pe lângă garduri și drumuri, adesea. Roșu, în pădurea «Roșu»; Ciorogârla, în pădurea «Cotroceanca», abundant; Tântava, în pădurea «Tântava»; Malul-spart, în pădurea «Căscioceanca»; Călugăreni, Crucea-de-piatră, în pădurea «Crucea-de-piatră»; Comana în pădure, frecvent; Budești, în pădurea de pe marginea râului Argeș; Mănăstirea Cernica, în pădurea «Cernica», frecvent; Mănăstirea Pasărea, în pădurea «Pasărea»; Mănăstirea Țigănești, pe drumul dintre pădurea «Ciolpani» și pădurea «Tâncăbești», adesea. 4. Iunie — Iulie.

**Solanum Dulcamara** L. Sp. pl. ed. 1 (1753). 185 și ed. 2 (1762). 264. STURM, Deutschlands Flora Heft 18. (1804). t. 3. KOCH, Syn. ed. 2. 584. LEDEB. Fl. ross. III. 187. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 544. DUNAL în DC. Prodr. XIII. sect. I. 78. var.  $\alpha$ . NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 536. RCHB Icon. fl. germ. et helv XX. 7. t. 12. fig. I și II. BOISS Fl. orient. IV. 285. FIEK, Fl. von Schlesien 314. HALLIER, Fl. von Deutschld XVI. 252. t. 1600. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 954. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. X. 68. t. 17. COSTE, Fl. Franc. II. 613. ROUY, Fl. Franc. X. 363. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld 626. NYMAN, Consp. 625. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 411. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 406. HALÁCSY, Consp. Fl. Graec. II. 369. WETTSTEIN în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. Abteilung 3 b. pag. 22. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 341 și Flora Dobrogei 290. GRECESCU, Conspect. fl. României 420 și Suplement 121. PANȚU, Contrib. nouă la Flora Ceahlăului 28. — Vulg. Buruiană-de-dalac, Lăsnicioar, Lăsnicioare, Lesnicioară, Lesnicioasă, Pătlăgică-de-dalac, Vița-evreilor, Zărnă. — Prin tufișuri și păduri umede, pe lângă pâraie și râuri, în locuri umede și umbroase pe lângă ziduri și garduri rustice, adesea. Ciorogârla în pădurea «Cotroceanca», abundant; Domnești, Ciutați în dumbravă; Măgurele prin tufișurile de Sălci de pe marginea Sabarului; Călugăreni, Crucea-de-piatră în pădurea «Crucea-de-peatră»; Budești, în pădurea de pe marginea râului Argeș; Oltenița în pădurea de pe marginea Dunărei, aproape de gura Argeșului; Chitila în pădure; Mănăstirea Pasărea, pe marginea pădurii «Cernica», spre șoseaua, ce duce la Brănești și pe marginea pădurii «Pasărea», frecvent; Mănăstirea Căldărușani, în pădurea Brânzeasca; Mănăstirea Snagov, cătunul Fundu, pe marginea lacului și pe insulele plutitoare (numite cocioac) din lacul «Snagov»; Mănăstirea Țigănești, în pădurea «Ciolpani», pe marginea lacului «Bălteni», pe drumul dintre pădurea «Ciolpani» și pădurea «Tâncăbești» și pe marginea pădurii Țigănești aproape de satul Țigănești, frecvent. 5. Iunie — August.

**Solanum nigrum** L. Sp. pl. ed. 1 (1753). 186 și ed. 2 (1762). 266. exclus. variet. STURM, Deutschlands Flora Heft 1. (1798). t. 4. KOCH, Syn.

ed. 2. 584. LEDEB. Fl. ross. III. 188. DUNAL în DC. Prodr. XIII. sect. I. 50. var.  $\beta$ . RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XX. 7. exclus. var.  $\gamma$ . și var.  $\delta$ . t. 10. BOISS. Fl. orient. IV. 284. FIEK, Fl. von Schlesien 314. exclus. var.  $\beta$ . HALLIER, Fl. von Deutschld. XVI. 249. t. 1599. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 954. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. X. 69. t. 16. COSTE, Fl. Franc. II. 614. GARCKE, III Fl. von Deutschld. 625. NYMAN, Consp. 526. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. II. 370 exclus. var.  $\gamma$ ,  $\delta$ ,  $\epsilon$ . WETTSTEIN în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. Abteilung 3 b. pag. 22. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 341 și Flora Dobrogei 290. GRECESCU, Conspect. fl. României 421 și Suplement 121. *Solanum vulgare* L. pro var. *S. nigri* apud SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 410. *Solanum Morella* DESV. subspec. *S. nigrum* MILL. apud ROUY, Fl. Franc. X. 364. — Vulg. Morea, Moartea-poreilor, Umbra-noptii, Zárnă. — Pe lângă garduri, pe drumuri, prin locuri cultivate și inculte, comună. Mănăstirea Căldărușani spre «Moara-Săracă», pe marginea pădurii «Brânzeasca». ☉. Iulie—August.

***Solanum miniatum*** BERNH. apud KOCH, Syn. ed. 2. 583. LEDEB. Fl. ross. III. 189. DUNAL în DC. Prodr. XIII. sect. I. 56. BOISS. Fl. orient. IV. 284. HALLIER, Fl. von Deutschld. XVI. 246. t. 1598. NYMAN, Consp. 526. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 410. WETTSTEIN în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. Abteilung 3 b. pag. 22. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 341. GRECESCU, Conspect. fl. României 421. *Solanum nigrum* L. var. *miniatum* BERNH. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XX. 7. t. 11. fig. III. și IV. *Solanum nigrum* L.  $\gamma$ . *miniatum* MERT. et KOCH. apud GREN. GODR. Fl. Franc. II. 543. *Solanum miniatum* MERT. et KOCH. apud COSTE, Fl. Franc. II. 614. *Solanum alatum* MOENCH. Meth. (1794). 474. apud BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 955. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 626. ROUY, Fl. Franc. X. 366. ca rassă dela subspec. *Solanum nigrum* L. Pe locuri de cultură, pe drumuri, lângă păduri. Mănăstirea Țigănești pe lângă pădurea «Țigănești», în apropiere de satul «Țigănești». ☉. Iulie—August.

***Solanum villosum*** LAMK. Encycl. méth. IV. (1797). 289. KOCH, Syn. ed. 2. 583. LEDEB. Fl. ross. III. 189. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 543. BOISS. Fl. orient. IV. 285. HALLIER, Fl. von Deutschld. XVI. 242. t. 1596. COSTE, Fl. Franc. II. 613. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 625. NYMAN, Consp. 526. WETTSTEIN în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. Abteilung 3 b. pag. 22. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 341. GRECESCU, Conspect. fl. României. 421. *Solanum villosum* L. apud BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 955. *Solanum nigrum* L. var.  $\gamma$ . *villosum* L. Sp. pl. ed. 1 (1753). 186 și ed. 2 (1762). 266. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. II. 370. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XX. 7. t. 11. fig. I. *Solanum luteum* MILL. apud ROUY, Fl. Franc. X. 366. ca subspecie. Prin locuri de cultură, prin miriști pe drumuri în pie-

trișuri. Mănăstirea Țigănești, pe drumul dintre pădurea «Ciolpani» și pădurea «Tâncăbești». ☉. Iulie—Septemvrie.

**Datura Stramonium** L. Sp. pl. ed. 1 (1753). 179 și ed. 2 (1762). 255. KOCH, Syn. ed. 2. 586. LEDEB. Fl. ross. III. 182. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 546. DUNAL în DC. Prodr. XIII. sect. I. 540. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich. 533. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XX. 3. t. 3. fig. I. BOISS. Fl. orient. IV. 292. FIEK, Fl. von Schlesien 316. HALLIER, Fl. von Deutschld. XVI. 281. t. 1610. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 956. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. X. 64. fig. 4, dela pag. 65. COSTE, Fl. Franc. II. 616. ROUY, Fl. Franc. X. 371. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 628. NYMAN, Consp. 523. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 412. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 405. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. II. 362. WETTSTEIN în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. Abteilung 3 b. pag. 27. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 344. și Flora Dobrogei 291. GRECESCU, Conspect. fl. României 423. — Vulg. Alaur, Bolândariță, Ciurmafaie, Ciurma-fetei, Laur, Măru-porcului, Turbare. — Pe locuri cultivate și inculte, pe lângă garduri, prin dărâmături și pe marginea drumurilor, comună. București, la Cotroceni pe marginea Dâmboviței; Mănăstirea Căldărușani, pe marginea drumului spre «Moara-Săracă». ☉. Iunie—Septemvrie.

### SCROPHULARIACEAE

**Verbascum phlomoides** L. Sp. pl. ed. 1 (1753). 1194 și ed. 2 (1762). 253. KOCH, Syn. ed. 2. 587. BENTH. în DC. Prodr. X. 227. LEDEB. Fl. ross. III. 195. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 549. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XX. 13. t. 18. fig. II. BOISS. Fl. orient. IV. 301. exclus. synonym. FIEK, Fl. von Schlesien 318. HALLIER, Fl. von Deutschld. XVII. 42. t. 1613. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 1031. COSTE, Fl. Franc. II. 620. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 632. ROUY, Fl. Franc. XI. 7. NYMAN, Consp. 526. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 413. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 406. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. II. 375. WETTSTEIN în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. Abteilung 3 b. pag. 51. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 344 și Flora Dobrogei 293. GRECESCU, Conspect. fl. României 425 și Supplement 122. — Vulg. Coada-boului, Coada-lupului, Coada-mielului, Coada-vacei, Corovatic, Lumânare, Lumânărică, Lumânărica-Domnului, Lipan, Pur. — Pe coline aride și pe marginea drumurilor în câmpii năsi-poase prin locuri inculte, în livezi și prin văile râurilor, adesea. Ciorogârla, pe lângă pădurea «Cotrocenca»; Călugăreni, Crucea-de-piatră, pe marginea pădurii «Uzun»; Cățelu, pe lângă linia fortului; Mănăstirea Cernica, pe câmp și pe marginea pădurii «Cernica», frecvent; Ștefănești spre Dascălu

pe marginea șoselei; Mănăstirea Căldărușani, pe marginea pădurii «Brânzeasca»; Mănăstirea Țigănești, pe drumul dintre pădurea «Ciolpani» și pădurea «Tâncăbești» și pe marginea pădurii «Ciolpani», frecvent. ☉. Iulie—August.

β. **nemosum** SCHRAD. apud BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 1031. var. *nemosum* RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XX. 13. t. 20. GRECESCU, Consp. fl. României 425. *Verbascum phlomooides* L. var. γ. apud BRÂNDZĂ, Flora Dobrogei 293. *Verbascum nemorosum* SCHRAD. Monogr. Generis Verbasci (1813). 32. t. I. fig. 2. — Foile superioare și mijlocii oblong-lanceolate și scurt decurente. — Ciorogârla în pădurea «Cotroceanca»; Comana, la «Padina-lui-Vasile», la Budești, în pădurea de pe marginea râului Argeș, uneori împreună cu forma tipică însă mult mai rară.

**Verbascum Blattaria** L. Sp. pl. ed. 1 (1753). 178 și ed. 2 (1762). 254. KOCH, Syn. ed. 2. 589. BENTH. în DC. Prodr. X. 230. LEDEB. Fl. ross. III. 196. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 553. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 542. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XX. 13. t. 32. BOISS. Fl. orient. IV. 308. FIEK, Fl. von Schlesien 319. HALLIER, Fl. von Deutschld. XVII. 71. t. 1623. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 1038. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. X. 87. COSTE, Fl. Franc. II. 622. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 631. ROUY, Fl. Franc. XI. 10. NYMAN, Consp. 528. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 416. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 410. HALÁCSY, Consp. Fl. Graec. II. 393. WETTSTEIN în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. Abteilung 3 b. pag. 51. BRÂNDZĂ, Prodr. II. române 345 și Flora Dobrogei 295. GRECESCU, Consp. fl. României 426 și Supplement 122. Prin livezi, câmpuri, pe coaste, în locurile umede argiloase și năsipose de pe marginea râurilor, pe lângă drumuri și pe marginea pădurilor prin tufșuri, adesea. Ciorogârla, în pădurea «Cotroceanca», frecvent; Malul-spart, în pădurea «Căscioreanca» spre margine; Măgurele, pe locurile umede de pe marginea Sabarului; Călugăreni, Crucea de-piatră, pe marginea pădurii «Crucea de-piatră» și pe marginea sămănăturilor; Budești, în pădurea de pe marginea râului Argeș; Mănăstirea Cernica, pe marginea pădurii «Cernica»; Mănăstirea Căldărușani, pe marginea drumului spre «Moara-Săracă»; Mănăstirea Țigănești, pe marginea pădurii «Ciolpani». ☉. Iunie—Iulie.

**Verbascum nigrum** L. Sp. pl. ed. 1 (1753). 178 și ed. 2 (1762). 253. KOCH, Syn. ed. 2. 588. BENTH. în DC. Prodr. X. 238. LEDEB. Fl. ross. III. 201. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 552. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 540. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XX. 17. t. 28. fig. I. BOISS. Fl. orient. IV. 328. FIEK, Fl. von Schlesien 318. HALLIER, Fl. von Deutschld. XVII. 58. t. 1619. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 1036. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. X. 86. COSTE, Fl. Franc. II. 622. GARCKE, III. Fl. von

Deutschld. 631. ROUY, Fl. Franc. XI. 15. SCHRADER, Monogr. Generis Verbasci sect. II (1822). 168. NYMAN, Consp. 530. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 414. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 416. WETTSTEIN, în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. Abteilung 3 b. pag. 51. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 346; Contribuțiunii nouă la Flora României (1889). pag. 19. și Flora Dobrogei 294. GRECESCU, Conspect. fl. României 428 și Suplement 122. — Vulg. Căptalan-negru, Somnoroasă. — Pe marginea pădurilor, prin fânețele de pe coline, pe lângă drumuri, în tufișuri și pe malul râurilor, adesea. Ciorogârla, pe marginea pădurii «Cotroceanca», abundent; Comana, la «Pădina-lui-Vasile», pe marginea pădurii, frecvent; Oltenița, pe marginea șoselei București-Oltenița, adesea; Mănăstirea Cernica, pe marginea pădurii «Cernica»; Mănăstirea Țigănești, pe marginea pădurii «Ciolpani» și pe drumul dintre pădurea «Ciolpani» și pădurea «Tâncăbești»; Mănăstirea Snagov, pe insulă. ☉ sau 4. Iunie—August.

**Verbascum orientale** M. BIEB. Fl. Taurico-Cauc. I (1808). 160. și III (1819). 154. SCHRADER, Monogr. Generis Verbasci sect. II (1822). 167. No. 35. BOISS. Fl. orient. IV. 330. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 1037. NYMAN, Consp. 531. GRECESCU, Conspect. fl. României 428. Pe locuri necultivate, pe coastele uscate și pe marginea pădurilor, în tufișuri, adesea. Domnești, Ciutați, în dumbravă; Călugăreni, Crucea-de-piatră, pe marginea pădurii «Uzun»; Comana, pe marginea pădurii; Mănăstirea Pasărea, pe marginea pădurii «Pasărea»; Mănăstirea Căldărușani, pe marginea pădurii «Brânzeasca», frecvent. ☉. Iunie—August.

**Verbascum austriacum** SCHRADER, Monogr. Generis Verbasci sect. II (1822). 166. No. 34. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XX. 17. t. 28. fig. II. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 1037. *Verbascum Austriacum* SCHOTT. in RÖM. et SCHULT. Syst. IV (1819). 341. apud SIMONKAI, Enum. 414. WETTSTEIN în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. Abteilung 3 b. pag. 51. GRECESCU, Conspect. fl. României 428 și Suplement 122. *Verbascum virens* HOST., *Verbascum orientale* M. BIEB. β. *tenui-tomentosum* MERT. et KOCH. apud LINDEMANN, Fl. Cherson. II. 43. Pe locuri necultivate, dealuri, câmpuri, pe marginea pădurilor, adesea. Ciorogârla, în pădurea «Cotroceanca»; Mănăstirea Căldărușani, pe marginea pădurii «Brânzeasca». ☉. Iunie—August.

**Verbascum phoeniceum** L. Sp. pl. ed. 1 (1753). 178 și ed. 2 (1762). 254. KOCH, Syn. ed. 2. 589. BENTH. în DC. Prodr. X. 242. LEDEB. Fl. ross. III. 202. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 542. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XX. 19. t. 31. fig. I. BOISS. Fl. orient. IV. 346. FIEK, Fl. von Schlesien 318. HALLIER, Fl. von Deutschld. XVII. 68. t. 1622. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 1038. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. X. 88. fig. 6.



GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 630. NYMAN, Consp. 531. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 416. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 416. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. II. 394. WETTSTEIN în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. Abteilung 3 b. pag. 51. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 347 și Flora Dobrogei 295. GRECESCU, Conspect. fl. României 430 și Supplement 122. — Vulg. Coada-mielului, Coada-lupului-vânăta. — Pe coline uscate, prin livezi, crânguri, în rârișuri, poieni și pe marginea pădurilor, adesea. Ciorogârla, pe marginea pădurii «Cotoceanca»; Comana, pe marginea pădurii; Chitila, pe marginea pădurii, frecvent; Mănăstirea Cernica, în pădurea «Cernica» și la margine cam în dreptul șoselei, ce duce la «Cozieni»; Mănăstirea Pasărea, în pădurea «Pasărea», frecvent; Mănăstirea Căldărușani, spre «Moara-Saracă», în pădurea «Brânzeasca». 4. Maiu—Iunie.

**Elatinoides Elatine** WETTSTEIN în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien. IV. Teil. Abteilung 3 b. pag. 58. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 638. *Linaria Elatine* MILL. Dict. No. 16. (1785). STURM, Deutschlands Flora Heft 70 (1836). t. 11. KOCH, Syn. ed. 2. 599. BENTH. în DC. Prodr. X. 268. LEDEB. Fl. ross. III. 205. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 544. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XX. 30 t. 59. fig. IV. FIEK, Fl. von Schlesien 323. HALLIER, Fl. von Deutschld XVII. 219. t. 1675. COSTE, Fl. Franc. III. 17. ROUY, Fl. Franc. XI. 66. NYMAN, Consp. 542. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 424. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 351 și Flora Dobrogei 297. GRECESCU, Conspect. fl. României 432 și Supplement 123. *Linaria Elatine* DESF. apud. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 574. *Linaria Elatine* L. sub. *Antirrhino*. apud BOISS. Fl. orientalis IV. 367. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 418. *Antirrhinum Elatine* L. Sp. pl. ed. 1 (1753). 612. și ed. 2 (1762). 851. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. X. 114. t. 22. *Elatine hastata* MOENCH (1794). *Cymbalaria Elatine* BMGT. *Kickxia elatine* DUMORT (1827). apud BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 1041. Pe câmp prin arături, miriști, pe lângă garduri, drumuri, vii în terenuri calcaroase și argiloase. Periș, lângă gară, prin arăturile de pe câmp. ☉. Iulie — Septemvrie.

**Elatinoides spuria** WETTSTEIN în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien. IV. Teil. Abteilung 3 b. pag. 58. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld 639. *Linaria spuria* MILL. Dict. No. 15 (1785). STURM, Deutschlands Flora Heft 70 (1836). t. 12. KOCH, Syn. ed. 2. 599. BENTH, în DC. Prodr. X. 268. LEDEB. Fl. ross. III. 204. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 574. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 544. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XX. 30. t. 59. fig. II. FIEK, Fl. von Schlesien 324. HALLIER, Fl. von Deutschld XVII. 223. t. 1677. COSTE, Fl. Franc. III. 17. ROUY, Fl. Franc. XI. 65. NYMAN, Consp. 542. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 423. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 351. GRECESCU, Conspect. fl. României 432. *Linaria spuria* L. sub *Antirrhino*. apud BOISS.

fl. orient. IV. 366. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 418. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. II. 414. *Antirrhinum spurium* L. Sp. pl. ed. 1 (1753). 613 și ed. 2 (1762). 851. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. X. 114. t. 23. *Cymbalaria spuria* BMGT., *Kickxia spuria* DUMORT. (1827). apud BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 1041. Pe câmp prin arături, miriști, ogoare și prin locuri necultivate, mai cu samă în terenuri nășipoase și argiloase. Palanga, prin sămănăturile de pe marginea pâraului Răstoaca (legit GH. N. BOTEZ).  
 ☉. Iulie — Septemvrie.

Această plantă este nouă pentru Flora Bucureștilor, căci n'a mai fost până acum citată de nimeni din această regiune.

**Linaria vulgaris** MILL. Dict. ed. 8. No. 1 (1785). KOCH, Syn. ed. 2. 602. BENTH. în DC. Prodr. X. 273. LEDEB. Fl. ross. III. 206. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 546. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XX. 32. t. 64. fig. II. BOISS. Fl. orient. IV. 372. FIEK, Fl. von Schlesien 325. HALLIER, Fl. von Deutschld XVII. 251. t. 1690. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 1041. COSTE, Fl. Franc. III. 20. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 638. ROUY, Fl. Franc. XI. 74. NYMAN, Consp. 537. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. II. 412. GRECESCU, Conspect. fl. României 430. BRÂNDZĂ, Flora Dobrogei 297. *Linaria vulgaris* L. apud VELENOVSKY, Fl. Bulg. 424. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 352. *Linaria vulgaris* MOENCH. apud GREN. GODR. Fl. Franc. II. 576. *Antirrhinum Linaria* L. Sp. pl. ed. 1 (1753). 616. ed. 2 (1762). 858. STURM, Deutschlands Flora Heft. 18. (1804). t. 13. *Linaria Linaria* WETTSTEIN în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. Abteilung 3 b. pag. 59 — Vulg. Buruiiană-de-in, Gura-măței, In-sălbatic, Inișor-de-alior, Inărică, Linariță, Trăpănag. — Prin locuri cultivate și inculte, pe câmpuri nășipoase, pe marginea pădurilor în livezi, pe lângă garduri, ziduri și pe marginea drumurilor, comună. Băcu, spre Arcuda pe lângă filtre; Ciorogârla, pe marginea pădurii «Cotroceanca», frecventă; Măgurele, pe marginea Sabarului; Păslari, spre Pârliți printre vii; Călugăreni, Crucea-de-piatră pe marginea pădurii «Uzun»; Comana, pe marginea drumului, lângă pădure; Oltenița, pe marginea șoselei spre București; Chitila, pe marginea drumurilor; Mănăstirea Pașărea, pe marginea pădurii «Pașărea»; Mănăstirea Căldărușani pe marginea drumului spre «Moara-Săracă»; Mănăstirea Țigănești, pe marginea pădurii «Ciolpani» spre lacul «Bălteni», și pe marginea pădurii «Țigănești», aproape de satul «Țigănești». 4. Iunie — Septemvrie.

**Linaria genistifolia** MILL. Dict. ed. 8. No. 14 (1785). KOCH, Syn. ed. 2. 601. BENTH. în DC. Prodr. X. 275. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 545. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XX. 34. t. 65. fig. I. FIEK, Fl. von Schlesien 325. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 1040. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld

638. WETTSTEIN în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. Abteilung 3 b. pag. 59. BRÂNDZĂ, Flora Dobrogei 297. GRECESCU, Conspect. fl. României 431. *Linaria genistaefolia* Mill. apud LEDEB. F. ross. III. 209. HALLIER, Fl. von Deutschld XVII. 247. t. 1688. NYMAN, Consp. 538. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 425. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 352. *Linaria genistifolia* L. sub. *Antirrhino* apud BOISS. Fl. orient. IV. 377. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 419. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. II. 409. *Antirrhinum genistifolium* L. Sp. pl. ed. 1 (1753). 616 și ed. 2 (1762). 858. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld X. 116. Pe coastele expuse soarelui, pe locuri năsipose și calcaroase, în tufișuri, în câmpuri pe marginea drumurilor. Oltenița, pe marginea șoselei spre București; Mănăstirea Pasărea, pe marginea pădurii «Cernica», lângă șoseaua ce duce spre Brănești. 4. Iulie — August.

*Linaria dalmatica* MILL. Dict. ed. 8. No. 13 (1785). BENTH. în DC. Prodr. X. 275. LEDEB. Fl. ross. III. 209. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XX. 34. t. 65. fig. II și III. NYMAN, Consp. 538. GRECESCU, Conspect. fl. României 431 și Supplement 123. *Linaria dalmatica* L. sub *Antirrhino* apud BOISS. Fl. orient. IV. 376. exclus. variet. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 418. PORCIUS, Diagn. 213. *Antirrhinum dalmaticum* L. Sp. pl. ed. 1 (1753). 616 și ed. 2 (1762). 857. Pe locuri cultivate și necultivate, în câmpuri prin grâne, prin vie, pe lângă păduri și pe marginea drumurilor, adesea. Călugăreni, în câmp pe marginea sămănăturilor și prin fânețe, frecvent; Comana, pe marginea drumului de fier spre stația «Mihai-Bravul»; Gruiu, pe marginea șoselei București-Oltenița; Chitila, pe marginea șoselei; Mănăstirea Cernica, pe marginea sămănăturilor, pe marginea pădurii «Cernica» și prin rărișurile și poienile din pădure, adesea; Mănăstirea Căldărușani, pe marginea șoselei spre «Moara-Săracă», pe lângă pădurea «Brânzeasca»; Mănăstirea Snagov, pe marginea șoselei. 4. Iunie — Iulie,

*Scrophularia nodosa* L. Sp. pl. ed. 1 (1753). 619 și ed. 2 (1762). 863. STURM, Deutschlands Flora Heft 23 (1807). t. 14. KOCH, Syn. ed. 2. 593. BENTH. în DC. Prodr. X. 309. LEDEB. Fl. ross. III. 218. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 566. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 543. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XX. 25. t. 53. BOISS. fl. orient. IV. 399. FIEK, Fl. von Schlesien 321. HALLIER, Fl. von Deutschld. XVII. 75. t. 1624. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 1043. NYMAN, Consp. 533. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 420. WETTSTEIN în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. Abteilung 3 b. pag. 65. BRÂNDZĂ, Prodr. Fl. române 348 și Flora Dobrogei 295. GRECESCU, Conspect. fl. României 433. *Scrophularia nodosa* L. apud COSTE, Fl. Franc. III. 7. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 632. ROUY, Fl. Franc. XI. 91. KRAUSE în LUTZ, Sturms. Fl. von Deutschld. X. 94. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 416. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. II. 401. — Vulg. Brâncă, Brânca-

porcului, Buberi, Frunză-de-bubă-rea, Iarbă-neagră, Poală, Urzică-neagră. — Prin pădurile și tufișurile umede, pe lângă garduri, pe marginea râurilor, bălților și a pâraielor, adesea. Ciorogârla, în pădurea «Cotroceanca»; Malul-Spart, în pădurea «Căscioreanca», frecventă; Budești, în pădurea de pe marginea râului Argeș; Mănăstirea Cernica, în pădurea «Cernica»; Mănăstirea Pasărea, în pădurea «Pustnicu», abundentă; Mănăstirea Țigănești, pe marginea pădurii «Țigănești», aproape de satul Țigănești, frecventă. 4. Mai—August.

**Scrophularia Scopolii** HOPPE. în PERS. Syn. II. (1807). 160. KOCH, Syn. ed. 2. 594. BENTH. în DC. Prodr. X. 308. LEDEB. Fl. ross. III. 217. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 543. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XX. 26. t. 54. fig. III. BOISS. Fl. orient. IV. 395. FIEK, Fl. von Schlesien 322. HALLIER, Fl. von Deutschld. XVII. 84. t. 1627. NYMAN, Consp. 533. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 416. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 421. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. II. 400. WETTSTEIN în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. Abteilung 3 b. pag. 65. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 349. GRECESCU, Conspect. fl. României 433 și Supplement 123. *Scrophularia Scopolii* HOPPE. apud GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 633. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. X. 96. *Scrophularia auriculata* SCOP. Fl. Carn. ed. 2. I (1772). 446. t. 32. non L. *Scrophularia glandulosa* W. et KIT. Descript. et icon. pl. rar. Hung. III. (1812). 238. t. 214.— Prin păduri și tufișuri în locuri uscate, pe lângă gardurile dela sate pe locuri necultivate nu tocmai frecventă. Ciorogârla, în pădurea «Cotroceanca»; Călugăreni, Crucea-de-piatră în pădurea «Uzun»; Comana, prin pădure în locuri uscate. 4. Iunie—August.

**Gratiola officinalis** L. Sp. pl. ed. 1 (1753). 17 și ed. 2 (1762). 24. KOCH, Syn. ed. 2. 595. BENTH. în DC. Prodr. X. 404. LEDEB. Fl. ross. III. 224. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 584. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 549. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XX. 28. t. 56. BOISS. Fl. orient. IV. 426. FIEK, Fl. von Schlesien 326. HALLIER, Fl. von Deutschl. XVII. 189. t. 1666. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 1044. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. X. 99. fig. 7. dela pag. 100. COSTE, Fl. Franc. III. 23. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 635. ROUY, Fl. Franc. XI. 97. NYMAN, Consp. 536. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 417. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 423. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. II. 407. WETTSTEIN în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. Abteilung 3 b. pag. 76. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 349 și Flora Dobrogei 296. GRECESCU, Conspect. fl. României 434. — Vulg. Milostivă, Mila-Domnului, Potroacă, Veninariță. — Pe locuri umede prin mlaștini, bălți, șanțuri cu apă, în fânețe umede prin lunci și zăvoaie, pe malurile apelor, adesea. București, la «Moara-lui-Ciurel» prin locurile băltoase din lunca Dâmboviței, frecvent și în locuri umede la Filaret în

câmp, pe marginea drumului de fier; Satu-nou, pe locurile inundate de pe marginea șoselei; apoi la Ciorogârla, pe locurile umede din pădurea «Cotrocea»; Tântava, pe marginea pădurii «Tântava»; Malul-Spart, în pădurea «Căscioareanca»; Măgurele, pe locurile umede de pe marginea Sabarului; Călugăreni, Crucea-de-piatră, pe marginea pădurii «Crucea-de-piatră»; Comana, la «Padina-lui-Vasile»; Oltenița, pe locurile umede de pe marginea șoselei spre București; Mănăstirea Cernica, pe marginea pădurii «Cernica»; Mănăstirea Pasărea, în șanțul de pe marginea șoselei dintre «Cozieni» și «Pantelimon» și în pădurea, «Pasărea» frecventă; Mănăstirea Căldărușani, în pădurea «Brânzeasca» pe locuri umede; Mănăstirea Țigănești, pe marginea pădurii «Ciolpani» spre lacul «Bălteni». 4. Iunie—August.

**Veronica scutellata** L. Sp. pl. ed. 1 (1753). 12 și ed. 2 (1762). 16. STURM, Deutschlds Flora Heft. 58. (1831). t. 3. KOCH, Syn. ed. 2. 603. BENTH. în DC. Prodr. X. 475. LEDEB. Fl. ross. III. 244. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 589. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 552. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XX. 46. t. 82. fig. II. și III. FIEK, Fl. von Schlesien 328. HALLIER, Fl. von Deutschld XVII. 96. t. 1633. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 1051. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. X. 140. t. 35. COSTE, Fl. Franc. III. 33. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 641. ROUY, Fl. Franc. XI. 37. NYMAN, Consp. 546. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 420. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 427. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. II. 428. WETTSTEIN în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. Abteilung. 3 b. pag. 86. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 353. GRECESCU, Conspect. fl. României 435 și Supplement 123. Pe locuri umede mlăștinoase, prin bălți, pe marginea apelor, în fânețe umede, adesea. Ciorogârla, pe locurile umede de pe marginea pădurii «Cotrocea», frecventă; Malul-Spart, pe locuri umede în pădurea «Căscioareanca»; Mănăstirea Țigănești, pe locurile mlăștinoase de pe marginea pădurii «Țigănești», aproape de satul Țigănești. 4. Iunie—August.

**Veronica Anagallis** L. Sp. pl. ed. 1 (1753). 12 și ed. 2 (1762). 16. KOCH, Syn. ed. 2. 603. BENTH. în DC. Prodr. X. 467. LEDEB. Fl. ross. III. 236. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 589. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 553. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XX. 47. t. 81. BOISS. Fl. orient. IV. 437. FIEK, Fl. von Schlesien 329. HALLIER, Fl. von Deutschld. XVII. 99. t. 1634. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 1051. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 641. COSTE Fl. Franc. III. 32. ROUY. Fl. Franc. XI. 38. NYMAN, Consp. 546. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 421. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 427. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. II. 429. WETTSTEIN în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. Abteilung 3 b. pag. 86. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 353. GRECESCU, Conspect. fl. României 435 și Supplement 123. PANȚU, Contrib. nouă la Flora Ceahlăului 29. Pe locuri umede, pe marginea apelor, prin mlăș-

țini, bălți, păraie și izvoare, adesea. Călugăreni, Crucea-de-piatră, pe locurile mlăștinoase de pe marginea pădurii «Uzun» și în pădurea «Crucea-de-piatră», pe locurile umede dela «Șipot», frecventă; Comana, la «Stubeiul-cu-apă-rece»; Băneasa lângă București, pe marginea apei Colentina; Chitila, pe locurile umede de pe marginea Colentinei, frecventă. 4. Maiu—August.

**Veronica anagalloides** GUSS. Pl. rar. 5. (1826). t. 3. BENTH. în DC. Prodr. X. 468. LEDEB. Fl. ross. III. 236. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 589. BOISS. Fl. orient. IV. 437. FIEK, Fl. von Schlesien 329. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 1052. COSTE. Fl. Franc. III. 32. PORCIUS, Diagnos. 215. NYMAN, Consp. 546. SIMONKAI. Enum. Fl. Transs. 421. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. II. 429. WETTSTEIN în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. Abteilung 3 b. pag. 86. BRÂNDZĂ, Flora Dobrogei 299. ROUY, Fl. Franc. XI. 39. ca rassă dela specia *Veronica Anagallis* L. *Veronica Anagallis* L. var. *c. anagalloides* RCHB. Icon. fl. germ. et. helv. XX. 47. t. 81. fig. III. GRECESCU, Conspect. fl. României 435 și Supplement 124. *Veronica Anagallis* L. var. *c. anagalloides* GUSS. apud GARCKE, III. Fl. von Deutschld 641. *Veronica Anagallis* L. var. *e. glandulosa* SCHUR. Enum. pl. Transs. 492. et *Veronica salina* SCHUR. l. c. LINDEMANN. Fl. Cherson. II. 51. *Veronica Anagallis* L. *α. limosa* NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 553. — Prin locuri umede, pe marginea apelor, prin mlaștini, bălți, păraie, destul de frecventă. București, la «Moara-lui-Ciurel», prin bălțile din lunca Dâmboviței, abundentă; Oltenița, pe locurile umede de pe marginea șoselei București-Oltenița, pe la klm. 57 până la 61. 4. Maiu—August.

**Veronica Velenovskyi** Uechtr. în VELENOVSKY, Fl. Bulg. 427. ADAMOVIČ, Die Vegetationsverhältnisse der Balkanländer (Mösische Länder); pag. 504. — Pe locurile umede și mlăștinoase de pe marginea apelor. Pâslari spre Pârliți, în «Valea-Crividon» și la Călugăreni, Crucea-de-piatră, pe locurile mlăștinoase, în lunca Câlniștei, frecventă. 4. Iulie — August.

Această interesantă și rară plantă, fiind cu totul nouă pentru Flora României, publicăm aici diagnoza ei originală:

Perennis, glabra, caule basi radicanti-repente parte foliosa ascendente tandem recta, foliis acutis minute denticulatis rarius subintegris, inferioribus rotundato rhombeis in petiolum longiusculum cuneatis, mediis lanceolato-rhombis basi cuneata sessilibus vel breviter petiolatis, summis anguste lanceolatis valde diminutis breviter petiolatis, racemis floriferis folio fulcrante 3—6 plo longioribus strictis multifloris pedicellis fructiferis tenuissimis bractea lineari 3—5 plo longioribus angulo acuto patule arcuatis, capsula orbiculari calycis laciniis lineari-lanceolatis sublongiore compressa vix in centro paulisper inflata antice evidenter acute retusa, corolla coerulea. Floret julio, agosto.

Caulis 6—20 cm. altus, capsula circa 2 mm., folia inferiora 1 cm. longa et lata, media 2 cm.  $\times$  1 cm.

In uliginosis ad lacum Devno inter Varna et Kebedze copiose (Vel. 1885).

Species inter *V. Anagallidem* et *V. Beccabungam* quasi intermedia sed certissime species pura nec hybridae originis, nam fert ubique semina bene matura evolutaque et crescit stationibus indicatis in copia vasta utramque memoratam opprimens. *V. Beccabunga* ab ea differt: caule robustiore foliis omnibus petiolatis duplo majoribus obtusis ellipticis superioribus parum diminutis, racemis folio fulcrante duplo longioribus, pedicellis fructiferis bracteis vix longioribus, capsula majore *vix reclusa turgido-inflata*.

ADAMOVIĆ în Vegetationsverhältnisse der Balkanländer, pag. 504, consideră *Veronica Velenovskyi* ca endemism scardo-pindic, cunoscută fiind din Macedonia, Serbia veche și din Serbia și Bulgaria.

In erbariul RICHTER LAJOS, astăzi proprietatea Institutului nostru botanic, am văzut *Veronica Velenovskyi* UECSTR. din Ungaria centrală lângă Budapesta, culeasă de regretatul botanist BORBÁS. Prin constatarea acestei interesante și rari plante și la noi în România lângă București se mărește încă și mai mult aria ei geografică.

**Veronica Beccabunga** L. Sp. pl. ed. 1 (1753). 12 și ed. 2 (1762). 16. STURM, Deutschlands Flora Heft 12. (1802). t. 1. KOCH, Syn. ed. 2. 603. BENTH. în DC. Prodr. X. 468. LEDEB. Fl. ross. III. 237. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 588. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 553. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XX. 47. t. 80. BOISS. fl. orient. IV. 438. FIEK, Fl. von Schlesien 329. HALLIER, Fl. von Deutschld. XVII. 102. t. 1635. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 1050. Krause în Lutz, Sturms Fl. von Deutschld. X. 131. t. 36. COSTE, Fl. Franc. III. 32. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 641. ROUY, Fl. Franc. XI. 39. NYMAN, Consp. 546. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 421. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 428. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. II. 429. WETTSTEIN în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. Abtheilung 3 b. pag. 86. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 353 și Flora Dobrogei 300. GRECESCU, Conspect. fl. României 435. — Vulg. Blăbornică, Bobálnic, Bobornic. Bobovnic, Bribornic, Bribovnic, Pribolnic. — Prin mlaștini, ape stagnante, bălți, păraie, izvoare și pe malul apelor, adesea. Chitila, în locurile umede mlăștinoase de pe marginea pădurii, frecventă; Băneasa, pe marginea apei Colentina; Mănăstirea Cernica, pe locuri umede mlăștinoase «La-Anini». 4. Mai — August.

**Veronica Chamaedrys** L. Sp. pl. ed. 1 (1753). 13 și ed. 2 (1762). 17. STURM, Deutschlands Flora Heft 58. (1831). t. 6. KOCH, Syn. ed. 2. 603. BENTH. în DC. Prodr. X. 474. LEDEB. Fl. ross. III. 243. GREN. GODR. Fl.

Franc. II. 587. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 555. RCHB. Icon. Fl. germ. et. helv. XX. 51. t. 83. fig. II—IV. BOISS. Fl. orient. IV. 446. FIEK, Fl. von Schlesien 330. HALLIER, Fl. von Deutschld. XVII. 107. t. 1637. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 1052. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. X. 136. t. 37. COSTE, Fl. Franc. III. 34. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 640. ROUY, Fl. Franc. XI. 40. NYMAN, Consp. 546. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 421. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 428. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. II. 426. WETTSTEIN în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. Abteilung 3 b. pag. 86. BRÂNDZĂ, Prodr. Fl. române 354 și Flora Dobrogei 300. GRECESCU, Conspect. fl. României 436 și Suplement 124 — Vulg. Șopârliță. — Prin fânețe în livezi, poieni și rărișuri, în tufișuri pe marginea pădurilor, comună. Ciorogârla, pe marginea pădurii «Cotroceanca», frecventă; Malul-Spart, în pădurea «Căscioreanca»; Copăceni spre Jilava, în pădurea de pe marginea șoselei; Călugăreni, Crucea-de-piatră, pe marginea pădurii «Uzun» și în pădurea «Crucea-de-piatră», adesea; Comana, pe marginea pădurii și prin rărișuri și poieni, frecventă; Chitila, pe marginea pădurii, abundentă; București, Colentina, în pădurea «Andronache»; Mănăstirea Pasărea, pe marginea pădurii «Cernica», pe lângă baltă, pe marginea pădurii «Pustnicu» și prin pădurea «Pasărea», frecventă; Mănăstirea Căldărușani, în rărișurile și poienile din pădurea «Brânzeasca»; Mănăstirea Țigănești, în pădurea «Ciolpani», adesea. 4. Aprilie — Iunie.

**Veronica officinalis** L. Sp. pl. ed. 1 (1753). 11 și ed. 2 (1762). 14. Sturm, Deutschlands Flora Heft 58, (1831) t. 4. KOCH, Syn. ed. 2. 604. BENTH. în DC. Prodr. X. 472. LEDEB. Fl. ross. III. 241. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 591. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 554. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XX. 49. t. 85. fig. I. II. BOISS. Fl. orient. IV. 451. FIEK, Fl. von Schlesien 330. HALLIER, Fl. von Deutschld. XVII. 113. t. 1639. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 1053. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. X. 137. t. 40. COSTE, Fl. Franc. III. 33. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 641. ROUY, Fl. Franc. XI. 41. NYMAN, Consp. 545. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 422. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 429. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. II. 426. WETTSTEIN în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. Abteilung 3 b. pag. 86. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 355. GRECESCU, Conspect. fl. României 436. și Suplement 124. *Veronica officinarum* CRANTZ. — Vulg. Buruiene-de-cel-pierit, Strătorică, Ventrilică. — Prin păduri uscate, prin livezi și pășuni, pe coaste, adesea. Ciorogârla, în pădurea «Cotroceanca», frecventă; Malul-Spart, în pădurea «Căscioreanca», adesea; Mănăstirea Cernica, în pădurea «Cernica»; Mănăstirea Țigănești, în pădurea «Ciolpani». 4. Maiu — Iulie.

**Veronica prostrata** L. Sp. pl. ed. 2 (1762). 17. STURM, Deutschlands Flora



- Heft 58 (1831). t. 9. KOCH, Syn. ed. 2. 604. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 587. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 556. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XX. 52. t. 87. FIEK, Fl. von Schlesien 330. HALLIER, Fl. von Deutschld. XVII. 119. t. 1641. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 1053. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. X. 134. t. 41. COSTE, Fl. Franc. III. 34. GARCKE, III. Fl. von Deutschld 639. NYMAN, Consp. 545. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 422. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 429. WETTSTEIN în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. Abteilung 3 b, pag. 86. BRÂNDZĂ. Prodr. fl. române 355 și Flora Dobrogei 300. GRECESCU, Conspect. fl. României 437.
- Veronica prostrata* L. ca subspecie dela *Veronica Teucrium* VAHL. apud ROUY, Fl. Franc. XI. 42. — Vulg. Coada-mielului. — Prin fânețe năsi-poase și pășuni uscate, pe coastele pietroase expuse soarelui, prin rășișuri, poieni și pe marginea pădurilor, adesea. Chitila, pe marginea pădurii, frecventă; Mănăstirea Cernica, «La-Anini», pe coaste; Mănăstirea Pasărea, pe marginea pădurii «Cernica» și în pădurea «Pasărea»; Mănăstirea Căldărușani, pe marginea pădurii în livadia «Părită», frecventă. 4. Aprilie—Iunie.
- Veronica austriaca* L. Sp. pl. ed. 2 (1762). 17. BENTH. în DC. Prodr. X. 470. HALLIER, Fl. von Deutschld. XVII. 121. t. 1642. A. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 1054. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 640. KERNER în Oesterr. botan. Zeitschr. XXIII (1873). 372. KERNER, Schedae ad Fl. exicc. austro-hung. III. pag. 92. NYMAN, Consp. 545. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 422. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. II. 427. WETTSTEIN în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. Abteilung 3 b, pag. 86. GRECESCU, Conspect. fl. României 437 și Supplement 124. *Veronica dentata* SCHMIDT, apud STURM, Deutschlands Flora Heft 58, (1831). t. 10. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 429. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 355. *Veronica austriaca* L. *v.* *dentata* KOCH. Syn. ed. 2. 605. LEDEB. Fl. ross. III. 238. *Veronica Teucrium* L. *b.* *dentata* SCHMIDT în FIEK, Fl. von Schlesien 331; *Veronica Schmidii* R et SCHULT. Pe locuri năsi-poase și pietroase, în livezi și pășuni uscate, în tufișuri, pe coastele expuse soarelui, adesea. Călugăreni, Crucea-de-piatră, pe marginea pădurii «Uzun»; Mănăstirea Pasărea, pe marginea pădurii Pasărea. 4. Mai—Iunie.
- Veronica multifida* L. Sp. pl. ed. 2 (1762). 17. BENTH. în DC. Prodr. X. 471. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 640. KERNER, Oesterr. botan. Zeitschr. XXIII (1873). 373. KERNER, Schedae ad Fl. exicc. austro-hung. III. pag. 92. No. 925. NYMAN, Consp. 545. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 429. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. II. 428. WETTSTEIN în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. Abteilung 3 b. pag. 86. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 356. și Flora Dobrogei 300. GRECESCU, Conspect. fl. României 437 și Supplement 124. Prin iarbă în livezi, rășișuri, poieni și pe marginea pădurilor, pe coline și prin

fănețe uscate, în tufişuri, adesea. Adunați-Copăceni spre Varlam, în tufişurile de pe marginea sămănăturilor; Comana, pe marginea pădurii; Mănăstirea Pasărea, prin poieni în pădurea «Pasărea»; Mănăstirea Căldăruşani, pe marginea pădurii «Brânzeasca»; Chitila, în pădure prin rărişuri. 4. Maiu—Iunie.

**Veronica Teucrium** L. Sp. pl. ed. 2 (1762). 16. BENTH. în DC. Prodr. X. 469. GREIN. GODR. Fl. Franc. II. 586. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XX. 51. t. 88. FIEK, Fl. von Schlesien 330. exclus. var. b. *dentata*. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 1054. COSTE, Fl. Franc. III. 34. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 640. ROUY, Fl. Franc. XI. 42. NYMAN, Consp. 545. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 423. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 429. WETTSTEIN în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. Abteilung 3 b. pag. 86. — Vulg. Şopârliţă. — Prin livezi, în rărişuri, poieni şi pe marginea pădurilor, în fănețe uscate, prin tufişuri pe coastele expuse soarelui, adesea. Măgurele, în tufişurile de pe marginea Sabarului; Tântava, pe marginea pădurii «Tântava»; Călugăreni, prin fănețe; Comana, pe marginea pădurii, frecvent; Chitila, pe marginea pădurii; Mănăstirea Pasărea, în pădurea «Pustnicu» şi în pădurea «Pasărea»; Mănăstirea Căldăruşani, pe marginea pădurii spre livadia «Pârîta». 4. Maiu—Iunie.

**Veronica longifolia** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 10 şi ed. 2. (1762). 13. KOCH, Syn. ed. 2. 606. BENTH. în DC. Prodr. X. 465. exclus. var.  $\beta$ . LEDEB. fl. ross. III. 232. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 557. BOISS. fl. orient. IV. 455. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XX. 46. FIEK, Fl. von Schlesien 331. HALLIER, Fl. von Deutschld. XVII. 132. t. 1645. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 1055. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. X. 141. GARCKE. III. Fl. von Deutschld. 642. NYMAN, Consp. 544. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 430. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. II. 424. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 357 şi Flora Dobrogei 301. GRECESCU, Conspect. fl. României 439 şi Supplement 125. Prin livezi, tufişuri, în fănețele umede din lunci, pe locurile umede din păduri, nu tocmai frecventă. Comana, în pădure, la «Padina-lui-Vasile», abundentă; Budeşti, în pădurea de pe marginea râului Argeş, nu tocmai frecventă. 4. Iunie—Iulie.

**Veronica spuria** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 10 şi ed. 2. (1762). 13. KOCH, Syn. ed. 2. 605. LEDEB. fl. ross. III. 231. GREIN. GODR. Fl. Franc. II. 586. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XX. 45. t. 94. fig. II. BOISS. fl. orient. IV. 455. HALLIER, Fl. von Deutschld. XVII. 128. t. 1644. COSTE, Fl. Franc. III. 41. GARCKE. III. Fl. von Deutschld. 642. NYMAN, Consp. 544. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 430. WETTSTEIN în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. Abteilung 3 b. pag. 85. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 356. GRECESCU, Conspect. fl. României 439 şi Supplement 125. *Veronica foliosa* w. et KIT.

Descr. et icon. pl. rar. Hung. II. (1805). 106. t. 102. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 424. BRÂNDZĂ, Flora Dobrogei 301. *Veronica brevifolia* M. BIEB. Fl. Taurico-Cauc. I. (1808). 6. *Veronica paniculata* L. Prin livezi, în tufișuri și pe marginea pădurilor, nu tocmai frecventă. Comana, în tufișurile de pe marginea pădurii. 4. Iunie — Iulie.

*Veronica orchidea* CRANTZ. Stirp. austr. IV. (1769). 333. BOISS. fl. orient. IV. 455. NYMAN, Consp. 544. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 425. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 430. WETTSTEIN în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. Abteilung 3 b. pag. 85. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 357 și Flora Dobrogei 301. GRECESCU, Conspect. fl. României 439 și Suplement 125. *Veronica spicata* L. γ. *orchidea* CRANTZ. apud NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 558. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 1055. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 642. *Veronica spicata* L. var. *cristata* KOCH, Syn. ed. 2. 607. RCHB. Icon. fl. germ. et. helv. XX. 44. t. 92. fig. II. HALLIER, Fl. von Deutschld. XVII. 138. *Veronica cristata* BERNH., *Veronica hybrida* M. BIEB. Fl. Taurico-Cauc. I. (1808). 8. et. III. (1819). 9. non L. *Veronica crassifolia* KIT. — Vulg. Șopârlaiță. — Prin livezi, în rărișuri, poieni și pe marginea pădurilor, pe coline nășipoase, în fânețe și pășiuni uscate, frecventă. București la Filaret, în câmp pe marginea drumului de fier; Ciorogârla, în pădurea «Cotroceanca»; Malu-Spart, în pădurea «Căscioceanca»; Călugăreni, Crucea-de-piatră, pe marginea pădurii; Comana, pe marginea pădurii, frecventă; Mănăstirea Cernica, în pădurea «Cernica», abundentă; Mănăstirea Pasărea în pădurea «Pustnicu» și în pădurea «Pasărea», frecventă; Mănăstirea Căldărușani, spre «Moara-Săracă» în pădurea «Brânzeasca»; Mănăstirea Snagov, pe marginea pădurii; Mănăstirea Țigănești, pe marginea pădurii «Ciolpani» și pe drumul dintre pădurea «Ciolpani» și pădurea «Tâncăbești». 4. Iunie — August.

*Veronica serpyllifolia* L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 12 și ed. 2. (1762). 15. STURM, Deutschlands Flora Heft 58. (1831). t. 1. KOCH, Syn. ed. 2. 608. BENTH. în DC. Prodr. X. 482. LEDEB. fl. ross. III. 248. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 594. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 560. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XX. 43. t. 97. BOISS. fl. orient. IV. 453. FIEK, Fl. von Schlesien 332. HALLIER, Fl. von Deutschld. XVII. 149. t. 1651. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 1056. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. X. 145. t. 44. COSTE, Fl. Franc. III. 38. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 643. NYMAN, Consp. 547. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 426. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 431. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. II. 430. WETTSTEIN în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. Abteilung 3 b. pag. 85. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 358 și Flora Dobrogei 302. GRECESCU, Conspect. fl. României 440 și Suplement 125. *Veronica serpyllifolia* L. apud ROUY, Fl. Franc. XI. 47. Prin

livezi și pășuni umede pe locuri nășipoase, prin păduri umede și umbroase, pe lângă păraie și izvoare, pe drumurile din pădure, până sus în regiunea alpină, frecventă. Ciorogârla, pe marginea pădurii «Cotroceanca», abundentă; Călugăreni, Crucea-de-piatră, în pădurea «Crucea-de-piatră; Chitila, pe marginea pădurii; Ciocănești, în pădurea «Popeasca»; București, la Colentina în pădurea «Andronache»; Moara-Domnească, pe marginea pădurii; Mănăstirea Pasărea, în pădurea «Pasărea» și pe marginea drumului Piteasca-Pasărea; Mănăstirea Căldărușani, în pădurea «Brânzeasca», pe margine și în livadia «Pârîta» pe lângă pădure, frecventă; Mănăstirea Țigănești, în pădurea «Ciolpani». 4. Aprilie — August.

**Veronica arvensis** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 13 și ed. 2. (1762). 18. STURM, Deutschlands Flora Heft 58. (1831). t. 11. KOCH, Syn. ed. 2. 609. BENTH. în DC. Prodr. X. 483. LEDEB. fl. ross. III. 249. GREIN. GODR. Fl. Franc. II. 595. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 560. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XX. 41. t. 99. fig. II. BOISS. fl. orient. IV. 457. FIEK, Fl. von Schlesien 333. HALLIER, Fl. von Deutschld. XVII. 154. t. 1653. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich, 1057. KRAUSE în LUTZ. Sturms Fl. von Deutschld X. 148. t. 45. COSTE, Fl. Franc. III. 37. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 643. ROUY, Fl. Franc. XI. 50. NYMAN, Consp. 547. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 426. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 432. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. II. 432. WETTSTEIN în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. Abteilung 3 b. pag. 85. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 359 și Flora Dobrogei 301. GRECESCU, Conspect. fl. României 441. Prin locuri cultivate, în livezi, locuri cu iarbă, pășiuni sterile, pe coline în tufșuri, prin grădini și vii, adesea. Măgurele, spre Dărăști, pe lângă podul de pe Sabar; Mănăstirea Cernica, pe câmp aproape de localitatea «La-Anini», frecventă; Mănăstirea Pasărea, pe marginea pădurii «Pasărea»; Mănăstirea Țigănești, pe marginea pădurii «Ciolpani»; Comana, pe marginea pădurii. ☉. Aprilie — Mai.

**Veronica verna** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 14 și ed. 2. (1762). 19. STURM, Deutschlands Flora Heft 13. (1803). t. 1. KOCH, Syn. ed. 2. 609. BENTH. în DC. Prodr. X. 483. LEDEB. fl. ross. III. 250. GREIN. GODR. Fl. Franc. II. 596. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 560. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XX. 41. t. 99. fig. I. BOISS. fl. orient. IV. 456. FIEK, Fl. von Schlesien 333. HALLIER, Fl. von Deutschld. XVII. 159. t. 1655. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 1058. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. X. 148. fig. 12 del. pag. 149. COSTE, Fl. Franc. III. 37. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 643. ROUY, Fl. Franc. XI. 48. NYMAN, Consp. 547. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 426. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 432. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. II. 431. WETTSTEIN în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. Abteilung 3 b. pag. 85. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 359. GRECESCU, Conspect. fl. Ro-

mâniei 441. *Veronica pennatifida* LAMK., *Veronica Dillenii* CRANTZ. Pe câmpii, în locuri sterile, pe coline în tufișuri, pe marginea pădurilor, în terenuri năsiptoase, sporadică. Chitila, pe marginea pădurii, ici-coleă. ☉. Aprie—Maiu.

Această mică plantă este nouă pentru Flora Bucureștilor, căci n'a mai fost citată până acum de nimeni din această regiune.

*Veronica triphyllus* L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 14 și ed. 2. (1762). 19. STURM, Deutschlands Flora Heft 8. (1800). t. 1. KOCH, Syn. ed. 2. 609. BENTH. în DC. Prodr. X. 486. LEDEB. fl. ross. III. 252. GREIN. GODR. Fl. Franc. II. 597. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 561. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XX. 41. t. 100. fig. II. III. IV. BOISS. fl. orient. IV. 463. HAL-  
LIER, Fl. von Deutschld. XVII. 162. t. 1656. BECK, Fl. von Nieder-Oes-  
terreich 1058. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. X. 152. t. 46.  
COSTE, Fl. Franc. III. 36. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 644. NYMAN,  
Consp. 548. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 426. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 432.  
HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. II. 434. WETTSTEIN în ENGLER, Nat. Pflan-  
zenfamilien IV. Teil. Abteilung 3 b. pag. 85. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române  
359 și Flora Dobrogei 303. GRECESCU, Conspect. fl. României 441 și Su-  
plement 125. *Veronica triphylla* L. apud FIEK, Fl. von Schlesien 333.  
ROUY, Fl. Franc. XI. 51. Pe câmp în locuri cultivate, în pășuni, pe mar-  
ginea pădurilor în terenuri năsiptoase, frecventă. Chitila, pe marginea pădurii  
spre baltă; Mănăstirea Cernica, pe coaste aproape de localitatea «La-Anini»;  
Mănăstirea Pasărea, prin sămănăturile de pe marginea pădurii «Pasărea»,  
frecventă; Grădiște spre Comana, prin sămănăturile de pe lângă drumul de  
fier, frecventă. ☉. Martie—Maiu.

*Veronica polita* FRIES. Nov. ed. 1814. 63. STURM, Deutschlands Flora  
Heft 58. (1831). t. 16. KOCH, Syn. ed. 2. 610. FIEK, Fl. von Schlesien 334.  
HALLIER, Fl. von Deutschld. XVII. 172. t. 1659. BECK, Fl. von Nieder-Oes-  
terreich 1049. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. X. 154. t. 50.  
COSTE, Fl. Franc. II. 36. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 645. NYMAN, Consp.  
548. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 427. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 432. HA-  
LÁCSY, Conspect. Fl. Graec. II. 435. WETTSTEIN în ENGLER, Nat. Pflanzen-  
familien IV. Teil. Abteilung 3 b. pag. 85. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 360  
și Flora Dobrogei 302. GRECESCU, Conspect. fl. României 441. *Veronica*  
*polita* FRIES, ca subspecie dela *Veronica agrestis* L. apud ROUY, Fl. Franc.  
XI. 52. *Veronica didyma* TEN. apud GREIN. GODR. Fl. Franc. II. 599. BOISS,  
fl. orient. IV. 466. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XX. 39. t. 77. fig. I și II.  
Prin locuri cultivate și inculte, pe câmpuri, prin grădini, în locuri cu iarbă  
pe lângă locuințe, comună. Malu-Spart, pe locurile năsiptoase de lângă podul  
Argeșului, frecventă; Măgurele, spre Dărăști pe lângă podul de pe Sabar;

Călugăreni, Crucea-de-piatră, pe marginea pădurii «Uzun»; Grădiște, spre Comana prin sămănături; Mănăstirea Cernica, pe coaste aproape de localitatea «La-Anini»; frecventă; Mănăstirea Pasărea, pe marginea drumului Pitasca-Pasărea; Mănăstirea Căldărușani, pe lângă pădurea «Brânzeasca», abundentă; Periș, prin sămănături. ☉. Martie—August.

**Veronica Tournefortii** GMEL. Fl. Bad. I. (1805). 39. FIEK, Fl. von Schlesien 333. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 1049. KRAUSE în LUTZ, Sturms fl. von Deutschld. 153. t. 47. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 644. WETTSTEIN în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. Abteilung 3 b. pag. 85. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 360. *Veronica persica* POIR. în LAMK. Encycl. méth. VIII. (1808). 542. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 598. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XX. 40. t. 78. COSTE, Fl. Franc. III. 35. NYMAN, Consp. 548. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 427. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. II. 434. GRECESCU, Conspect. fl. României 442. *Veronica Buxbaumii* TEN. Fl. Nap. I. (1811). 7. t. 1. STURM, Deutschlands Flora Heft. 56. (1830). t. 5. KOCH, Syn. ed. 2. 610. BENTH. în DC. Prodr. X. 487. LEDEB. fl. ross. III. 253. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 562. BOISS. fl. orient. IV. 465. HALLIER, Fl. von Deutschld. XVII. 178. t. 1661. ROUY, Fl. Franc. XI. 53. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 432. BRÂNDZĂ, Flora Dobrogei 302. — Vulg. Ventricea, Ventrilică. — Prin locuri cultivate, vii, grădini, sămănături, pe ogoare și pe locuri cu iarbă, pe lângă garduri, pe marginea pădurilor, adesea. Ciocănești, pe marginea pădurii Ciocănești, frecventă. ☉. Martie—August.

**Veronica hederifolia** L. Sp. pl. ed. 2. (1762). 19. KOCH, Syn. ed. 2. 611. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 562. FIEK, Fl. von Schlesien 334. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 1048. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. X. 156. t. 51. GARCKE Ill. Fl. von Deutschld. 645. ROUY, Fl. Franc. XI. 54. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. II. 436. BRÂNDZĂ, Flora Dobrogei 302. GRECESCU, Conspect. fl. României 442 și Supplement 125. WETTSTEIN în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. Abteilung. 3 b. pag. 86. *Veronica hederifolia* L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 13. STURM, Deutschlands Flora Heft 56. (1830). t. 6. BENTH. în DC. Prodr. X. 488. LEDEB. fl. ross. III. 255. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 599. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XX. 39. t. 77. fig. III și IV. BOISS. fl. orient. IV. 468. HALLIER, Fl. von Deutschld. XVII. 181. t. 1662. COSTE, Fl. Franc. III. 35. NYMAN, Consp. 549. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 427. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 432. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 360. Pe locuri cultivate și inculte, prin sămănături, ogoare, vii, prin curți, pe lângă garduri, pe câmpuri sterile în tufșuri și pe marginea pădurilor, adesea. Băcu, Ileana, în pădurea «Ileana»; Călugăreni, Crucea-de-piatră, în pădurea «Crucea-de-piatră»; Grădiște spre Comana, prin sămănături; Băneasa lângă București, pe marginea pădurii, frecventă; Chitila, pe

marginea pădurii și prin sămănături, adesea; Buftea, în pădurea «Răioasa»; Ciocănești, în pădurea «Popeasca» și în pădurea «Ciocănești»; București, în pădurea «Andronache»; Mănăstirea Cernica, pe coaste aproape de localitatea «La-Anini»; Mănăstirea Pasărea, pe marginea pădurii «Cernica» spre șoseaua ce duce la Brănești și pe marginea pădurii «Pasărea», frecventă; Mănăstirea Căldărușani, în pădurea «Brânzeasca»; Mănăstirea Țigănești, în pădurea «Ciolpani». ☉. Martie—Maiu.

**Digitalis ambigua** MURR. Prodr. stirp. Goetting. (1770). 62. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 547. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XX. 35. t. 69. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 1046. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 646. ROUY, Fl. Franc. XI. 101. NYMAN, Consp. 535. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 417. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 423. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. II. 421. WETTSTEIN în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. Abteilung 3 b. pag. 88. GRECESCU, Conspect. fl. României 434. PANȚU, Contribuțiuni nouă la Flora Ceahlăului 28. *Digitalis ambigua* L. apud FIEK, Fl. von Schlesien 327. COSTE, Fl. Franc. III. 26. *Digitalis grandiflora* LAMK. Fl. franç. II. (1778). 332. KOCH, Syn. ed. 2. 596. HALLIER, Fl. von Deutschld. XVII. 198. t. 1668. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. X. 125. t. 34. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 350. *Digitalis grandiflora* ALL. Fl. pedem. I. (1785). 70. BENTH în DC. Prodr. X. 450. LEDEB. fl. ross. III. 227. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 603. BOISS. fl. orient. IV. 432. *Digitalis ochroleuca* JACQ. Fl. austr. I. (1773). 36. — Vulg. Degetar, Degetariță, Degețel, Țața-oii. — Prin pădurile și tufișurile dela câmp și dela munte, adesea. Mănăstirea Cernica, în pădurea «Cernica»; Mănăstirea Pasărea, în pădurea «Pasărea», frecventă; Mănăstirea Căldărușani, pe marginea pădurii «Brânzeasca». 4. Iunie — Iulie.

**Digitalis lanata** EHRH Beitr. VII. (1792). 153. W. et KIT. Descr. et icon. pl. rar. Hung. I. (1802). 76. t. 74. BENTH. în DC. Prodr. X. 450. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 548. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XX. 36. t. 72. fig. II. BOISS. fl. orient. IV. 430. HEUFFEL Enum. pl. Banat-Temes. 132. No. 1261. NEILR. Diagnosen. 93. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 1047. PORCIUS, Diagnozele 213. NYMAN, Consp. 535. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 418. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 422. HALÁCSY, Consp. 421. WETTSTEIN în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. Abteilung 3 b. pag. 88. BRÂNDZĂ. Prodr. fl. române 350 și Flora Dobrogei 298. GRECESCU, Conspect. fl. României 434. Pe câmpuri năsiptoase și pe coline aride, prin rărișuri, poieni și pe marginea pădurilor în fânețe, prin tufișuri, adesea. București, la «Moara-lui-Ciurel», pe coaste; Domnești, Ciutați în dumbravă; Ciorogârla, pe marginea pădurii «Cotroceanca», frecventă; Jilava, în câmp pe marginea drumului de fier; Călugăreni, Crucea-de-piatră, pe marginea pădurii «Uzun» și

pe marginea pădurii «Crucea-de-piatră»; Comana, prin tufişurile de pe marginea pădurii la «Fântâna-cu-nucu», frecventă; Mogoşoaia, în pădurea închisă a Domnului Sava Şomănescu; Chitila, în lăstari, abundentă; Mănăstirea Cernica, pe câmpia de lângă linia forturilor şi în pădurea «Cernica» prin poieni şi răişuri; Mănăstirea Pasărea, în pădurea «Pustnicu» şi în pădurea «Pasărea», frecventă; Mănăstirea Căldăruşani, pe marginea pădurii «Brânzeasca»; Mănăstirea Snagov, pe marginea pădurii; Mănăstirea Țigăneşti, în pădurea «Ciolpani». ☉. sau 4. Iunie — Iulie.

**Digitalis ferruginea** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 622 şi ed. 2. (1762). 867. KOCH, Syn. ed. 2. 598. BENTH. în DC. Prodr. X. 450. LEDEB. fl. ross. III. 227. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 548. RCHB. Icon. fl. germ. et. helv. XX. 37. t. 73. şi fig. 11--20 din t. 74. BOISS. fl. orient. IV. 429. HAL-LIER, Fl. von Deutschld XVII. 209. t. 1671. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 1047. NYMAN, Consp. 535. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 418. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 422. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec II. 420. HEUFFEL, Enum. pl. Banat. - Temes. 132. No. 1260. WETTSTEIN în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. Abteilung 3 b. pag. 88. Prin livezi uscate, în locuri pietroase prin tufişuri, prin răişuri, poieni şi pe marginea pădurilor, nu tocmai frecventă. Ciorogârla, în pădurea «Cotroceanca», prin răişuri şi poieni, abundentă; Malul-Spart, în pădurea «Căscioceanca» prin poieni şi răişuri; Comana, la «Padina-lui-Vasile»; Mănăstirea Țigăneşti, pe drumul dintre pădurea «Ciolpani» şi pădurea «Tâncăbeşti», adesea. ☉. sau 4. Iunie—August.

Această plantă fiind nouă pentru Flora Românei, publicăm aici diagnoză ei.

Tulpina până la 1 1/2 m. înaltă este erectă, simplă, glabră şi terminată printr'un lung racem densiflor sau laxiuscul; foile oblong-lanceolate sau lanceolate, întregi sau obscur repand-denticulate, ascuţite sau acuminate, glabre sau numai pe margine şi pe faţa inferioară puţin puberule, cele inferioare îngustate în peţiol, cele superioare sesile; bracteele oblong-lanceolate sunt cam de aceeaş lungime cu florile; florile patente sau plecate în jos sunt dispuse într'un racem terminal, conic; caliciul glabru cu laciniile oblonge, rotunzit-obtuse, lat-scarios-marginate, glabre sau numai pe margine ciliate; corola scurt-campanulată, glandulos-păroasă de 20—24 mm. de lungă, de culoare roşcat-gălbue (fulvus), pe din lăuntru ferugineu-reticulată; buza superioară emarginată cu lobii abreviaţi rotundaţi, cei laterali scurţi, ascuţi, cel inferior elongat, oblong, întreg sau obscur trilobat, plecat în jos, pe din lăuntru vilos şi cam de aceeaş lungime cu tubul corolei; fructul este o capsulă ovală acuminată.

KANITZ în «Plantas Romaniae hucusque cognitae» la pag. 86 No. 1215



citează din Moldova superioară și din regiunile inferioare ale Ceahlăului pe *Digitalis ferruginea* L. după GUÉBHARD și EDEL. Dar regretatul nostru botanist BRÂNDZĂ, care văzuse plantele lui GUÉBHARD și ale lui EDEL în erbariul dela Iași, identifică totuș această plantă cu *Digitalis ambigua* MURR. (syn. *Digitalis grandiflora*. LAMK.) cnf. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române pag. 350.

Este foarte probabil că BRÂNDZĂ a avut dreptate să identifice plantele lui GUÉBHARD și EDEL cu *Digitalis ambigua* MURR., pentru că nici noi, cari am studiat mai mulți ani Flora Ceahlăului și parte din Flora Moldovei de sus, n'am aflat în această regiune a țerii decât pe *Digitalis ambigua* MURR. precum reiese și din publicațiunea noastră «Contribuțiuni nouă la Flora Ceahlăului», pag. 28.

Din cele ce preced să vede însă destul de lămurit, că *Digitalis ferruginea* L. este o plantă cu totul nouă și foarte rară pentru Flora României, căci până acum n'a fost constatată cu siguranță, decât numai din regiunea Bucureștilor.

**Odontites verna** RCHB. Fl. germ. exc. 359. COSTE, Fl. Franc. III. 47. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld 649. NYMAN, Consp. 551. GRECESCU, Conspect. fl. României 447 și Suplement 128. *Odontites* *Odontites* WETTSTEIN în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. Abteilung 3 b. pag. 102. *Odontites rubra* PERS. Syn. 2. 150. BENTH. în DC. Prodr. X. 551. LEDEB. fl. ross. III. 261. ex p. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 606. BRÂNDZĂ, Flora Dobrogei 305. *Euphrasia Odontites* L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 604 și ed. 2. (1762). 841. α. FIEK, Fl. von Schlesien 339. HALLIER, Fl. von Deutschld. XVII. 356. t. 1738. ROUY, Fl. Franc. XI. 138. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 365. *Euphrasia verna* BELL. App. pedem. (1792). 33. *Bartsia verna* RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XX. 57. t. 107. fig. II. *Odontites rubra* GILIB. α. *vulgaris* MÖNCH. apud BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 1063. *Odontites vulgaris* MOENCH. Meth. 439.—Vulg. Dințură, Duțură, Iarba-dintelui.—Prin sămănături, pietrișuri mărunte cu iarbă, prin livezi și pe marginea pădurilor. Ciorogârla, pe marginea pădurii «Cotroceanca». ☉. Iunie—Octomvrie.

**Odontites serotina** RCHB. Fl. germ. exc. 359. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 606. COSTE, Fl. Franc. III. 47. NYMAN, Consp. 550. WETTSTEIN în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. Abteilung 3 b. pag. 102. GRECESCU, Conspect. fl. României 447 și Suplement 129. *Odontites rubra* GILIB. β. *serotina* RCHB. apud BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 1063. *Odontites serotina* LAMK. apud SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 433. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. II. 439. sub. *Euphrasia*. *Euphrasia Odontites* L. β. *serotina* LAMK. apud FIEK, Fl. von Schlesien 340. *Euphrasia serotina* LAMK. Fl. franc. ed. 2. (1793). 350. HALLIER, Fl. von Deutschld XVII. 359. t. 1737. BRÂNDZĂ, Prod. fl. române 365. *Bartsia Odontites* HUDS. apud RCHB. Icon. fl. germ. et helv.

XX. 57. t. 106. Prin locuri inculte și cultivate, prin grâne, pe câmpuri, drumuri, prundișuri, pe locuri umede și pe marginea pădurilor, adesea. Ciorogârla, în pădurea «Cotroceanca»; Măgurele, pe locurile umede de pe marginea Sabarului, frecventă; Călugăreni, Crucea-de-piatră, pe marginea pădurii «Crucea-de-piatră», adesea; Chitila, pe marginea pădurii, frecvent. ☉. Iulie — Septembrie.

Unii botaniști consideră această plantă, și poate cu drept cuvânt, numai ca o formă tomnatică a speciei precedente de care diferă foarte puțin, adică ca o formă de dimorfism de sezon.

**Rhinanthus hirsutus** LAMK. Fl. franç. II. (1778). 353. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. X. 183. NYMAN, Consp. 552. *Rhynanthus major* EHRH. β. *hirsutus* F. SCHLUTZ. apud GREN. GODR. Fl. Franc. II. 612. GRECESCU, Conspect. fl. României 446 și Suplement 128. *Rhinanthus Alectorolophus* POLL. (1776). apud KOCH, Syn. ed. 2. 626. COSTE, Fl. Franc. III. 52. *Rhinanthus Crista galli* L. γ. *hirsutus* DÖLL. apud NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 569. *Rhinanthus major* EHRH. var. *glandulosus* SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 432. *Alectorolophus major* RCHB. β. *hirsutus* ALL. apud RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XX. 65. t. 118. fig. I. FIEK, Fl. von Schlesien 337. *Alectorolophus grandiflorus* WALLR. α. *hirsutus* ROUY. Fl. Franc. XI. 127. *Alectorolophus hirsutus* ALL. Fl. Pedem. I. 58. apud HALLIER, Fl. von Deutschld XVII. 290. t. 1705. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 1068. *Fistularia Alectorolophus* WETTSTEIN în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. Abteilung 3 b. pag. 103. GARCKE, III. Fl. von Deutschld 651. *Rhinanthus villosus* PERS. Syn. 2. 151. *Mimulus Alectorolophus* SCOP. Fl. Carn. ed. 2. I. (1772). 435.—Vulg. Clocotici, Clocotiș, Sunătoare.—Prin sămănături pe câmpuri, prin livezi, crânguri, pe marginea pădurilor, în fânețe, adesea. București, la «Moara-lui-Ciurel», prin fânețele din lunca Dâmboviței, frecvent; Măgurele, pe locurile umede de pe marginea Sabarului; Călugăreni, prin fânețele dela câmp, abundant; Chitila, în lăstari, frecvent; Cățelu, pe lângă linia forturilor, adesea; Mănăstirea Căldărușani, în livadia «Pârîta». ☉. Maiu — Iulie.

**Melampyrum cristatum** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 605 și ed. 2. (1762). 842. KOCH, Syn. ed. 2. 620. BENTH. în DC. Prodr. X. 583. LEDEB. fl. ross. III. 304. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 620. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 571. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XX. 62. t. 116. BOISS fl. orient. IV. 480. FIEK, Fl. von Schlesien 335. HALLIER, Fl. von Deutschld XVII. 267. t. 1697. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 1069. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. X. 186. COSTE, Fl. Franc. 58. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 653. ROUY, Fl. Franc. XI. 121. NYMAN, Consp. 555. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 428. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 437. WETTSTEIN în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. Abteilung 3 b. pag. 99. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 360

și Flora Dobrogei 303. GRECESCU, Conspect. fl. României 442 și Supplement 126. — Vulg. Ciormoiag, Codroi, Dințariță, Grăpadă, Grâu-negru, Grăul-prepelițelor, Miazănoapte, Scrabă. — Pe locuri deschise, în livezi, prin rărișuri, poieni și pe marginea pădurilor în tufișuri, adesea. Mănăstirea Cernica, la marginea pădurii «Cernica» lângă șoseaua care duce spre Brănești; Mănăstirea Pasărea, în pădurea «Pustnicu» și pe marginea pădurii «Pasărea», frecvent; Mănăstirea Căldărușani, în poienile, rărișurile și pe marginea pădurii «Brânzeasca», adesea. ☉. Maiu — Iulie.

**Melampyrum arvense** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 605 și ed. 2. (1762). 842. KOCH, Syn. ed. 2. 620. BENTH în DC. Prodr. X. 583. LEDEB. fl. ross. III. 304. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 620. NEILR. Fl. Nieder-Oesterreich 571. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XX. 62. t. 115. fig. I. BOISS. fl. orient. IV. 480. FIEK, Fl. von Schlesien 335. HALLIER, Fl. von Deutschld XVII. 270. t. 1698. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 1070. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld X. 185. fig. 17. COSTE, Fl. Franc. III. 59. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 653. ROUY, Fl. Franc. XI. 122. NYMAN, Consp. 555. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 428. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 437. WETTSTEIN în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. Abteilung 3 b. pag. 99. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 361 și Flora Dobrogei 304. GRECESCU, Conspect. fl. României 443 și Supplement 126. — Vulg. Ciormoiag, Carpenă, Condroniu, Grâu-negru, Grăul-prepeliței, Miazănoapte, Păduroniu, Scrabă. — Prin livezi, fânețe uscate, în poieni, rărișuri, pe marginea pădurilor în tufișuri, prin vii și în sămănăturile dela câmp, nu tocmai frecvent. Comana, prin iarbă, pe marginea pădurii; Mănăstirea Căldărușani, pe marginea pădurii «Brânzeasca»; Mănăstirea Snagov, pe marginea pădurii. ☉. Iunie — Iulie.

**Melampyrum nemorosum** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 605 și ed. 2. (1762). 843. STURM, Deutschlands Flora Heft 29. (1810). t. 13. KOCH, Syn. ed. 2. 621. BENTH. în D.C. Prodr. X. 583. LEDEB. fl. ross. III. 305. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 621. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 571. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XX. 63. t. 114. BOISS. fl. orient. IV. 481. FIEK, Fl. von Schlesien 335. HALLIER, Fl. von Deutschld. XVII. 275. t. 1700. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 1072. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. X. 189. t. 52. COSTE, Fl. Franc. III. 59. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 653. ROUY, Fl. Franc. XI. 123. NYMAN, Consp. 556. VELENOVSKY Fl. Bulg. 437. WETTSTEIN în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. Abteilung 3 b. pag. 99. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 361. GRECESCU, Conspect. fl. României 443 și Supplement 126. — Vulg. Carpenă, Ciormoiag, Miazănoapte, Scrab, Sor-cu-frate. — Prin păduri și tufișuri. Băcu, pe marginea pădurii, «Ileana», frecvent; Călugăreni, Crucea-de-piatră, în pădurea «Uzun» și în pădurea «Crucea-de-piatră», adesea. ☉. Iunie — Septembrie.

## OROBANCHACEAE.

**Lathraea Squamaria** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 606. și ed. 2. (1762). 844. KOCH, Syn. ed. 2. 620. DC. Prodr. XI. 40. STURM, Deutschlands Flora Heft 94. (1849). t. 6. LEDEB, fl. ross. III. 324. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 643. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 579. RCHB. Icon. fl. germ. et. helv. XX. 85. t. 143. și t. 205. fig. I. 1—5. BOISS. fl. orient. IV. 493. FIEK, Fl. von Schlesien 340. HALLIER, Fl. von Deutschld. XVIII. 65. t. 1767. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 1085. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. X. 191. t. 59. COSTE, Fl. Franc. III. 62. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 654. ROUY, Fl. Franc. XI. 191. NYMAN, Consp. 562. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 436. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 440. BECK în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV, Teil Abteilung 3 b. pag. 131. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 163 și Flora Dobrogei 307. GRECESCU, Conspect. fl. României 451 și Suplement 130.—Vulg. Buricu-pământului, Cucuruz-de-pădure, Cucuruzu-pădurilor, Floarea-șearpelui, Iarba-șearpelui, Mama-pădurii, Murea-pădurilor, Șerpariță.—Parazită pe rădăcinile arborilor și arbuștilor din pădurile și tufișurile umede și umbroase, adesea. Ciorogârla, în pădurea «Cotroceanca», frecventă; Malul-Spart, în pădurea «Căscioceanca»; Călugăreni, Crucea-de-piatră, în pădurea «Crucea-de-piatră; Comana, prin pădure, frecventă; Chitila, în pădure; Buftea, în pădurea «Răioasa» (Buftea-Flămânzeni); Ciocănești, în pădurea «Ciocănești» și în pădurea «Popeasca»; Mănăstirea Cernica, în pădurea «Cernica»; Mănăstirea Pasărea, în pădurea «Pustnicu», frecventă; Mănăstirea Țigănești, în pădurea «Ciolpani». 4. Martie—Maiu.

**Orobanche ramosa** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 633 și ed. 2. (1762). 882. KOCH, Syn. ed. 2. 620. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 574. FIEK, Fl. von Schlesien 342. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 1075. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld X. 195. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld 655. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 434. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. II. 444. BECK în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. Abteilung 3 b. pag. 130. fig. 56. A. *Phelipaea ramosa* C. A. MEY. Enum. pl. cauc. 104. DC. Prodr. XI. 8. LEDEB. fl. ross. III. 313. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 627. RCHB. Icon. fl. germ. et. helv. XX. 88. t. 152. HALLIER, Fl. von Deutschld XVIII. 62. t. 1766. COSTE, Fl. Franc. III. 63. ROUY, Fl. Franc. XI. 158. NYMAN, Consp. 557. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 439. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 163. GRECESCU, Conspect. fl. României 451 și Suplement 130. *Phelipaea ramosa* L. sub *Orobanche* apud BOISS. fl. orient. IV. 498. *Kopsia ramosa* DUMORT. *Phelipanche ramosa* POMEL.—Vulg. Busuioc-sălbatic, Lupo aie.—Crește parazită mai cu samă pe Cănepe, apoi pe rădăcinile de: Tutun, Hrean, Zărnă, Cartofi, Păt-

lăgele-roșii, rar și pe rădăcinile de Porumb. Mănăstirea Căldărușani, pe marginea lacului «Căldărușani» spre satul Grecii, pe Cănepă (*Cannabis sativa*). ☉. Iunie—August.

### LENTIBULARIACEAE.

**Utricularia vulgaris** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 18 și ed. 2. (1762). 26. STURM. Deutschlands Flora Heft 13. (1803). t. 2. KOCH, Syn. ed. 2. 665. DC. Prodr. VIII. 6. LEDEB, fl. ross. III. 1. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 444. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 580. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XX. 113. t. 201. și t. 202. BOISS. fl. orient. IV. 4. FIEK, Fl. von Schlesien 362. HALLIER, Fl. von Deutschld XIX. 288. t. 2000. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 1087. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld X. 219. t. 63. COSTE, Fl. Franc. II. 517. GARCKE, Ill. fl. von Deutschld. 661. ROUY, Fl. Franc. XI. 204. NYMAN, Consp. 598. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 456. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 473. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. III. 1. KAMIENSKI în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. Abteilung 3 b. pag. 122. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 412. Contribuțiuni nouă la Flora României (1889). pag. 21 și Flora Dobrogei 332. GRECESCU, Conspect. fl. României 452 și Suplement 131. *Lentibularia major* GILIB.—Vulg. Otrățel-de-apă, Otrățelu-bălților.—Prin apele stagnante sau lin curgătoare, în lacuri, bălți și gropi cu apă, adesea. Mănăstirea Căldărușani, în lacul «Căldărușani», abundentă mai cu samă lângă pod; Mănăstirea Țigănești, în lacul «Bălteni» spre marginea pădurii «Ciolpani», frecventă. 4. Iunie—August.

### PLANTAGINACEAE.

**Plantago major** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 112 și ed. 2. (1762). 163. STURM, Deutschlands Flora Heft 87. (1843). t. 6. KOCH, Syn. ed. 2. 685. LEDEB. fl. ross. III. 476. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 720. DC. Prodr. XIII. sect. I. 694. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 308. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XVII. 52. t. 77. BOISS. fl. orient. IV. 878. FIEK, Fl. von Schlesien 369. HALLIER, Fl. von Deutschld. XX. 11. t. 2005. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 1094. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld XI. 200 t. 59. COSTE, Fl. Franc. III. 150. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 664. ROUY, Fl. Franc. X. 133. NYMAN, Consp. 620. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 463. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 484. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. III. 34. HARMS—REICHE în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. Abteilung 3b. pag. 370. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 414 și Flora Dobrogei 339. GRECESCU, Conspect. fl. României. 491 și Suplement 140.—Vulg. Mama-ploaie, Limba-oii, Pat-

lăgină, Platagină, Plătangină.—Pe drumuri, pe marginea câmpurilor, prin fânețe și pășuni umede și pe locuri cultivate, adesea. București, la «Moara-lui-Ciurel» în lunca Dâmboviței; Călugăreni, Crucea-de-piatră, în lunca Călniștei; Budești, în pădurea de pe marginea râului Argeș; Oltenița, pe marginea șoselei portului; Mănăstirea Cernica, pe marginea pădurii «Cernica»; Mănăstirea Căldărușani, pe marginea pădurii «Brânzeasca»; Mănăstirea Țigănești, pe marginea pădurii «Ciolpani» spre lacul «Bălteni» și pe drumul dintre pădurea «Ciolpani» și pădurea «Tâncăbești». 4. Iunie — Septemvrie.

**Plantago media** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 113 și ed. 2. (1762). 163. STURM, Deutschlands Flora Heft 87. (1843). t. 8. KOCH, Syn. ed. 2. 686. LEDEB. fl. ross. III. 480. GREIN. GODR. Fl. Franc. II. 721. DC. SNE în DC. Prodr. XIII. sect. I. 697. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 308. RCHB. Icon. fl. germ. et. helv. XVII. 53. t. 78. fig. III. și t. 86. fig. II. BOISS fl. orient. IV. 879. FIEK, Fl. von Schlesien 370. HALLIER, Fl. von Deutschld. XX. 17. t. 2007. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 1095. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. XI. 201. t. 60. COSTE, Fl. Franc. III. 149. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 664. ROUY, Fl. Franc. X. 133. NYMAN. Consp. 620. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 464. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 484. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. III. 34. HARMS—REICHE în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. Abteilung 3b. pag. 370. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 415 și Flora Dobrogei 339. GRECESCU, Conspect. fl. României 492 și Supplement 140. — Vulg. Patlagină, Pătlagină-bună, Pătlagină-moale, Plătagină, Turcaleți.—Prin livezi, în locuri cu iarbă, rărișuri, poieni, pe marginea pădurilor în fânețe și pășuni, pe lângă drumuri, adesea. Ciorogârla, în pădurea «Cotroceană»; Călugăreni, Crucea-de-piatră, pe marginea pădurii «Uzun»; Comana, pe marginea pădurii, frecventă; Chitila, pe marginea pădurii; Mănăstirea Cernica, pe marginea pădurii «Cernica», abundentă; Mănăstirea Pasărea, în pădurea «Pasărea», frecventă; Mănăstirea Căldărușani, pe marginea pădurii «Brânzeasca». 4. Maiu — Iulie.

**Plantago lanceolata** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 113 și ed. 2. (1762). 164. STURM, Deutschlands Flora Heft 7. (1799). t. 2. KOCH, Syn. ed. 2. 686. LEDEB. fl. ross. III. 481. GREIN. GODR. Fl. Franc. II. 727. DC. SNE în DC. Prodr. XIII. sect. I. 714. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XVII. 56. t. 86. fig. III. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 308. BOISS. fl. orient. IV. 881. FIEK, Fl. von Schlesien 370. HALLIER, Fl. von Deutschld. XX. 22. t. 2009. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 1093. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. XI. 196. t. 61. COSTE, Fl. Franc. III. 149. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 664. ROUY, Fl. Franc. X. 120. NYMAN, Consp. 619. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 464. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 484. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. III. 31. HARMS—REICHE în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. Abtei-

lung 3 b. pag. 371. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 415 și Flora Dobrogei 340. GRECESCU, Conspect. fl. României 492 și Suplement 140. — Vulg. Patlagină, Platagină, Patlagină-îngustă. — Prin fânețe și pășuni în locuri aride, pe lângă drumuri, adesea. Ciorogârla, pe marginea pădurii «Cotroceanca», unde am aflat exemplare monstruase cu 3—7 spice îngră-mădite la vârful scapului, fenomen teratologic caracteristic pentru această specie; Măgurele spre Nefliu, pe locurile umede de pe marginea Sabarului, frecvent; Pâslari spre Pârliți, printre vii; Călugăreni, Crucea-de-piatră, pe marginea pădurii «Uzun», pe dealuri, frecventă; Gruiu, pe marginea șoselei București spre Oltenița; Mănăstirea Cernica, pe marginea drumului; Mănăstirea Pasărea, pe marginea pădurii «Pustnicu»; Mănăstirea Țigănești, pe marginea pădurii «Ciolpani», pe locul rezervat pentru mănăstire. 4. Aprilie—Septembrie. Variază.

**Plantago arenaria** W. et KIT. Descr. et icones pl. rar. Hung. I. (1802). 51. t. 51. KOCH, Syn. ed. 2. 689. LEDEB. fl. ross. III. 486. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 731. DC. SNE în DC. Prodr. XIII. sect. I. 735. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XVII. 59. t. 85. fig. II. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 309. BOISS. fl. orient. IV. 892. FIEK, Fl. von Schlesien 371. HALLIER, Fl. von Deutschld. XX. 52. t. 2020. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 1095. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. XI. 194. COSTE, Fl. Franc. III. 145. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 665. ROUY, Fl. Franc. X. 121. NYMAN, Consp. 617. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 465. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 486. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. III. 26. HARMS—REICHE în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. Abteilung 3 b. pag. 373. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 416 și Flora Dobrogei 340. GRECESCU, Conspect. fl. României 494 și Suplement 140. *Psyllium arenarium* OPIZ., *Plantago ramosa* ASCHERSON.—Vulg. Ochiu-lupului. — Pe locurile nășipoase de pe marginea râurilor. Palanga, pe locurile nășipoase din apropierea râului Argeș. (legit GH. N. BOTEZ). ☉. Iulie—August.

Această plantă este nouă pentru Flora Bucureștilor, căci n'a mai fost citată până acuma de nimeni din această regiune.

## RUBIACEAE.

**Asperula taurina** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 103 și ed. 2. (1762). 150. DC. Prodr. IV. 582. KOCH, Syn. ed. 2. 359. LEDEB. fl. ross. II. 397. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 49. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XVII. 89 t. 127. fig. I. BOISS. fl. orient. III. 41. HALLIER, Fl. von Deutschld XXVIII. 20. t. 2871. COSTE, Fl. Franc. II. 254. ROUY Fl. Franc. VIII. 62. GARCKE, III. Fl. von Deutschld 667. NYMAN, Consp. 332 SIMONKAI, Enum Fl. Transs. 278.

VELENOVSKÝ, Fl. Bulg. 237. SCHUMANN în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. Abteilung 4. pag. 149. BRÂNDZĂ Prodr. fl. române 244 și Contribuțiunii nouă la Flora României (1889). 14. GRECESCU, Conspect. fl. României 264. *Asperula trinervia* LAMK., *Galium taurinum* SCOP. Fl. Carn. ed. 2. (1772). 101. No. 148. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. XII. 205. Prin pădurile umede și umbroase, adesea. Ciorogârla, în pădurea «Cotroceanca», abundentă; Copăceni, spre Jilava în pădurea de pe marginea șoselei; Călugăreni, Crucea-de-piatră, în pădurea «Crucea-de-piatră», frecventă; Comana, în pădure; Chitila, în pădure; Ciocănești, în pădurea «Popeasca», adesea; Mănăstirea Cernica, în pădurea «Cernica», abundentă; Mănăstirea Pasărea, în pădurea «Pustnicu», frecventă; Mănăstirea Căldărușani, în pădure spre livadia «Pârîta» și în pădurea «Brânzeasca», adesea; Mănăstirea Țigănești, în pădurea «Ciolpani», frecventă. 4. Mai—Iunie.

*Asperula cynanchica* L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 104 și ed. 2. (1762). 151. KOCH, Syn. ed. 2. 359. LEDEB. fl. ross. II. 398. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 47. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XVII. 91. t. 130. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 464. BOISS. fl. orient. III. 40. FIEK, Fl. von Schlesien 196. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXVIII. 23. t. 2873. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 1118. COSTE, Fl. Franc. II. 256. ROUY, Fl. Franc. VIII. 58. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 667. NYMAN, Consp. 333. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 278. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 238. SCHUMANN în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. Abteilung 4. pag. 149. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 244 și Flora Dobrogei 250. GRECESCU, Conspect. fl. României 265 și Supplement 75. *Galium Cynanchicum* SCOP. Fl. Carn. ed. 2. (1772). 101. No. 147. — Vulg. Asprișoară. — Prin livezi, locuri cu iarbă, pe coastele colinelor aride, prin rășișuri, poieni și pe marginea pădurilor, pe lângă drumuri în fânețe, adesea. Ciorogârla, în pădurea «Cotroceanca»; Călugăreni, Crucea-de-piatră, pe marginea pădurii «Uzun»; Mănăstirea Cernica, în pădurea «Cernica», prin rășișuri și pe margine spre șoseaua care duce la Brănești, frecventă; Mănăstirea Pasărea, pe marginea pădurii «Pustnicu» și în pădurea «Pasărea», adesea; Mănăstirea Căldărușani, prin poienile, rășișurile și pe marginea pădurii «Brânzeasca», abundentă. 4. Iunie—August. Variază.

*Asperula galioides* M. BIEB. Fl. Taur. Cauc. I. (1808). 101. No. 256. DC. Prodr. IV. 585. KOCH, Syn. ed. 2. 360. LEDEB. fl. ross. III. 399. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XVII. 91. t. 128. fig. I. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 464. BOISS. fl. orient. III. 44. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXVIII. 29. t. 2875. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 1117. COSTE, Fl. Franc. II. 256. ROUY, Fl. Franc. VIII. 54. NYMAN, Consp. 332. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 237. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 245 și Flora Dobrogei 251. GRECESCU, Conspect. fl. României 267 și Supplement 75. *Asperula glauca* BESS. Enum. pl. Volhyn.



Podol. (1822). 7. FIEK, Fl. von Schlesien 195. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 668. SCHUMANN, Rubiaceae în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. Abteilung 4. pag. 149. *Asperula glauca* L. sub *Galio*. apud SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 279. *Galium glaucum* L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 107 și ed. 2. (1762). 156. GREIN. GODR. Fl. Franc. II. 18. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld XII. 201. Pe marginea pădurilor, prin rărișuri în tufișuri, pe colinele expuse soarelui, adesea. Comana, la marginea pădurii pe «Coastalui-Tudorache» în locurile expuse soarelui, frecventă. 4. Maiu — Iulie.

**Asperula odorata** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 103 și ed. 2. (1762). 150. KOCH, Syn. ed. 2. 359. LEDEB. fl. ross. II. 400. GREIN. GODR. Fl. Franc. II. 47. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XVII. 89. t. 127. fig. II și III. NEILL. Fl. von Nieder-Oesterreich 463. BOISS. fl. orient. III. 43. FIEK, Fl. von Schlesien 196. HALLIER, Fl. von Deutschld XXVIII. 26. t. 2874. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 1117. COSTE, Fl. Franc. II. 255. ROUY, Fl. Franc. VIII. 55. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 668. NYMAN, Consp. 332. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 278. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 237. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. I. 732. SCHUMANN, Rubiaceae în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. Abteilung 4. pag. 149. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 245 și Flora Dobrogei 251. GRECESCU, Conspect. fl. României 268 și Suplement 75. *Galium odoratum* SCOP. Fl. Carn. ed. 2. (1772). I. 105. *Galium Matrisylva* WEB. apud KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld XII. 204. t. 47. — Vulg. Mama-păduri, Muma-păduri, Sânjuane-de-pădure, Vinariță. — Prin păduri umbroase, adesea. Ciorogârla, în pădurea «Cotroceanca», abundentă; Maluspart, în pădurea «Căscioceanca», frecventă; Călugăreni, Crucea-de-piatră, în pădurea «Crucea-de-piatră», abundentă; Chitila, în pădure; Ciocănești, în pădurea «Popeasca»; Mănăstirea Cernica, în pădurea «Cernica»; Mănăstirea Pasărea, în pădurea «Pustnicu»; Mănăstirea Căldărușani, în pădurea «Căldărușani» spre livadia «Pârîta»; Mănăstirea Țigănești, în pădurea «Ciolpani», frecventă. 4. Maiu — Iunie.

Poporul german prepară cu această plantă uscată și cu vin o băutură plăcută numită «Maitrank».

**Asperula Aparine** M. BIEB. Fl. Taur. Cauc. I. (1808). 102 și III. Supplementum (1819). 105. DC. Prodr. IV. 585. BOISS. fl. orient. III. 43. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 667. NYMAN, Consp. 332. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 279. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 237. SCHUMANN, Rubiaceae în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. Abteilung 4. pag. 149. GRECESCU, Conspect. fl. României 268 și Suplement 75. SCHOTT apud BESSER Fl. Galic. (1809). 114. KOCH, Syn. ed. 2. 359. LEDEB. fl. ross. II. 401. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XVII. 90. t. 128. fig. II. FIEK, Fl. von Schlesien 196. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXVIII. 32. t. 2876. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 245 și Contri-

buțiuni nouă la Flora României (1889). pag. 14. *Asperula rivalis* SIBTHORP. et SM. Prodr. Fl. Graec. I. (1806). 87. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 1116. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. I. 731. *Galium rivale* GRISEB. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. XII. 207. Prin tufişuri umede, pe malurile apelor, în lunci, prin stufuri, bălţi, mlaştine şi rovine, adesea. Călugăreni, Crucea-de-piatră, prin locurile umede mlăştinoase de pe marginea pădurii «Uzun», frecventă. Mănăstirea Căldăruşani, în lacul «Căldăruşani», unde împreună cu *Aspidium Thelypteris* SW., *Lythrum Salicaria* L. formează insule plutitoare, numite *Cocioc*, şi pe marginea lacului, frecventă. 4. Iunie—August.

*Asperula humifusa* M. BIEB. Fl. Taur. Cauc. III. Supplementum (1819). 105. DC. Prodr. IV. 585. BOISS. fl. orient. III. 44. NYMAN, Consp. 332. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 237. SCHUMANN, Rubiaceae în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. Abteilung 4. pag. 149. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 246. *Asperula humifusa* BESS. Cat. hort. cremen. suppl. III. (1811). 4. BESS. Enum. pl. Volhyn. Podoliae. (1822). 7. No. 156. LEDEB. fl. ross. II. 401. LINDEMANN, Fl. Cherson. I. 273. BRÂNDZĂ, Flora Dobrogei 251. GRECESCU, Conspect. fl. României 268 şi Suplement 75. *Galium humifusum* M. BIEB. Fl. Taur. Cauc. I. (1808). 104. No. 265. Pe locuri sterile şi umede, pe coline aride, pe lângă drumuri. Băneasa, pe marginea Colentinei; Bucureşti, la Fundeni, pe marginea Colentinei; Jilava, pe marginea şoselei; Călugăreni, Crucea-de-piatră, pe marginea pădurii «Uzun», frecventă şi pe coastele dealurilor; Gruiu, pe marginea şoselei Bucureşti spre Olteniţa. 4. Iunie—August. Variază.

*Galium verum* L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 107 şi ed. 2. (1762). 155. DC. Prodr. 603. KOCH, Syn. ed. 2. 364. LEDEB. fl. ross. II. 414. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 19. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XVII. 98. t. 136. fig. II. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 460. BOISS fl. orient. III. 62. FIEK, Fl. von Schlesien 200. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXVIII. 69. t. 2893. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 1123. COSTE, Fl. Franc. II. 247. ROUY, Fl. Franc. VIII. 12. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld XII. 199. t. 50. fig. 2. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 670. NYMAN, Consp. 328. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 282. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 233. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. I. 715. SCHUMANN, Rubiaceae în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. Abteilung 4. pag. 151. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 249 şi Flora Dobrogei 254. GRECESCU, Conspect. fl. României 269 şi Suplement 75. — Vulg. Drăgaică, Floarea-lui-Sft. Ioan, Sâmziene, Sâmziene-galbene, Sânjuoane, Sânzene, Sânzienne, Sânzuiiană, Sânzuiene. — Prin livezi, crânguri, pe lângă drumuri, în rărişuri, poieni şi pe marginea pădurilor, în păşuni şi fâneţe, adesea. Bucureşti, la «Moara-lui-Ciurel» prin fâneţe în lunca Dâmboviţei; Domneşti, Ciutaţi, în «Dumbravă»; Ciorogârta, în pă-

durea «Cotroceanca»; Gogoșari, spre Varlam prin tufișurile de pe marginea sămănăturilor; Călugăreni, Crucea-de-piatră, pe marginea pădurii «Uzun»; Comana, pe marginea pădurii, abundent și prin poienile dela «Fântâna-cu-nucu»; Mănăstirea Cernica, în pădurea «Cernica»; Mănăstirea Pasărea, pe marginea pădurii «Pasărea»; Mănăstirea Căldărușani, pe marginea pădurii Brânzeasca», abundent; Mănăstirea Snagov, cătunul «Fundu», pe insulă și pe marginea drumului; Mănăstirea Țigănești, pe marginea pădurii «Ciolpani» spre lacul «Bălteni». 4. Iunie — August.

**Galium Mollugo** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 107 și ed. 2. (1762). 155. DC. Prodr. IV. 596. KOCH, Syn. ed. 2. 365. LEDEB. fl. ross. II. 407. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XVII. 99. t. 136. fig. I și t. 137. fig. I. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 460. FIEK, Fl. von Schlesien 201. HALLIER, Fl. von Deutschld XXVIII. 79. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 1125. ROUY, Fl. Franc. VIII. 13. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 671. NYMAN, Consp. 324. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 283. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. I. 710. SCHUMANN, Rubiaceae în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. Abteilung 4. pag. 151. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 250 și Flora Dobrogei 255.—Vulg. Drăgaică, Sâmbziene, Sânzănie, Sâmbziene-albe. — Prin tufișuri în livezi, rărișuri, poieni și pe marginea pădurilor prin pășuni și fânețe, adesea. 4. Mai—August.

var. **elatum** THUILL apud FIEK, Fl. von Schlesien 201. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich. 1125. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XVII. 99. t. 137. fig. I. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 671. *Galium elatum* THUILL. Fl. Paris. ed. 2. (1790). 76. apud GREN. GODR. Fl. Franc. II. 22. GRECESCU, Conspect. fl. României 270 și Supplement 75. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. XII. 197. Ciorogârla, pe marginea pădurii «Cotroceanca»; Măgurele, prin tufișurile de pe marginea Sabarului; Călugăreni, prin fânețele din câmp, pe marginea pădurii «Uzun» și pe marginea pădurii «Crucea-de-piatră»; Comana, la «Fântâna-cu-nucu» prin poieni și pe marginea pădurii, adesea; Cățelu, pe lângă linia forturilor; Mănăstirea Cernica, în pădurea «Cernica»; Mănăstirea Pasărea, în pădurea «Pasărea»; Mănăstirea Snagov, cătunul «Fundu», pe insulă; Mănăstirea Țigănești, pe marginea pădurii «Ciolpani»; frecvent.

**Galium Schultesii** VEST. în Flora (1821). II. 530 cnf. A. KERNER în Oester. Botanische Zeitschrift XXIV. (1876). 114—118. FIEK, Fl. von Schlesien 201. SAGORSKI und SCHNEIDER, Flora der Centrankarpathen II. 206. PORCIUS, Diagnozele 107. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld XII, 196. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 671. NYMAN, Consp. 325. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 285. SCHUMANN, Rubiaceae în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. Abteilung 4. pag. 151. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 250.

Contribuțiuni nouă la Flora României și Flora Dobrogei 255. GRECESCU, Conspect. fl. României 271 și Suplement 76. *Galium silvaticum* BMGT. et Auct. Trans. omnium non L.—Vulg. Cucută-de-pădure, Sămcuță.— Prin păduri umbroase, adesea. Mănăstirea Cernica, în pădurea «Cernica», frecvent; Mănăstirea Pasărea, în pădurea «Pustnicu», abundent; Mănăstirea Țigănești, în pădurea «Țigănești», aproape de satul «Țigănești», frecvent. 4. Iunie—August.

*Galium Schultesii* VEST. este o plantă nouă pentru Flora Bucureștilor, căci n'a mai fost până acum citată de nimeni din această regiune.

*Galium uliginosum* L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 106 și ed. 2. (1762). 153. DC Prodr. IV. 597. KOCH, Syn. ed. 2. 363. LEDEB, fl. ross. II. 408. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 40. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XVII. 95. t. 42. fig. II. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 458. FIEK, Fl. von Schlesien 199. HALLIER, Fl. von Deutschld XXVIII. 53. t. 2887. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 1125. COSTE, Fl. Franc. II. 243. ROUY, Fl. Franc. VIII. 41. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld XII. 209. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 670. NYMAN, Consp. 327. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 286. SCHUMANN, Rubiaceae în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. Abteilung. 4. pag. 151. GRECESCU, Conspect. Fl. României 273. Prin livezi umede mlăștinoase, prin șanțuri, gropi cu apă, în tufișuri umede. București, proprietatea «Davila», în locurile umede sub palatul «Cotroceni». 4 Maiu—August.

*Galium palustre* L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 105 și ed. 2. (1762). 153 DC. Prodr. IV. 597. KOCH, Syn. ed. 2. 363. LEDEB, fl. ross. II. 408. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 39. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XVII. 95. t. 144. fig. I. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 459. FIEK, Fl. von Schlesien 199. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXVIII. 59. t. 2889. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 1120. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. XII. 208. COSTE, Fl. Franc. II. 243. ROUY, Fl. Franc. VIII. 42. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 670. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 286. SCHUMANN, Rubiaceae în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. Abteilung 4. pag. 151. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 248 și Flora Dobrogei 254. GRECESCU, Conspect. fl. României 274 și Suplement 77. Prin locuri umede mlăștinoase, în livezi umede, în tufișurile umede, prin bălți, pe marginea păraielor și lacurilor, adesea. București, proprietatea «Davila» în locurile umede sub palatul «Cotroceni»; Moara-lui-Ciurel, pe locurile umede de pe marginea Dâmboviței; Ciorogârla, în pădurea «Cotroceanca» pe loc mlăștinos, frecvent; Malul-Spart, pe locurile umede din pădurea «Căscioareanca», abundent; Călugăreni, Crucea-de-piatră, în pădurea «Crucea-de-piatră», pe locurile umede dela «Șipot»; Comana, pe marginea bălții; Oltenița, în pădurea de pe marginea Dunării, aproape de gura Argeșului; Chitila, în locuri umede mlăștinoase; Mănăstirea Pasărea, în

pădurea «Pustnicu» și în pădurea «Pasărea» pe locuri umede, frecvent; Mănăstirea Căldărușani, pe locuri umede în pădurea «Brânzeasca», adesea; Mănăstirea Snagov, pe locurile umede de pe marginea lacului, aproape de satul Dobroșești; Mănăstirea Țigănești, pe drumul dintre pădurea «Ciolpani» și pădurea «Tâncăbești». 4. Maiu—Iulie. Variază.

β. *brachyphyllum* OPIZ. apud. BECK. l. c. — Foile obovale sau invers-oval-lanceolate de 2—5 mm. lățime. Mănăstirea Țigănești, în pădurea Țigănești.

γ. *elongatum* PRESL. apud BECK. l. c. GARCKE. l. c. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XVII. 95. t. 144. fig. III. *Galium elongatum* PRESL. București, la «Moara-lui-Ciurel» prin locurile umede din lunca Dâmboviței; Măgurele, pe locurile umede de pe marginea Sabarului; Cățelu, prin locurile umede de pe lângă linia fortului, frecvent.

*Galium Aparine* L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 108 și ed. 2. (1762). 157. KOCH, Syn. ed. 2. 362. LEDEB. fl. ross. II. 419. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 43. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XVII. 94. t. 146. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 558. FIEK, Fl. von Schlesien 199. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXVIII. 50. t. 2886. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 1122. COSTE, Fl. Franc. II. 244. ROUY, Fl. Franc. VIII. 48. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. XII. 210. fig. 29. a. dela pag. 211. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 669. NYMAN, Consp. 330. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 280. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 235. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. I. 721. SCHUMANN, Rubiaceae în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. Abteilung. 4. pag. 153. BRÂNDZĂ, în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. Abteilung. 4. pag. 153. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 247 și Flora Dobrogei 253. GRECESCU, Conspect. fl. României 274 și Suplement 77. — Vulg. Asprișoară, Cornățel, Lipici, Lipicioasă, Scaiu-mănunt, Turiță. — Prin locuri cultivate, pe lângă garduri prin vii, în tufișuri și prin păduri, comun. Ciorogârla, în pădurea «Cotrocianca», abundent; Călugăreni, Crucea-de-piatră, în pădurea «Crucea-de-piatră»; Comana, prin tufișuri; Chitila, în tufișuri; Ciocănești, în pădurea «Popeasca»; Mănăstirea Pasărea, în pădurea «Pasărea»; Mănăstirea Căldărușani, pe marginea pădurii spre livadia «Pârîta»; Mănăstirea Țigănești, în pădurea «Ciolpani». ☉. Iunie — Septemvrie.

*Galium Cruciată* SCOP. Fl. Carn. ed. 2. (1772). I. 100. DC. Prodr. IV. 606. KOCH, Syn. ed. 2. 361. LEDEB. fl. ross. II. 416. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 16. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XVII. 100. t. 134. fig. I. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 456. FIEK, Fl. von Schlesien 197. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXVIII. 35. t. 2879. COSTE, Fl. Franc. II. 241. ROUY, Fl. Franc. VIII. 6. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. XII. 215. t. 49. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 668. NYMAN, Consp. 331. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 235. SCHUMANN, Rubiaceae în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. Abteilung

4. pag. 152. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 246 și Flora Dobrogei 252. GRECESCU, Conspect. fl. României 275 și Suplement 77. *Galium Cruciatum* L. sub. *Valantia* apud BOISS. fl. orient. III. 79. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 280. *Galium cruciatum* Scop. apud BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 1120. *Galium cruciatum* L. sub *Valantia* apud HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. I. 727. *Valantia Cruciatum* L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 1052 și ed. 2. (1763). 1491. STURM, Deutschlands Flora Heft 7. (1799). t. 16. *Aparine latifolia* MÖNCH.—Vulg. Smântânică.— Prin livezi, pe lângă drumuri, în rărișuri, poieni și pe marginea pădurilor în tufișuri, adesea. Ciorogârla, în pădurea «Cotrocenca», frecvent; Copăceni, spre Jilava în pădurea de pe marginea șoselei; Călugăreni, Crucea-de-piatră, în pădurea «Uzun», în pădurea «Crucea-de-piatră» și în pădurea «Dadilov», frecvent; Comana, în pădure, abundant; Chitila, prin pădure, frecvent; București, Colentina, în pădurea «Andronache»; Mănăstirea Cernica, aproape de localitatea «La-Anini»; Mănăstirea Pasărea, în pădurea «Pustnicu» și în pădurea «Pasărea», adesea; Mănăstirea Căldărușani, în pădurea «Brânzeasca», frecvent; Mănăstirea Țigănești, în pădurea «Ciolpani». 4. Aprilie — Iunie.

**Galium vernum** SCOP. Fl. Carn. ed. 2. (1772). I. 99. t. 2. DC. Prodr. IV. 605. KOCH, Syn. ed. 2. 361. LEDEB. fl. ross. II. 417. Gren. Godr. Fl. Franc. II. 16. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XVII. 100. t. 134. fig. II. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 456. BOISS. fl. orient. III. 80. FIEK, Fl. von Schlesien 197. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXVIII. 38. t. 2880. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 1120. COSTE, Fl. Franc. II. 242. ROUY, Fl. Franc. VIII. 6. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld XII. 216. GARCKE. III. Fl. von Deutschld. 669. NYMAN, Consp. 331. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 235. SCHUMANN, Rubiaceae în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. Abteilung 4. pag. 152. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 247. GRECESCU, Conspect. fl. României 275 și Suplement 77. *Galium glabrum* L. sub *Valantia* apud SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 279. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. I. 727. *Valantia glabra* L. Sp. pl. ed. 2. (1763). 1491. Prin păduri umede și umbroase, prin livezi și poieni în tufișuri. Mănăstirea Țigănești, în pădurea «Ciolpani», nu tocmai frecvent. 4. Maiu—August.

Această plantă este nouă pentru Flora Bucureștilor, căci la noi până acum eră cunoscută numai dela munte.

**Galium retrorsum** DC. Prodr. IV. 605. SAGORSKI und SCHNEIDER, Flora der Centralkarpathen II. 204. PORCIUS, Diagnozele 105. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 280. GRECESCU, Conspect. fl. României 275 și Suplement 77. *Galium pedemontanum* AUCT. non ALL. *Vaillantia pedemontana* W. et KIT. Descript. et icon. pl. rar. Hung. I. (1802). 32. t. 33. non BELL. Pe coline aride, în locuri năsipose, prin fânețe în livezi, pe coastele expuse soarelui, prin

poieni și pe marginea pădurilor, adesea. Călugăreni, Crucea-de-piatră, pe marginea pădurii «Uzun»; Comana, pe marginea pădurii; Mănăstirea Pasărea, prin răișuri și poieni în pădurea «Pasărea»; Mănăstirea Căldărușani, pe marginea pădurii în livadia «Pârîta»; Mănăstirea Țigănești, pe marginea pădurii «Ciolpani», frecvent. ☉. Maiu—Iunie.

**Galium rubioides** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 105 și ed. 2. (1762). 152. DC. Prodr. IV. 599. KOCH, Syn. ed. 2. 364. LEDEB. fl. ross. II. 410. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XVII. 101. t. 135. fig. I. BOISS. fl. orient. III. 48. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXVIII. 68. t. 2892. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 1121. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 670. NYMAN, Consp. 323. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 286. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 231. SCHUMANN, Rubiaceae în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. Abteilung 4. pag. 152. BRÂNDZA, Prodr. fl. române 248 și Flora Dobrogei 254. GRECESCU, Conspect. fl. României 276. Prin livezi în locuri deschise, prin lăstari, prin lunci, în răișuri, poieni și pe marginea pădurilor, adesea. Mănăstirea Pasărea, în pădurea «Pustnicu» și pe marginea pădurii «Pasărea», frecvent; Mănăstirea Căldărușani, pe marginea pădurii «Brânzeasca», adesea. 4. Maiu—Iulie.

#### CAPRIFOLIACEAE.

**Sambucus Ebulus** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 269 și ed. 2. (1762). 385. DC. Prodr. IV. 322. KOCH, Syn. ed. 2. 356. LEDEB. fl. ross. II. 382. GREINER, Fl. Franc. II. 6. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XII. t. 1434. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 467. BOISS. fl. orient. III. 2. FIEK, Fl. von Schlesien 193. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXVIII. 106. t. 2907. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 1133. COSTE, Fl. Franc. II. 230. ROUY, Fl. Franc. VIII. 68. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. XII. 223. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 673. SCHWERIN, Monographie der Gattung *Sambucus* pag. 26. NYMAN, Consp. 321. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 275. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 230. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. I. 696. FRITSCH, Caprifoliaceae în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. Abteilung 4. pag. 162. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române. 241 și Flora Dobrogei 258. GRECESCU, Conspect. fl. României 277. *Ebulum humile* GARCKE.—Vulg. Boj, Boz, Bozie.—Pe marginea pădurilor, în tufișuri, pe lângă garduri și drumuri, pe câmp și în locuri necultivate, adesea. București, la «Moara-lui-Ciurel», în lunca Dâmboviței; Ciorogârla, pe marginea pădurii «Cotroceanca», frecvent; Domnești, Ciutați în «Dumbravă»; Călugăreni, Crucea-de-piatră, pe marginea pădurii; Chitila, pe marginea pădurii; Mănăstirea Căldărușani, pe marginea pădurii «Brânzeasca». 4. Iunie—August.

**Sambucus nigra** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 269 și ed. 2. (1762). 385. DC. Prodr. IV. 322. KOCH, Syn, ed. 2. 356. LEDEB. fl. ross. II. 383. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 7. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XII. 31. t. 1435. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 468. BOISS. fl. orient. III. 2. FIEK, Fl. von Schlesien 192. HALLIER, Fl. von Deutschld XXVIII. 110. t. 2908. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 1133. COSTE, Fl. Franc. II. 230. ROUY, Fl. Franc. VIII. 69. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. XII. 224. t. 42. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 673. DIPPEL, Handb. Laubholzkunde I. 168. KOEHNE, Deutsche Dendrologie 533. SCHNEIDER, Ill. Handb. Laubholzkunde II. 632. SCHWERIN, Monographie der Gattung *Sambucus* pag. 28. NYMAN, Consp. 321. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 275. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 230. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. 697. FRITSCH, Caprifoliaceae în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. Abteilung. 4. pag. 162. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 242 și Flora Dobrogei 258. GRECESCU, Conspect. fl. României 277. *Sambucus vulgaris* LAMK. — Vulg. Soc. — Prin păduri, în lunci, prin mă-răcinișuri, în grădini și pe lângă garduri, adesea. Chitila, în pădure, frecvent; Comana, prin pădure, adesea, 5. Maiu—Iulie.

**Viburnum Opulus** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 268 și ed. 2. (1762). 384. STURM, Deutschlands Flora Heft 27 (1809). t. 6. DC. Prodr. IV. 328. KOCH, Syn. ed. 2. 356. LEDEB. fl. ross. II. 384. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 8. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XVII. 84. t. 120. fig. III și IV. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 467. BOISS. fl. orient. III. 3. FIEK, Fl. von Schlesien 193. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXVIII. 120. t. 2912. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 1130. COSTE, Fl. Franc. II. 231. ROUY, Fl. Franc. VIII. 70. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. XII. 172. t. 43. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 676. DIPPEL, Handb. Laubholzkunde I. 172. KOEHNE, Deutsche Dendrologie 538. SCHNEIDER, Illustr. Handb. Laubholzkunde II. 640. NYMAN, Consp. 320. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 276. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 229. FRITSCH, Caprifoliaceae în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. Abteilung 4. pag. 164. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 242 și Flora Dobrogei 257. GRECESCU, Conspect. fl. României 278. PANȚU, Contribuțiuni nouă la Flora Ceahlăului 23.—Vulg. Călin.—Prin păduri și tufișuri umede, pe marginea râurilor, adesea. Chitila, prin pădure în locurile umede, mlăștinoase, abundant; Ciocănești, în locurile umede din pădurea «Popeasca», frecvent; Mănăstirea Cernica, localitatea «La-Anini», pe locurile umede mlăștinoase, abundant; Mănăstirea Pasărea, în pădurea «Pustnicu», pe marginea lacului «Pasărea», frecvent. 5. Maiu—Iunie.



## ADOXACEAE.

*Adoxa Moschatellina* L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 367 și ed. 2. (1762). 527. DC. Prodr. IV. 252. KOCH, Syn. ed. 2. 355. LEDEB. fl. ross. II. 382. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 6. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XVII. 83. t. 121. fig. I. și II. STURM, Deutschlands Flora Heft 95. (1855). t. 9. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 468. BOISS. fl. orient. III. 2. FIEK, Fl. von Schlesien 192. HALLIER, Fl. von Deutschld XXVIII. 103. t. 2906. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 1134. COSTE, Fl. Franc. II. 229. ROUY, Fl. Franc. VIII. 67. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 672. NYMAN, Consp. 321. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 275. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 230. FRITSCH, Adoxaceae în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. Abteilung 4. pag. 171. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 241; Contribuțiuni nouă la Flora României 12 și Flora Dobrogei 257. GRECESCU, Conspect. fl. României 277 și Supplement 77. *Moschatellina tetragona* MOENCH., *Moschatellina Adoxa* SCOP. Fl. Carn. ed. 2. (1772). I. 281. *Moschatellina generalis* KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. XII. 222. t. 41.—Vulg. Frăguliță, Moscușor. — Prin pădurile umede și umbroase, adesea. Roșu lângă București, în pădurea «Roșu»; Ciorogârla, în pădurea «Cotroceanca», frecventă; Malul-Spart, în pădurea «Căscioceanca», adesea; Chitila, în pădure, fracventă; Buftea, în pădurea «Răioasa»; Băneasa, lângă «Șoseaua Kiselef» în pădure; București, Colentina, în pădurea «Andronache»; Pantelimon, în pădure, aproape de stația Pantelimon; Mănăstirea Cernica, în pădurea «Cernica», frecventă; Mănăstirea «Păsărea», în pădurea «Pustnicu», abundentă. 4. Martie—Aprilie.

## VALERIANACEAE.

*Valerianella olitoria* POLL. Hist. pl. Palat. I. (1776). 30. KOCH, Syn. ed. 2. 372. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 58. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 312. FIEK, Fl. von Schlesien 204. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 1136. COSTE, Fl. Franc. II. 267. ROUY Fl. Franc. VIII. 91. NYMAN, Consp. 338. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 240. HÖCK, Valerianaceae în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. Abteilung 4. pag. 178. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 253. GRECESCU, Conspect. fl. României 286 și Supplement 80. *Valerianella olitoria* MOENCH. Meth. (1794). 493. DC. Prodr. IV. 625. LEDEB. fl. ross. II. 428. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XII. 25. t. DCCVIII. fig. 1398. HALLIER, Fl. von Deutschld XXVIII. 176. t. 2934. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. XII. 231. t. 54. GARCKE, III Fl. von Deutschld. 677. *Valerianella olitoria* WILLD. apud STURM, Deutschlands Flora Heft 2. (1798). t.

3. BOISS. fl. orient. III. 104. *Valerinella olitoria* L. pro var. *Valerianae locustae* apud SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 290. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. I. 750. *Valeriana Locusta a. olitoria* L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 33 și ed. 2. (1762). 47. *Fedia olitoria* VAHL.—Vulg. Fetic, Fetică, Salata-mielului.—Prin locuri umede, pe câmpuri și livezi, prin vii și locuri cultivate, pe lângă garduri, adesea. Ciorogârla, prin rărișurile și poienile din pădurea «Cotroceanca»; Călugăreni, Crucea-de-piatră, pe locuri umede în pădurea «Crucea-de-piatră»; Grădiștea, pe lângă podul de peste râul Argeș, prin năsip; Comana, pe marginea pădurii, frecventă; Chitila, pe marginea pădurii; Mănăstirea Cernica, în pădurea «Cernica» prin poieni și rărișuri, frecventă. ☉. Aprilie—Maiu.

*Valerianella dentata* POLL. Hist. pl. Palat I. (1776). 30. KOCH, Syn. ed. 2. 372. RCHB. Icon fl. germ. et helv. XII. 25. t. DCCX. fig. 1403. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 312. FIEK, Fl. von Schlesien 204. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 1137. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 677. NYMAN, Consp. 339. HÖCK, Valerianaceae în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. Abteilung 4. pag. 177. *Valerianella Morisonii* DC. Prodr. IV. 627. LEDEB. fl. ross. II. 431. GREIN. GODR. Fl. Franc. II. 63. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXVIII. 184. t. 2938. COSTE, Fl. Franc. II. 268. ROUY, Fl. Franc. VIII. 96. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. XII. 230. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 241. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 254. GRECESCU, Conspect. fl. României 287 și Supplement 80. *Valerianella Morisonii* SPRENG sub *Fedia Morisonii* SPRENG. Pugil. I. (1813). 4.—Prin locuri cultivate în sămănături, pe câmpuri și coline sterile, prin livezi, în rărișuri, poieni și pe marginea pădurilor, adesea. Comana, pe marginea sămănăturilor și pe lângă pădure, frecventă; Chitila, lângă gară prin fânețe; Mănăstirea Pasărea, pe marginea pădurii «Pasărea», abundentă; Mănăstirea Căldărușani, pe marginea pădurii în livadia «Pârâta». ☉. Maiu—Iunie.

*Valeriana officinalis* L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 31. ed. 2. (1762). 45. KOCH, Syn. ed. 2. 369. LEDEB, fl. ross. II. 438. GREIN. GODR. Fl. Franc. II. 54. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 313. BOISS. fl. orient. III. 89. FIEK, Fl. von Schlesien 202. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 1137. COSTE, Fl. Franc. II. 262. ROUY, Fl. Franc. VIII. 83. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 677. HÖCK, Valerianaceae în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. Abteilung 4. pag. 179. NYMAN, Consp. 336. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 239. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 252 și Flora Dobrogei 247. GRECESCU, Conspect. fl. României 284 și Supplement 79. —Vulg. Odolean, Gușa-porumbului, Năvalnic.—Prin fânețe umede, în păduri umbroase și umede în rărișuri, poieni și pe lângă păraie, adesea. 4. Maiu—Iulie. Variază.

**α. major** KOCH. l. c. — caule altiore, foliolis omnibus dentatis. — *Valeriana officinalis* L. apud STURM, Deutschlands Flora Heft 9. (1801). t. 4. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XII. 30. t. DCCXXVII. fig. 1432. București, la «Moara-lui-Ciurel» în lunca Dâmboviței; Ciorogârla, în pădurea «Cotroceanca», frecventă; Malul-Spart, în pădurea «Căscioceanca»; Călugăreni, Crucea-de-piatră, în pădurea «Crucea-de-piatră», pe locurile umede dela «Șipot»; Chitila, pe locurile umede de pe marginea pădurii, abundentă.

**β. angustifolia** TAUSCH apud FIEK, Fl. von Schlesien 202. PANȚU, Contribuțiuni nouă la Flora Ceahlăului 24. *Valeriana angustifolia* TAUSCH. apud DC. Prodr. IV. 641. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XII. 30. t. DCCXXVIII. fig. 1433. *Valeriana officinalis* L. **β. minor** KOCH. l. c. — foliolis integerrimis vel infimis paucidentatis. — LEDEB. fl. ross. II. 438. ROUY, Fl. Franc. VIII. 84. BRÂNDZĂ, Prod. fl. române 252. *Valeriana officinalis* L. **β. collina** WALLR. apud GRECESCU, Conspect. fl. României 285 și Suplement 79. *Valeriana collina* WALLR. în Linnaea XIV. (1840). 537. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 288. *Valeriana officinalis* L. **α. pratensis** DIERB. apud BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 1137. Comana, prin pădure, adesea împreună cu var. **α.**; Mănăstirea Cernica, pe marginea pădurii «Cernica», cam în dreptul șoselei ce duce la «Cozieni»; Mănăstirea Pasărea, în pădurea «Pasărea», abundentă.

#### DIPSACACEAE.

**Cephalaria transsilvanica** SCHRAD. Cat. sem. hort. Goett. (1814). DC. Prodr. IV. 647. KOCH, Syn. ed. 2. 375. LEDEB. fl. ross. II. 448. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 70. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 318. HALLEIR, Fl. von Deutschld. XXVIII. 211. t. 2947. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 1144. COSTE, Fl. Franc. II. 273. ROUY, Fl. Franc. VIII. 102. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld XIII. 8. NYMAN, Consp. 346. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 247. HÖCK, Dipsacaceae în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. Abteilung 4. pag. 188. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 255. și Flora Dobrogei 244. GRECESCU, Conspect. fl. României 280 și Suplement 78. *Cephalaria Transsilvanica* L. sub *Scabiosa* apud BOISS. fl. orient. III. 118. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 292. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. I. 759. *Scabiosa transsylvanica* L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 98 și ed. 2. (1762). 141. *Succisa transsilvanica* SPRENG. Syst. veg. I. 378. *Succisa transsylvanica* L. (sub *Scabiosa*), apud RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XII. 22. t. DCXCIX. fig. 1387. — Vulg. Sipică. — Pe marginea sămănăturilor și a viilor, pe câmpuri și coline aride, adesea. Măgurele, pe marginea Sabarului; Ciorogârla, pe marginea pădurii «Cotroceanca», frecventă; Băcu, Arcuda pe lângă filtre

și pe marginea pădurii «Ileana», frecventă; Păslari, spre Pârliți printre vii; Călugăreni, Crucea-de-piatră, pe marginea pădurii «Uzun»; Comana, pe marginea drumului; Mihai-Bravul, spre Comana, pe marginea drumului de fier; Oltenița, pe marginea șoselei spre București, abundentă; Chitila, pe marginea sămănăturilor; Băneasa, lângă Șoseaua Kiselef, frecventă; Cățelu, pe linia forturilor; Mănăstirea Pasărea, pe marginea șoselei, lângă pădurea «Cernica» și pe marginea pădurii «Pasărea», abundentă; Mănăstirea Țigănești, pe marginea pădurii «Ciolpani» și pe drumul dintre pădurea «Ciolpani» și pădurea «Tâncăbești». ☉. Iulie—August.

**Dipsacus silvestris** HUDS. Fl. Angl. ed. 1. (1762). 49. apud. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 317. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 1143. NYMAN, Consp. 345. *Dipsacus silvestris* MILL. Gard. Dict. (1768). No. 1. apud. DC. Prodr. IV. 645. KOCH, Syn. ed. 2. 374. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 67. HALLIER, Fl. von Deutschld XXVIII. 205. t. 2944. COSTE, Fl. Franc. II. 272. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 254 și Flora Dobrogei 243. *Dipsacus sylvestris* L. apud. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XII. 24. t. DCCVII. fig. 1397. LEDEB. fl. ross. II. 444. BOISS. fl. orient. III. 115. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. XIII. 10. t. 1. fig. 2. *Dipsacus silvester* HUDS. apud. HÖCK, Dipsacaceae în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. Abteilung 4. pag. 188. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 680. *Dipsacus silvester* MILL. apud. FIEK, Fl. von Schlesien 205. *Dipsacus fullonum* a. L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 97 și ed. 2. (1762). 140. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 291. GRECESCU, Conspect. fl. României 279 și Supplement 78.—Vulg. Iarbă-voinicească, Lugaciu, Scaiu-voinicesc, Scaiu-voinicului, Scăietete, Varga-ciobanului, Varga-păstorului.—Pe lângă drumuri, șanțuri, prin livezi și locuri inculte năsipoașe și umede, în fânețe prin tufșuri și pe marginea pădurilor, adesea. Budești, pe lângă pădurea de pe marginea râului Argeș, frecvent; Mănăstirea Țigănești, pe marginea pădurii «Ciolpani»; Mănăstirea Snagov, cătunul «Fundu», pe insulă. ☉. Iulie—August.

**Dipsacus laciniatus** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 97 și ed. 2. (1762). 141. KOCH, Syn. ed. 2. 375. LEDEB. fl. ross. II. 445. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 68. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XII. 24. t. DCCV. fig. 1394. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 317. BOISS. fl. orient. III. 116. FIEK, Fl. von Schlesien 205. HALLIER, Fl. von Deutschld XXVIII. 208. t. 2945. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 1143. COSTE, Fl. Franc. II. 272. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld XIII. 10. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 680. NYMAN, Consp. 345. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 291. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 247. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. I. 757. HÖCK, Dipsacaceae în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. Abteilung 4. pag. 188. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 255 și Flora Dobrogei 244. GRECESCU, Conspect. fl. României 280.—Prin livezi și tufșuri

umede, pe marginea pădurilor și pe malurile apelor, adesea. Ciorogârla, pe marginea pădurii «Cotroceanca»; Călugăreni, Crucea-de-piatră, în lunca Călniștei; Comana, pe marginea drumului de fier; Budești, pe lângă pădurea de pe marginea râului Argeș, împreună cu specia precedentă; Mănăstirea Pașărea, pe marginea pădurii «Pustnicu»; Mănăstirea Țigănești, pe lângă pădurea «Ciolpani». ☉. Iulie—August.

**Knautia arvensis** COULT. apud. DC. Prodr. IV. 651. KOCH, Syn. ed. 2. 376. LEDEB. fl. ross. II. 450. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 318. FIEK, Fl. von Schlesien 206. HALLIER, Fl. von Deutschld XXVIII. 202. t. 2943. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 1146. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. XIII. 14. t. 2. GARCKE, III. Fl. von Deutschld 681. HÖCK, Dipsacaceae în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. Abteilung 4. pag. 188. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 256. GRECESCU, Conspect. fl. României 281 și Suplement 78. *Knautia arvensis* KOCH. apud GREN. GODR. Fl. Franc. II. 72. COSTE, Fl. Franc. II. 275. *Knautia arvensis* DUBY, apud BRÂNDZĂ, Flora Dobrogei 246. *Knautia arvensis* L. sub *Scabiosa* apud BOISS. fl. orient. III. 128. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 294. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 248. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. I. 760. *Scabiosa arvensis* L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 99 și ed. 2. (1762). 143. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XII. 18. t. DCLXXX. fig. 1353. *Trichera arvensis* SCHRAD. Cat. sem. hort. Goett. NYMAN, Consp. 347.—Vulg. Mușcatu-dra cului.—Prin livezi, rărișuri, poieni și pe marginea pădurilor prin fânețe și tufișuri, adesea. Călugăreni, prin fânețele din câmp; Comana, pe marginea pădurii, frecventă; Mănăstirea Pașărea, în pădurea «Pașărea». 4, Maiu—August.

**Knautia atrorubens** JANKA. apud. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 257 și Flora Dobrogei 246. GRECESCU, Conspect. fl. României 281 și Suplement 78. *Trichera arvensis* var. *purpurea* HOFFM. exsic.—Prin fânețe în livezi, prin rărișuri, poieni și pe marginea pădurilor în tufișuri, adesea. Călugăreni, Crucea-de-piatră, pe marginea pădurii «Uzun; Comana, prin fânețele de pe marginea pădurii; Băneasa, pe marginea Colentinei; Chitila, pe marginea pădurii; Mănăstirea Pașărea, pe marginea pădurii «Pustnicu» și pe marginea pădurii «Pașărea», abundentă; Mănăstirea Căldărușani, pe marginea pădurii în livadia «Pârîta», pe marginea pădurii «Moara-Săracă» și pe marginea pădurii «Brânzeasca», abundentă. 4. Maiu—Iulie.

**Scabiosa ochroleuca** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 101 și ed. 2. (1762). 146. DC. Prodr. IV. 658. KOCH, Syn. ed. 2. 378. LEDEB. fl. ross. II. 456. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 78. BOISS. fl. orient. III. 131. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXVIII. 218. t. 2951. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 1149. ROUY, Fl. Franc. VIII. 129. NYMAN, Consp. 343. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 295. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 243. HÖCK, Dipsacaceae în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV.

Teil. Abteilung 4. pag. 189. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 258 și Flora Dobrogei 245. GRECESCU, Conspect. fl. României 284 și Suplement 79. *Scabiosa Columbaria* b. *ochroleuca* L. apud FIEK, Fl. von Schlesien 207. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 682. *Scabiosa columbaria* L.  $\mu.$  *ochroleuca* COULT. apud. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 321. *Asterocephalus ochroleucus* L. (sub *Scabiosa*) apud. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XII. 21. t. DCXCIV. fig. 1379.—Vulg. Ruin, Sipică.—Prin livezi, rărișuri, poieni și pe marginea pădurilor, prin fânețele uscate și în locurile năsipose de pe coaste, adesea. Bâcu, pe marginea pădurii «Ileana»; Ciorogârla, pe marginea pădurii «Cotroceanca»; Călugăreni, Crucea-de-piatră, pe marginea pădurii «Uzun»; Comana, pe marginea pădurii până la stația Mihaiu-Bravul; Gruiu, pe marginea șoselei București-Oltenița; Mănăstirea Pasărea, pe marginea pădurii «Cernica» lângă șoseă și pe marginea pădurii «Pasărea», abundentă; Mănăstirea Căldărușani, pe marginea pădurii «Brânzeasca», abundentă. 4. Iunie—August.

#### CAMPANULACEAE.

**Campanula bononiensis** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 165 și ed. 2. (1762). 234. STURM, Deutschlands Flora Heft 72. (1838). t. 2. DC. Prodr. VII. sectio II. 469. KOCH, Syn. ed. 2. 538. LEDEB. fl. ross. II. 884. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 412. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 449. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XIX. 115. t. 237. fig. III. BOISS. fl. orient. III. 923. FIEK, Fl. von Schlesien 286. HALLIER, Fl. von Deutschld XXII. 90. t. 2224. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 1101. COSTE, Fl. Franc. II. 500. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. XII. 260. t. 59. ROUY, Fl. Franc. X. 71. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 686. NYMAN, Consp. 478. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 382. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 368. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. II. 262. SCHÖNLAND, Campanulaceae în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. 5. Abteilung pag. 50. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 329 și Flora Dobrogei 264. GRECESCU, Conspect. fl. României 382 și Suplement 109. Prin livezi, pe coastele expuse soarelui, prin vii, în rărișuri, poieni și pe marginea pădurilor, adesea. Călugăreni, Crucea-de-piatră, pe marginea pădurii «Uzun»; Comana, pe marginea pădurii; Mănăstirea Cernica, în pădurea «Cernica», prin rărișuri, aproape de linia lui «Ivan»; Mănăstirea Pasărea, în pădurea «Pustnicu»; Mănăstirea Căldărușani, pe marginea pădurii «Brânzeasca», abundentă; Mănăstirea Țigănești, pe drumul dintre pădurea «Ciolpani» și pădurea «Tâncăbești». 4. Iulie—August.

**Campanula rapunculoides** L. Sp. pl. ed. (1753). 165 și ed. 2. (1762). 234. DC. Prodr. VII. sectio. II. 469. KOCH, Syn. ed. 2. 539. LEDEB. fl. ross. II. 883. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 412. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 450.

RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XIX. 115. t. 239. fig. II. BOISS. fl. orient. III. 922. FIEK, Fl. von Schlesien 287. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXII. 93. t. 2225. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 1101. COSTE, Fl. Franc. II. 500. KRAUSE în LUTZ, Stürms Fl. von Deutschld. XII. 259. t. 60. fig. 2. ROUY, Fl. Franc. X. 72. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 686. NYMAN, Consp. 478. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 382. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 368. SCHÖNLAND, Campanulaceae în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. 5. Abteilung pag. 50. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 329 și Flora Dobrogei 264. GRECESCU, Conspect. fl. României 382 și Supplement 109.—Prin păduri și tufișuri, adesea. Domnești, Ciutați în dumbravă; Călugăreni, Crucea-de-piatră, în pădurea «Uzun» și în pădurea «Crucea-de-piatră», frecventă; Comana, pe marginea pădurii, la «Fântâna-cu-nucu» și la «Padina-lui-Vasile», abundentă; Budești, în pădurea de pe marginea râului Argeș; Chitila, pe marginea pădurii, frecventă; Mogoșoia, în pădure; Mănăstirea Cernica, în pădurea «Cernica» prin rărișuri și poieni; Mănăstirea Pasărea, în pădurea «Pustnicu», frecventă; Mănăstirea Țigănești, în pădurea «Ciolpani»; Mănăstirea Snagov, în pădure. 4. Iulie—August.

**Campanula Trachelium** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 166 și ed. 2. (1762). 235. DC. Prodr. VII. sectio II. 469. KOCH, Syn. ed. 2. 539. LEDEB. fl. ross. II. 882. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 411. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 450. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XIX. 115. t. 239. fig. I. BOISS. fl. orient. III. 922. FIEK, Fl. von Schlesien 287. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXII. 96. t. 2226. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 1101. COSTE, Fl. Franc. II. 500. KRAUSE în LUTZ, Stürms Fl. von Deutschld. XII. 258. t. 60. fig. 1. ROUY, Fl. Franc. X. 72. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 686. NYMAN, Consp. 478. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 382. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 368. SCHÖNLAND, Campanulaceae în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. 5. Abteilung, pag. 50. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 320 și Flora Dobrogei 264. GRECESCU, Conspect. fl. României 381 și Supplement 109. *Campanula urticifolia* SCHMIDT. Fl. Boëm. II. 73.—Prin păduri și tufișuri, adesea. Ciorogârla, în pădurea «Cotrocenca», abundentă; Malul-Spart, în pădurea «Căscioarenca»; Călugăreni, Crucea-de-piatră, în pădurea «Crucea-de-piatră»; Comana, în pădurea «Fântâna-cu-nucu», frecventă; Mănăstirea Țigănești, în pădurea «Ciolpani» și pe drumul dintre pădurea «Ciolpani» și pădurea «Tâncăbești», frecventă. 4. Iulie—August.

**Campanula patula** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 163. ed. 2. (1762). 232. DC. Prodr. VII. Sectio II. 480. KOCH, Syn. ed. 2. 540. LEDEB. fl. ross. II. 886. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 420. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 450. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XIX. 118. t. 253. fig. I. FIEK, Fl. von Schlesien 287. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXII. 116. t. 2236. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 1103. COSTE, Fl. Franc. II. 499. KRAUSE în LUTZ, Stürms Fl. von

Deutschld XII. 256. ROUY, Fl. Franc. X. 69. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 686. NYMAN, Consp. 482. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 383. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 370. HALÁCSY, Conspect, Fl. Graec. II. 270. SCHÖNLAND, Campanulaceae în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. 5. Abteilung pag. 51. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 330. GRECESCU, Conspect. fl. României 387 și Suplement 110.—Prin livezi, în locuri cu iarbă, în rârișuri, poieni și pe marginea pădurilor în tufișuri. Măgurele, în tufișurile de pe marginea Sabarului, rară. ☉. Maiu—August.

β *flaccida* WALLR.—rami filiformes, flores dimidio minores—adecă ramurile filiforme, florile de 2 ori sau chiar de 3 ori mai mici decât la forma tipică. KOCH, Syn. ed. 2. 541. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXII. pag. 118. var. *neglecta* DC. Prodr. VII. sectio II. 480. GRECESCU. l. c. *Campanula neglecta* ROEM et SCHULT. ROUY l. c. ca rasă de *Campanula patula* L.—Budești, în pădurea de pe marginea râului Argeș în locuri umbroase; Oltenița, pe locurile umbroase din pădurea de pe marginea Dunării, aproape de gura Argeșului, nu tocmai frecventă.

*Campanula patula* L. eră cunoscută până acum din regiunea Bucureștilor, numai dela Mogoșoia; cnf. GRECESCU, l. c.; iar varietatea *flaccida* WALLR. este nouă pentru Flora regiunii noastre.

*Campanula Rapunculus* L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 164 și ed. 2. (1762). 232. KOCH, Syn. ed. 2. 541. LEDEB. fl. ross. II. 887. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 419. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 451. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XIX. 118. t. 252. fig. II. BOISS. fl. orient. III. 939. FIEK, Fl. von Schlesien 288. HALLIER, Fl. von Deutschld XXII. 119. t. 2237. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 1103. COSTE, Fl. Franc. II. 499. KRAUSE în LUTZ, Sturms. Fl. von Deutschld. XII. 255. fig. 31. 2. dela pag. 254. ROUY, Fl. Franc. X. 70. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 687. NYMAN, Consp. 482. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 383. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 370. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. II. 270. SCHÖNLAND, Campanulaceae în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. 5. Abteilung pag. 51. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 331 și Flora Dobrogei 264. GRECESCU, Conspect. fl. României 388 și Suplement 110.—Vulg. Clopoștei.—Prin livezi, rârișuri, poieni și pe marginea pădurilor, adesea. Ciorogârla, în pădurea «Cotroceanca»; Malul-Spart, în pădurea «Căscioceanca», frecventă; Comana, la «Padina-lui-Vasile»; Mănăstirea Pasărea, în pădurea «Pustnicu» și în pădurea «Pasărea», abundentă; Mănăstirea Căldărușani, prin poienile din pădurea «Brânzeasca», frecventă. ☉. Maiu—August.

Plantele din regiunea noastră au laciniiile caliciului mai mult sau mai puțin denticulate, ba uneori dinții sunt așa de mari încât devin adevărate lacinii secundare. Acest caracter face ca plantele noastre să ne amintească varietatea γ. *Lambertiana* BOISS. fl. orient. III. 940.



**Campanula persicifolia** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 164. DC. Prodr. VII. sectio. II. 479. LEDEB. fl. ross. 885. KOCH, Syn. ed. 2. 541. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 420. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 451. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XIX. 118. t. 252. fig. I. BOISS. fl. orient. III. 935. FIEK, Fl. von Schlesien 288. HALLIER, Fl. von Deutschld XXII. 122. t. 2238. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 1102. COSTE, Fl. Franc. II. 499. KRAUSE în LUTZ, Sturms. Fl. von Deutschld. XII. 253. fig. 31. 1. dela pag. 254. ROUY, Fl. Franc. X. 68. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 687. NYMAN, Consp. 481. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 383. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 369. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. II. 267. SCHÖNLAND, Campanulaceae în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. 5. Abteilung pag. 51. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 331 și Flora Dobrogei 264. GRECESCU, Conspect. fl. României 386 și Suplement 110. *Campanula decurrens* L. Sp. pl. ed. 2. (1762). 232.—Prin livezi, crânguri, în rărișuri, poieni și pe marginea pădurilor, în tufișuri, adesea. Domnești, Ciutați în dumbravă; Ciorogârla, în pădurea «Cotroceanca»; Călugăreni, Crucea-de-piatră, pe marginea pădurii «Uzun», și în pădurea «Crucea-de-piatră, abundentă; Comana, prin pădure; Chitila, în pădure; Mănăstirea Cernica, în pădurea «Cernica»; Mănăstirea Pasărea, în pădurea «Pasărea», frecventă; Mănăstirea Căldărușani, pe marginea pădurii «Brânzeasca» și prin poieni, abundentă. 4. Iunie—August.

**Campanula Cervicaria** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 167 și ed. 2. (1762). 235. DC. Prodr. VII. sectio II. 468. KOCH, Syn. ed. 2. 542. LEDEB, fl. ross. II. 881. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 409. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 452. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XIX. 113. t. 235. fig. I. FIEK, Fl. von Schlesien 288. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXII. 133. t. 2242. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 1100. COSTE, Fl. Franc. II. 498. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. XII. 265. ROUY, Fl. Franc. X. 65. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 687. NYMAN, Consp. 477. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 381. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 367. SCHÖNLAND, Campanulaceae în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. 5. Abteilung pag. 51. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 332. GRECESCU, Conspect. fl. României 380 și Suplement 109.—Prin livezi, în rărișuri, poieni și pe marginea pădurilor în tufișuri, nu tocmai frecventă. Mănăstirea Cernica, în pădurea «Cernica»; Mănăstirea Pasărea, în pădurea «Pustnicu», ici colea, nu tocmai frecventă, în pădurea «Pasărea», rară; Mănăstirea Căldărușani, în pădurea «Brânzeasca», frecventă. 4. Iunie—August.

**Campanula macrostachya** KIT. în WILLD. Enum. Berol. I. (1809). 213. NEILR. Diagnosen 81. NYMAN, Consp. 478. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 381. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 367. PORCIUS, Diagnozele 199. BRÂNDZĂ, Flora Dobrogei 265. GRECESCU, Conspect. fl. României 381 și Suplement 109. *Campanula multiflora* W. et KIT. Descript. et icon. pl. rar. Hung. III. (1812).

292. t. 263. DC. Prodr. VII. sectio II. 468. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XIX. 113. t. 234. fig. I. HEUFFEL, Enum. pl. Banat. Temes. 119. No. 1128. BOISS. fl. orient. III. 925. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 333.—Pe coaste în tușiuri, prin rășiuri, poieni și pe marginea pădurilor, nu tocmai frecventă. Comana, pe marginea pădurii și la «Fântâna-cu-nucu», sporadică; Mănăstirea Cernica, în pădurea «Cernica»; Mănăstirea Pasărea, în pădurea «Pasărea», destul de frecventă. 4. Iunie—Iulie.

**Campanula glomerata** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 166 și ed. 2. (1762). 235. DC. Prodr. VII. sectio II. 467. KOCH, Syn. ed. 2. 542. LEDEB. fl. ross. II. 880. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 409. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 451. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XIX. 112. t. 235. fig. II. BOISS. fl. orient. III. 926. FIEK, Fl. von Schlesien 288. HALLIER, Fl. von Deutschld XXII. 136. t. 2243. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 1100. COSTE, Fl. Franc. II. 498. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. XII. 265. ROUY, Fl. Franc. X. 66. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 687. NYMAN, Consp. 477. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 382. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 367. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. II. 259. SCHÖNLAND, Campanulaceae în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. 5. Abteilung pag. 51. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 332 și Flora Dobrogei 265. GRECESCU, Conspect. fl. României 380 și Supplement 109.—Vulg. Ciuciure.—Prin livezi, în rășiuri, poieni și pe marginea pădurilor, în fânețe și pășuni prin tușiuri, adesea, mai cu samă în terenuri calcaroase. Malul-Spart, în pădurea «Căscioareanca»; Mănăstirea Pasărea, pe marginea pădurii «Cernica», lângă șoseaua ce duce la Brănești, în pădurea «Pustnicu» și în pădurea «Pasărea», abundentă; Mănăstirea Căldărușani, în pădurea »Brânzeasca, frecventă; Mănăstirea Țigănești, în pădurea «Ciólpani». 4. Iunie—Iulie. Variază.

#### COMPOSITAE.

**Eupatorium cannabinum** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 838. și ed. 2. (1763). 1173. DC. Prodr. V. 180. KOCH, Syn. ed. 2. 382. LEDEB. fl. ross. II. 465. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XVI. 1. t. 1. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 323. BOISS. fl. orient. III. 154. FIEK, Fl. von Schlesien 208. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXIX. 42. t. 2955. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 1162. COSTE, Fl. Franc. II. 284. ROUY, Fl. Franc. VIII. 352. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. XIII. 33. t. 4. GARCKE, III. fl. von Deutschld. 695. NYMAN, Consp. 396. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 297. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 283. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. II. 10. HOFFMANN, Compositae în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. 5. Abteilung pag. 140. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 260 și Flora Dobrogei 222. GRECESCU, Conspect. fl. României 288 și Supplement 80.—Vulg. Cânepa-codrului, Cânepioară,

Cănepoală, Dumbra vnic.—Prin livezi în locuri umede, în lunci, pe marginea pâraielor, pe lângă izvoare, pe locurile umede din păduri, adesea. Măgurele, pe locurile umede de pe marginea Sabarului; Călugăreni, Crucea-de-piatră, pe locurile umede din pădure, lângă «Șipot», abundant; Chitila, pe marginea pădurii în locuri umede, frecvent; Mănăstirea Pasărea, în pădurea «Pustnicu»; Mănăstirea Țigănești, pe drumul dintre pădurea «Ciolpani» și pădurea «Tâncăbești», pe locuri umede, abundant și în pădurea «Țigănești» spre margine, aproape de satul Țigănești. 4. Iulie—August.

*Eupatorium cannabinum* L. este o plantă nouă pentru Flora regiunii Bucureștilor, căci n'a mai fost menționată până acum de nimeni din această regiune.

*Solidago Virga aurea* L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 880 și ed. 2. (1763). 1235. STURM, Deutschlands Flora Heft 9. (1801). t. 14. DC. Prodr. V. 338. KOCH, Syn. ed. 2. 389. LEDEB. fl. ross. II. 493. GREIN. GODR. Fl. Franc. II. 92. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XVI. 8. t. 20. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 332. FIEK, Fl. von Schlesien 213. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXIX. 111. t. 2979. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 1164. COSTE, Fl. Franc. II. 288. ROUY, Fl. Franc. VIII. 133. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. XIII. 37. t. 11. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 696. NYMAN, Consp. 387. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 302. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 277. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. II. 17. HOFFMANN, în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. 5. Abteilung pag. 150. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 266 și Flora Dobrogei 233. GRECESCU, Conspect. fl. României 294 și Supplement 82.—Vulg. Mănunchi, Smăoaică, Splinuță, Splinuță-de-aur, Vargă-de-aur.—Prin păduri și tufișuri în fânețe pe coline, adesea. Comana, pe marginea pădurii spre stația «Mihaiu-Bravul»; Mănăstirea Căldărușani, în pădurea «Moara-Săracă» și în pădurea «Brânzeasca»; Mănăstirea Țigănești, pe marginea pădurii «Ciolpani», spre lacul «Bălteni», frecventă. 4. Iulie—August. Variaza.

*Aster Amellus* L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 873 și ed. 2. (1763). 1226. DC. Prodr. V. 231. KOCH, Syn. ed. 2. 285. LEDEB. fl. ross. II. 476. GREIN. GODR. Fl. Franc. II. 101. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XVI. 6. t. 15. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 327. FIEK, Fl. von Schlesien 210. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXIX. 79. t. 2968. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 291. COSTE, Fl. Franc. II. 294. ROUY, Fl. Franc. VIII. 147. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. 44. t. 6. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 699. NYMAN, Consp. 387. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 277. HALÁCSY, Consp. Fl. Graec. II. 16. HOFFMANN, Compositae în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil 5. Abteilung pag. 163. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 263 și Flora Dobrogei 237. GRECESCU, Conspect. fl. României 291 și Supplement 81.—Vulg. Ochiu-boului, Rușă-de-toamnă-vânăță, Rușă-vânăță, Steliță, Steliță-vânăță.—Pe coline aride, pe

coaste, în măracinișuri, pe locuri pietroase, pe marginea pădurilor în tufișuri. Mănăstirea Pasărea, pe marginea pădurii «Pustnicu»; Mănăstirea Căldărușani, pe marginea pădurii «Brânzeasca», abundant. 4. Iulie—Septemvrie.

**Aster Tripolium** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 872. și ed. 2. (1763). 1226. KOCH, Syn. ed. 2. 385. GREN. GODR. Fl. Franc. II 101. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XVI. 6. t. 16. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 328. BOISS. fl. orient. III. 158. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXIX. 82. t. 2969. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 1169. COSTE, Fl. Franc. II. 294. ROUY, Fl. Franc. VIII. 147. KRAUSE în LUTZ, Sturms. Fl. von Deutschld. XIII. 45. t. 7. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 699. NYMAN, Consp. 387. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 300. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. II. 16. HOFFMANN, Compositae în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. 5. Abteilung pag. 163. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 264 și Flora Dobrogei 237. GRECESCU, Conspect. fl. României 292 și Suplement 81. *Tripolium vulgare* NEES AB ESENB. Aster. (1818). 153. DC. Prodr. V. 253. LEDEB. fl. ross. II. 477.—Pe locurile umede și sărate, pe lângă bălți sau mlaștini. ☺. Iulie—Septemvrie.

β. **pannonicus** JACQ. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XVI. 6. t. 16. fig. III. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 1169. BRÂNDZĂ, Flora Dobrogei 237. GRECESCU, Suplement 81. *Aster pannonicus* JACQ. Hort. Vindob. I. 3. t. 8. Comana spre Grădiște, pe locurile umede și sărate, frecventă.

*Aster Tripolium* L. este o plantă nouă pentru Flora regiunii Bucureștilor, căci n'a mai fost citată până acum de nimenea din această regiune.

**Aster Linosyris** BERNH. Verz. Pflanz. Erfurt. 151. FIEK, Fl. von Schlesien 210. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 1168. ROUY, Fl. Franc. VIII. 150. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. XIII. 60. fig. 3 dela pag. 61. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 698. HOFFMANN, Compositae în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. 5. Abteilung pag. 163. *Linosyris vulgaris* CASS. ex Less. Syn. (1832). 195. DC. Prodr. V. 352. KOCH, Syn. ed. 2. 384. LEDEB. fl. ross. II. 495. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 95. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 333. BOISS. fl. orient. III. 161. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXIX. 72. t. 2966. COSTE, Fl. Franc. II. 288. NYMAN, Consp. 386. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 299. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 276. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 262 și Flora Dobrogei 223. *Chrysocoma Linosyris* L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 841 și ed. 2. (1763). 1178. *Crinitaria Linosyris* LESS., *Galatella Linosyris* RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XVI. 8. t. 19. fig. I. *Erigeron Linosyris* CLAIRV.—Pe coastele expuse soarelui, pe câmpuri nășipoase, prin rărișuri, poieni și pe marginea pădurilor, în tufișurile din fânețe, nu tocmai frecventă. Călugăreni, Crucea-de-piatră, pe marginea pădurii «Uzun»; Comana, prin poieni. 4. Iulie — August.

**Erigeron canadense** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 863 și ed. 2. (1763). 1210. DC.

Prodr. V. 289. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterre ich 330. BOISS. fl. orient. III. 163. NYMAN, Consp. 389. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 301. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 278. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. II. 14. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 265. GRECESCU, Conspect. fl. României 292. *Erigeron canadensis* L. apud. KOCH, Syn. ed. 2. 388. LEDEB. fl. ross. II. 487. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 96. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XVI. 11. t. 26. fig. I. FIEK, Fl. von Schlesien 212. HALLIER. Fl. von Deutschld. XXIX. 90. t. 2972. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 1170. COSTE, Fl. Franc. II. 290. ROUY, Fl. Franc. VIII. 154. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld XIII. 59. t. 10. fig. 1. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 700. HOFFMANN, Compositae în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. 5. Abteilung pag. 164. BRÂNDZĂ, Flora Dobrogei 238.—Vulg. Bătrâniș, Coadă-vacii, Soricel, Spirince, Spirincea, Steluța.—Prin locuri cultivate și inculte, prin dărâmături, pe lângă case, pe marginea drumurilor, foarte comun. București, pe marginea Dâmboviței spre Moara-lui-Ciurel; Măgurele spre Nefliu, pe locurile umede năipoase de pe marginea Sabarului; Roșu lângă București, pe marginea pădurii; Ciorogârla, pe marginea pădurii «Cotroceanca»; Pâslari spre Pârliți, printre vii; Oltenița, în pădurea de pe marginea Dunării, aproape de gura Argeșului; Chitila, pe marginea pădurii; Mănăstirea Pasărea, pe marginea pădurii «Pustnicu», pe marginea pădurii «Cernica» lângă șoseaua ce duce la Brănești, abundent și pe marginea pădurii «Pasărea»; Mănăstirea Țigănești, pe marginea pădurii «Țigănești»; Mănăstirea Snagov, pe insulă prin dărâmăturile zidurilor mănăstirii. ☉. Iulie—August.

**Erigeron acris** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 863. și ed. 2. (1763). 1211. DC. Prodr. V. 290. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XVI. t. 26. fig. II. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 331. BOISS. fl. orient. III. 166. NYMAN, Consp. 389. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 301. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 278. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. II. 15. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 265. GRECESCU, Conspect. fl. României 292 și Suplement 82. *Erigeron acris* L. apud. KOCH, Syn. ed. 2. 388. LEDEB. fl. ross. II. 488. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 97. COSTE, Fl. Franc. II. 290. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld XIII. 58. t. 10. fig. 2. BRÂNDZĂ, Flora Dobrogei. 238. *Erigeron acer* L. apud. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XVI. pag. 10. FIEK, Fl. von Schlesien 212. HALLIER. Fl. von Deutschld. XXIX. 93. t. 2973. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 1171. ROUY, Fl. Franc. VIII. 152. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 700. HOFFMANN, Compositae în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. 5. Abteilung pag. 164.—Vulg. Bunghișor, Ochiu-boului, Steluțe.—Pe locuri cu iarbă în câmpuri și pe dealuri aride, pe lângă drumuri, prin livezi, rărișuri, poieni și pe marginea pădurilor în tufișuri, adesea. Călugăreni, Crucea-de-piatră, în pădurea «Crucea-de-piatră»; Mănăstirea Pasărea, pe marginea pădurii «Cer-

nica», spre șoseaua ce duce la Brănești și prin rărișurile din pădurea «Pa-sărea», frecvent; Mănăstirea Căldărușani, pe marginea pădurii «Brânzeasca» și prin poieni, abundant; Mănăstirea Țigănești, în pădurea «Ciolpani». ☺. și ♀. Iulie—August.

**Filago germanica** L. Sp. pl. ed. 2. (1763). 1311. STURM, Deutschlands Flora Heft 12. (1802). t. 14. DC. Prodr. VI. 247. KOCH, Syn. ed. 2. 397. LEDEB. fl. ross. II. 616. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 191. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 354. BOISS. fl. orient. III. 245. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXIX. 298. t. 3052. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 1173. ROUY, Fl. Franc VIII. 171. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. XIII. 137. t. 20. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 727. NYMAN, Consp. 384. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 276. HALÁCSY, Conspect. 34. HOFFMANN, Compositae în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. 5. Abteilung pag. 182. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 272 și Flora Dobrogei 221. GRECESCU, Conspect. fl. României 299 și Supplement 83. *Gnaphalium germanicum* WILLD. Spec. 3. p. 1894. *Gifola vulgaris* CASS., *Gifola germanica* RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XVI. 26. t. 54. fig. 1. și II.—Vulg. Cenușie, Firicică, Lânăriță, Mucedătoare, Mucedător, Mucezeă, Mucezeală, Mucezică.—Prin arături, pe coline aride și pietroase, pe marginea drumurilor, în pășuni uscate. Ciorogârla, pe lângă pădurea «Cotroceanca», aproape de cantonul pădurarului, abundant; Mănăstirea Țigănești, prin sămănăturile de pe marginea pădurii «Țigănești»; Mănăstirea Snagov, pe marginea drumului. ☺. Iulie—August.

**Filago arvensis** L. Sp. pl. ed. 2. (1763). 1312. DC. Prodr. VI. 248. KOCH, Syn. ed. 2. 398. LEDEB. fl. ross. II. 617. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 192. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 355. BOISS. fl. orient. III. 247. FIEK, Fl. von Schlesien 219. HALLIER, Fl. von Deutschld XXIX. 301. t. 3053. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 1174. COSTE, Fl. Franc. II. 325. ROUY, Fl. Franc. VIII. 175. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld XIII. 138. t. 21. NYMAN, Consp. 384. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 308. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 276. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. II. 36. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 272 și Flora Dobrogei 224. GRECESCU, Conspect. fl. României 299 și Supplement 83. *Filago arvensis* FRIES: apud GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 728. *Gnaphalium arvense* L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 856. WILLD. Spec. 3. pag. 1897. apud. STURM, Deutschlands Flora Heft 38. (1814). t. 10. *Oglifa arvensis* CASS. apud. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XVI. 27. t. 55. fig. II.—Vulg. Flocoșele.—Pe câmpuri, în locuri inculte, pe marginea drumurilor, în pășuni uscate, pe locuri aride și pietroase, pe coastele expuse soarelui, adesea. Comana, pe marginea drumului; Chitila, pe marginea șoselei; Cățelu, pe lângă linia fortului; Mănăstirea Cernica, pe câmpie; Mănăstirea Pasărea, pe marginea pădurii

«Pasărea» în câmp; Mănăstirea Căldărușani, pe marginea pădurii «Brânzeasca» și pe marginea drumului spre «Moara-Săracă». ☉. Iulie—August.

**Gnaphalium uliginosum** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 856 și ed. 2. (1763). 1200. DC. Prodr. VI. 230. KOCH, Syn. ed. 2. 400. LEDEB. fl. ross. II. 609. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 188. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XVI. 28. t. 57. fig. II. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 356. BOISS. fl. orient. III. 225. FIEK, Fl. von Schlesien 220. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXIX. 325. t. 3061. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 1176. COSTE, Fl. Franc. II. 321. ROUY, Fl. Franc. VIII. 184. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. XIII. 129. t. 26. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 730. NYMAN, Consp. 382. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 309. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 275. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. II. 33. HOFFMANN, Compositae în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. 5 Abteilung pag. 187. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 274 și Flora Dobrogei 224. GRECESCU, Conspect. fl. României 300 și Suplement 84.—Pe locuri năsipose umede sau inundate, pe lângă râuri, lacuri și mlaștini, pe prundișuri, adesea. București, Grozăvești-Cărămidari, în locurile umede de pe marginea Dâmboviței; Ciorogârla, pe locurile umede de pe marginea șoselei, pe la klm. 9; Oltenița, pe lângă pădurea de pe marginea Dunării, aproape de gura râului Argeș; Mănăstirea Țigănești, pe locurile umede de pe marginea pădurii «Ciolpani» și prin sămănăturile de pe marginea pădurii «Țigănești» în locuri umede, frecvent. ☉. Iunie—Septembrie.

**Inula Helenium** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 881 și ed. 2. (1763). 1236. DC. Prodr. V. 463. KOCH, Syn. ed. 2. 392. LEDEB. fl. ross. II. 500. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 335. BOISS. fl. orient. III. 186. FIEK, Fl. von Schlesien 214. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXIX. 121. t. 2983. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 1179. COSTE, Fl. Franc. II. 311. ROUY, Fl. Franc. VIII. 196. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. XIII. 110. t. 13. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 732. NYMAN, Consp. 391. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 303. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 280. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. II. 19. HOFFMANN, Compositae în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. 5 Abteilung pag. 203. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 267 și Flora Dobrogei 235. *Corvisartia Helenium* MÉRAT. apud. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 173. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XVI. 12. t. 30. GRECESCU, Conspect. fl. României 298. *Aster Helenium* SCOP. Fl. Carn. ed. 2. (1772). II. 171. *Aster officinalis* ALL. Fl. Pedemont. I. 194. *Helenium grandiflorum* GILIB.—Vulg. Iarbă-mare, Oman.—Prin fânețe umede, pe lângă păraie, în lunci și pe marginea pădurilor, adesea. Comana, pe marginea pădurii în locuri umede, frecventă. 4. Iulie—August.

**Inula Conyza** DC. Prodr. V. 464. KOCH, Syn. ed. 2. 394. LEDEB. fl. ross. II. 501. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 174. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XVI.

13. t. 32. fig. II. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 337. BOISS. fl. orient. III. 190. FIEK, Fl. von Schlesien 215. HALLIER, Fl. von Deutschld XXIX. 138. t. 2989. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 1183. COSTE, Fl. Franc. II. 314. ROUY, Fl. Franc. VIII. 198. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. XIII. 117. fig. 15 dela pag. 118. GARCKE. III. Fl. von Deutschld. 734. NYMAN, Consp. 393. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 281. HOFFMANN, Compositae în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. 5 Abteilung. pag. 203. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 269; Contribuţiuni nouă la Flora României (1889). pag. 16 și Flora Dobrogei 236. GRECESCU, Conspect. fl. României 298 și Supplement 83. *Inula vulgaris* LAMK. sub *Coniza* apud. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 305. HALÁCSY, Conspect. El. Graec. II. 20. *Conyza vulgaris* LAMK. Fl. franç. II. (1778). 73. *Conyza squarrosa* L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 861 și ed. 2. (1763). 1205.—Vulg. Moartea puricelui.—Prin locuri aride și pietroase, pe coastele expuse soarelui, în răișuri, poieni și pe marginea pădurilor, nu tocmai frecventă. Malul-Spart, în pădurea «Căscioareanca»; Călugăreni, Crucea-de-piatră, pe marginea pădurii «Uzun» și în pădurea «Crucea-de-piatră». ☉. Iulie—August.

*Inula Conyza* DC. este o plantă nouă pentru Flora regiunii Bucureștilor, căci n'a mai fost citată până acum de nimeni din această regiune.

*Inula germanica* L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 883 și ed. 2. (1763). 1239. DC. Prodr. V. 467. KOCH, Syn. ed. 2. 392. LEDEB. fl. ross. II. 505. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XVI. 16. t. 40. fig. II. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 336. BOISS. fl. orient. III. 189. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXIX. 125. t. 2984. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 1180. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. XIII. 116. t. 14 și fig. 14 dela pag. 117. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 732. NYMAN, Consp. 392. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 304. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 281. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. II. 19. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 267 și Flora Dobrogei 236. GRECESCU, Conspect. fl. României 296 și Supplement 83.—Vulg. Cioroi.—Prin fânețe uscate, pe câmpuri, pe dealuri prin vii, pe coastele expuse soarelui, în tufișuri pe marginea pădurilor. București la Filaret pe marginea drumului de fier; Călugăreni, Crucea-de-piatră, pe coaste la marginea pădurii «Uzun»; Comana, pe coaste la marginea pădurii în fânețe. 4. Iunie—August.

*Inula ensifolia* L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 883 și ed. 2. (1763). 1240. STURM, Deutschlands Flora Heft. 34. (1812). t. 15. DC. Prodr. V. 466. KOCH, Syn. ed. 2. 393. LEDEB. fl. ross. II. 504. RCHB. Icon. fl. germ. et. helv. XVI. 15. t. 37. fig. III. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 336. BOISS. fl. orient. III. 190. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXIX. 128. t. 2985. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 1181. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. XIII. 116. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 734. NYMAN, Consp. 392. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 304. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 281. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. II. 20.



BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 368 și Flora Dobrogei 235. GRECESCU, Conspect. fl. României 296 și Suplement 83. Prin livezi, pe locuri năsipose expuse soarelui, pe coastele dealurilor, prin fânețele de pe marginea pădurilor, în tufișuri, nu tocmai adesea. Comana, spre stația «Mihaiu-Bravul», pe coaste în locuri uscate, destul de frecventă. 4. Iulie—August.

**Inula hirta** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 883 și ed. 2. (1763). 1239. DC. Prodr. V. 466. KOCH, Syn. ed. 2. 393. LEDEB. fl. ross. II. 503. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 175. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XVI. 15. t. 36. fig. I și II. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 337. BOISS. fl. orient. III. 187. FIEK, Fl. von Schlesien 214. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXIX. 135. t. 2988. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 1183. COSTE, Fl. Franc. II. 312. ROUY, Fl. Franc. VIII. 203. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. XIII. 114. t. 15. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 733. NYMAN, Consp. 391. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 305. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 280. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. II. 20. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 269 și Flora Dobrogei 235. GRECESCU, Conspect. fl. României 297 și Suplement 83. *Aster hirtus* SCOP. Fl. Carn. ed. 2. (1772). II. 173. tab. 58.—Pe coline aride expuse soarelui, prin livezi, în tufișuri, rărișuri, poieni și pe marginea pădurilor, adesea. Comana, pe marginea pădurii; Mănăstirea Pasărea, în pădurea «Pasărea», frecventă; Mănăstirea Căldărușani, pe marginea pădurii «Brânzeasca», abundentă. 4. Maiu—Iulie.

**Inula cordata** BOISS. Diagnoses plantarum orient. nov. I. ser. 4. fasc. (1844). 3. BOISS. fl. orient. III. 188. PORCIUS, Diagnosele 117. NYMAN, Consp. 392. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 305. HALÁCSY, Consp. Fl. Graec. II. 19. *Inula salicina* L.  $\beta$ . *cordata* BOISS. apud BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 268. *Inula salicina* L.  $\beta$ . *aspera* BECK. Inulae Europae (1881). 22. *Inula aspera* POIR. apud GRECESCU, Conspect. fl. României 297.—Vulg. Cioroi.—Prin livezi, câmpuri, pe coline între vie, în rărișuri, poieni și pe marginea pădurilor, adesea. Călugăreni, Crucea-de-piatră, în pădurea «Crucea-de-piatră»; Comana, pe marginea pădurii și la «Padina-lui-Vasile»; Mănăstirea Pasărea, în pădurea «Pasărea» prin poieni și rărișuri, frecventă; Mănăstirea Căldărușani, pe marginea pădurii «Brânzeasca», frecventă. 4. Iunie—August.

**Inula Britannica** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 882 și ed. 2. (1763). 1237. DC. Prodr. V. 467. KOCH, Syn. ed. 2. 394. LEDEB. fl. ross. II. 505. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 177. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XVI. 14. t. 35. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 338. BOISS. fl. orient. III. 193. FIEK, Fl. von Schlesien 214. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXIX. 143. t. 2991. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 1184. COSTE, Fl. Franc. II. 312. ROUY, Fl. Franc. VIII. 200. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. XIII. 111. fig. 12 dela pag. 113. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 734. NYMAN, Consp. 392. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 305. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 282. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec.

II. 21. HOFFMANN, Compositae în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. 5. Abteilung 203. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 269 și Flora Dobrogei 236. GRECESCU, Conspect. fl. României 297 și Supplement 83.—Vulg. Sovârvariță.—Prin livezi și locuri umede în lunci, pe lângă păraie și mlaștini, pe marginea pădurilor, adesea. Domnești, Ciutați, pe marginea drumului spre dumbravă; Băcu, pe marginea păduri «Ileana» și pe lângă filtre la «Arcuda»; Ciorogârla, pe marginea pădurii «Cotroceanca» pe locuri umede, frecventă; Pâslari spre Pârliți, în «Valea-Crividon»; Călugăreni, Crucea-de-piatră, în lunca Călniștei, pe marginea pădurii «Uzun» și pe marginea pădurii «Crucea-de-piatră»; Budești, în pădurea de pe marginea râului Argeș, frecventă; Oltenița, în pădurea de pe marginea Dunării, aproape de gura Argeșului: Băneasa lângă București; Chitila, pe marginea pădurii în locuri umede; Mănăstirea Păsărea, la marginea pădurii «Cernica» spre șoseaua care duce la Brănești, abundentă, pe marginea pădurii «Pustnicu» și în pădurea «Pasărea»; Mănăstirea Căldărușani, în pădurea «Branzeasca», adesea; Mănăstirea Țigănești, pe marginea pădurii «Ciolpani» spre lacul «Bălteni» abundentă, pe drumul dintre pădurea «Ciolpani» și pădurea «Tâncăbești» și pe marginea pădurii «Țigănești», aproape de satul «Țigănești», frecventă. 4. Iunie—August.

**Pulicaria vulgaris** GAERTN. Fruct. II. 461. t. 173. apud. DC. Prodr. V. 478. KOCH, Syn. ed. 2. 395. LEDEB. fl. ross. II. 509. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 179. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XVI. 17. t. 42. fig. II. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 334. BOISS. fl. orient. III. 204. FIEK, Fl. von Schlesien 215. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXIX. 146. t. 2992. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 1186. COSTE, Fl. Franc. II. 316. ROUY, Fl. Franc. VIII. 208. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 735. NYMAN, Consp. 394. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 306. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 283. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. II. 26. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 270 și Flora Dobrogei 233. GRECESCU, Conspect. fl. României 295. *Pulicaria prostrata* ASCHERS. apud HOFFMANN, Compositae în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. 5. Abteilung pag. 205. *Inula Pulicaria* L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 882 și ed. 2. (1763). 1238. *Inula prostrata* GILIB. *Aster Pulicarius* SCOP. Fl. Carn. ed. 2. (1772). II. 172.—Vulg. Iarbă-purecelui, Puricariță, Puricică, Puricioasă, Rozovă.—Prin locuri inundate, pe locuri umede prin bălți, pe marginea râurilor și păraielor, pe prundișuri, comună. București, la Fundeni pe marginea Colentinei; Băneasa, lângă București; Mănăstirea Țigănești, pe marginea pădurii «Ciolpani» în locuri umede, frecventă; Ciorogârla, pe locurile umede de pe marginea șoselei, frecventă; Călugăreni, Crucea-de-piatră, pe marginea drumului și pe lângă Călniștea, adesea; Oltenița, pe marginea șoselei portului și pe lângă pădurea de pe marginea Dunării, aproape de gura râului Argeș, frecventă. ☉. Iulie—Septemvrie.

**Pulicaria dysenterica** GAERTN. Fruct. II. 461. apud. DC. Prodr. V. 479. KOCH, Syn. ed. 2. 395. LEDEB. fl. ross. II. 510. GREN. GODR. Fl. Franc II. 179. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XVI. 17. t. 42. fig. I. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 334. FIEK, Fl. von Schlesien 215. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXIX. 149. t. 2993. COSTE, Fl. Franc. II. 315. ROUY, Fl. Franc. VIII. 208. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld 735. NYMAN, Consp. 394. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 283. HOFFMANN, Compositae în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. 5. Abteilung pag. 205. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 270 și Flora Dobrogei 233. GRECESCU, Conspect. fl. României 296 și Suplement 82. *Pulicaria dysenterica* BERNH. apud. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 1186. *Pulicaria dysenterica* L. sub *Inula* apud. BOISS. fl. orient. III. 201. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 306. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. II. 26. *Inula dysenterica* L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 882 și ed. 2. (1763). 1237. *Aster dysentericus* SCOP. Fl. Carn. ed. 2. (1772). II. 171.—Vulg. Punga-babei, Tătăiș, Tătăișe.—Prin livezi umede, pe locuri umede și inundate, pe lângă bălți, mlaștini și râuri, în lunci pe prundișuri și pe locurile umede din păduri, adesea. București, la «Moara-lui-Ciurel» în lunca Dâmboviței; Băneasa lângă București, pe marginea Colentinei; Chitila, pe marginea pădurii în locuri umede; Băcu la Arcuda, pe lângă filtre; Măgurele, pe locurile umede de pe marginea Sabarului; Călugăreni, Crucea-de-piatră, pe marginea drumului în locuri umede și pe lângă pădurea «Crucea-de-piatră», frecventă în locuri umede; Comana, pe marginea drumului în locuri umede. 4. Iulie—August.

**Xanthium strumarium** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 987 și ed. 2. (1763). 1400. DC. Prodr. V. 523. KOCH, Syn. ed. 2. 531. LEDEB. fl. ross. II. 514. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 393. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 444. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XIX. 101. t. 215. fig. II. BOISS. fl. orient. III. 251. FIEK, Fl. von Schlesien 216. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXIX. 168. t. 2999. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 1188. COSTE, Fl. Franc. II. 480. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld XIII. 152. fig. 19 dela pag. 153. ROUY. Fl. Franc. X. 52. GARCKE, Ill. fl. von Deutschld. 705. NYMAN, Consp. 475. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 377. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 364. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. II. 246. HOFFMANN, Compositae în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. 5. Abteilung pag. 223. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 326. GRECESCU, Conspect. fl. României 377 și Suplement 107.—Vulg. Cănăriță, Cornuți, Purcelaș, Scăietete, Scăietetele-popii.—Pe locuri inculte, părașini, pe lângă garduri, pe marginea drumurilor, pe lângă sămănăturile de pe câmp, comun. Băcu la Arcuda, pe lângă filtre; Călugăreni, Crucea-de-piatră, pe marginea șoselei în lunca Călniștei, frecvent; Oltenița, pe lângă pădurea de pe marginea Dunării, aproape de gura Argeșului; Mănăstirea Pasărea, pe mar-

ginea pădurii «Pustnicu» în câmp; Mănăstirea Snagov, cătunul Fundu, pe marginea lacului Snagov, frecvent. ☉. Iulie—Octombrie.

**Xanthium spinosum** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 987 și ed. 2. (1763). 1400. DC. Prodr. V. 523. KOCH, Syn. ed. 2. 532. LEDEB. fl. ross. II 515. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 394. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 444. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. 101. t. 214. BOISS. fl. orient. III. 252. FIEK, Fl. von Schlesien 216. HALLIER, Fl. von Deutschld XXIX. 171. t. 3000. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 1188. COSTE, Fl. Franc. II. 480. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. XIII. 154. ROUY, Fl. Franc. X. 53. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 706. NYMAN, Consp. 475. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 377. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 364. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. II. 247. HOFFMANN, Compositae în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. 5. Abteilung, pag. 223. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 326. GRECESCU, Conspect. fl. României 377.—Vulg. Cătină, Coleră, Cornuță, Dracilă, Ghimpe, Holeră, Lipici, Scaiurusc. Scăietemuscălesc, Spin-muscălesc.—Prin locuri necultivate, prin sate, pe lângă drumuri, garduri, părăgini, comun. Chitila, pe marginea drumului; Călugăreni, Crucea-de-piatră, pe marginea șoselei; Gruiu, pe marginea șoselei București spre Oltenița. ☉. Iulie—Septembrie.

**Carpesium cernuum** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 859 și ed. 2. (1763). 1203. DC. Prodr. VI. 281. KOCH, Syn. ed. 2. 397. LEDEB. fl. ross. II. 618. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 197. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XVI. 24. t. 92. fig. III. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 340. BOISS. fl. orient. III. 214. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXIX. 297. t. 3051. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 1186. COSTE, Fl. Franc. II. 328. ROUY, Fl. Franc. VIII. 212. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. XIII. 121. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 732. NYMAN, Consp. 380. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 307. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 274. HOFFMANN, Compositae în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. 5. Abteilung pag. 206. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 272 și Flora Dobrogei 225. GRECESCU, Conspect. fl. României 302 și Suplement 84.—Vulg. Carectei, Dosnică-galbenă, Gulerași.—Prin păduri și dumbrave, în pădurile de pe coaste, adesea. Ciorogârla, în pădurea «Cotroceanca», frecvent; Mănăstirea Țigănești, în pădurea «Ciolpani», abundent. ☉, și ☉, Iulie—August.

**Bidens tripartita** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 831 și ed. 2. (1763). 1165. DC. Prodr. V. 594. KOCH, Syn. ed. 2. 396. LEDEB. fl. ross. II. 516. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 168. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XVI. 22. t. 50. fig. I. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 339. BOISS. fl. orient. III. 251. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 1191. NYMAN, Consp. 348. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 306. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. II. 39. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 271 și Flora Dobrogei 206. GRECESCU, Conspect. fl. României 302 și Suplement

84. *Bidens tripartitus* L. apud FIEK, Fl. von Schlesien 218. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXIX. 155. t. 2995. COSTE, Fl. Franc. II. 357. ROUY, Fl. Franc. VIII. 218. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. XIII. 161. t. 17. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 702. HOFFMANN, Compositae în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. 5 Abteilung pag. 244. — Vulg. Cârligior, Dentiță, Dentică, Dențică, Doi-dinți, Iarbă-roșie, Păduchi-de-Țigan. — Prin locuri umede mlăștinoase, pe lângă bălți, păraie, șanțuri și izvoare. Măgurele, pe locurile umede de pe marginea șoselei, frecvent; Budești, pe lângă pădurea de pe marginea râului Argeș; Oltenița, pe lângă pădurea de pe marginea Dunării, aproape de gura Argeșului; Chitila, pe locurile umede de pe marginea Colentinei; Băneasa lângă București, pe marginea Colentinei; Mănăstirea Țigănești, pe locurile umede de pe drumul dintre pădurea «Ciolpani» și pădurea «Tâncăbești», frecvent și pe locurile umede de pe marginea pădurii «Țigănești», aproape de satul Țigănești; Mănăstirea Snagov, cătunul Fundu, pe locurile umede de pe marginea lacului «Snagov». ☉. Iulie—Septembrie.

*Bidens cernua* L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 832 și ed. 2. (1763). 1165. KOCH, Syn. ed. 2. 396. GREIN. GODR. Fl. Franc. II. 169. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XVI. 22. t. 50. fig. II. BOISS. fl. orient. III. 250. BECK. Fl. von Nieder-Oesterreich 1191. NYMAN, Consp. 348. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 307. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 250. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. II. 39. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 271. *Bidens cernua* HUDS. apud NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 338. *Bidens cernua* WILLD. Sp. pl. apud DC. Prodr. V. 594. LEDEB. fl. ross. II. 517. GRECESCU, Conspect. fl. României 302. *Bidens cernuus* L. apud FIEK, Fl. von Schlesien 217. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXIX. 159. t. 2996. COSTE, Fl. Franc. II. 357. ROUY, Fl. Franc. VIII. 217. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. XIII. 160. t. 18. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 703. HOFFMANN, Compositae în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil 5 Abteilung pag. 244. — Vulg. Cârligioară, Iarbă-roșie. — Prin locuri umede mlăștinoase, prin bălți, păraie și izvoare, pe lângă râuri în terenuri inundate, adesea. Pășlari spre Pârliți, în «Valea-Crividon»; Călugăreni, Crucea-de-piatră, pe locurile mlăștinoase de pe marginea șoselei; Chitila, pe locurile umede de pe marginea Colentinei; Băneasa lângă București, pe marginea apei Colentina, frecvent; Brănești și Mănăstirea Păsărea, pe marginea lacului «Păsărea», abundant; Mănăstirea Snagov, cătunul Fundu, pe marginea lacului «Snagov», frecvent; Mănăstirea Țigănești, pe locurile mlăștinoase din «Valea-Schitului». ☉. Iulie — Septembrie.

*Galinsoga parviflora* CAVAN. Icon. pl. III. 41. t. 281. DC. Prodr. V. 677. KOCH, Syn. ed. 2. 396. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XVI. 23. t. 92. fig. I. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 340. FIEK, Fl. von Schlesien 219. HAL-

LIER, Fl. von Deutschld. XXIX. 152. t. 2994. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 1192. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. XIII. 145. t. 16. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 702. NYMAN, Consp. 385. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 307. HOFFMANN, Compositae în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil 5 Abteilung pag. 247. GRECESCU, Suplement la Conspect. fl. României 84.—Pe locuri umede. București la Cotroceni, pe marginea grădinii botanice, frecventă. ☉. Iulie—Septembrie.

Plantă de origine americană din Peru, astăzi foarte răspândită în Europa întreagă. BECK în Fl. von Nieder-Oesterreich spune că *Galinsoga parviflora* CAVAN. ar fi fost observată pentru prima oară la Berlin în anul 1812, ieșită și vulgarizată din culturile grădinii botanice. La noi a fost observată și citată această plantă pentru întâiaș dată de regretatul nostru botanist GRECESCU la Mănăstirea Susana în județul Prahova, adunată de domnul N. IACOBESCU.

**Anthemis tinctoria** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 896 și ed. 2. (1763). 1263. DC. Prodr. VI. 11. KOCH, Syn. ed. 2. 413. LEDEB. fl. ross. II. 524. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XVI. 63. t. 119. fig. I și III. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 344. BOISS. fl. orient. III. 280. FIEK Fl. von Schlesien 223. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXIX. 245. t. 3031. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 1193. ROUY, Fl. Franc. VIII. 229. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 706. NYMAN, Consp. 358. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 315. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 259. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. II. 52. HOFFMANN, Compositae în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. 5 Abteilung pag. 271. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 281 și Flora Dobrogei 242. GRECESCU, Conspect. fl. României 313 și Suplement 87. *Cota tinctoria* GAY. apud. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 156. COSTE, Fl. Franc. II. 346. *Chamaemelum tinctorium* ALL. Fl. Pedem. I. 187. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. XIII. 198. t. 41.—Vulg. Buba-în-cap, Bumbișor, Floare-de-perină, Iarbă-de-perină.—Pe câmpuri, pe marginea drumurilor, pe coaste, prin rărișuri, poieni și pe marginea pădurilor, adesea. Călugăreni, Crucea-de-piatră, pe marginea pădurii «Uzun», pe coaste; Comana, pe marginea pădurii; Chitila, pe marginea pădurii; Mogoșoia, în pădurea închisă; Mănăstirea Cernica, prin rărișurile și pe marginea pădurii «Cernica»; Mănăstirea Pasărea, în pădurea «Pustnicu» și în pădurea «Pasărea», abundent; Mănăstirea Căldărușani, pe marginea pădurii «Brânzeasca», frecvent; Mănăstirea Țigănești, pe marginea pădurii «Ciolpani» și pe lângă podul peste Ialomița, aproape de satul Țigănești. ♀. Iulie—August.

**Anthemis austriaca** JACQ. Fl. austr. V. (1778). 22. t. 444. DC. Prodr. VI. 11. KOCH, Syn. ed. 2. 413. LEDEB. fl. ross. II. 525. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XVI. 62. t. 118. fig. I. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 344. BOISS.

fl. orient. III. 284. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXIX. 248. t. 3032. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 1193. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 706. NYMAN, Consp. 359. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 260. HOFFMANN, Compositae în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. 5. Abteilung pag. 271. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 282. GRECESCU, Conspect. fl. României 313. *Cota austriaca* SCHULTZ. BIP., *Chamaemelum austriacum* ALL. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. XIII. 196. t. 42.—Printre sămănăturile de pe câmp, pe locuri nășipoase, fânețe uscate, pe coastele colinelor aride, pe marginea drumurilor, adesea. Ciorogârla, pe marginea sămănăturilor și în câmp pe lângă pădurea «Cotrocaneanca»; Țigănia, prin sămănăturile de pe marginea Sabarului; Chitila, pe marginea pădurii în câmp; Mănăstirea Cernica, pe coaste în localitatea «La Anini»; Mănăstirea Pasărea, pe marginea pădurii «Pasărea» prin sămănături, frecvent. ☉. Iunie—August.

**Anthemis ruthenica** M. BIEB. Fl. Taurico-Cauc. II. (1808). 330. DC. Prodr. VI. 11. KOCH, Syn. ed. 2. 414. LEDEB. fl. ross. II. 522. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XVI. 61. t. 114. fig. I. BOISS. fl. orient. III. 304. FIEK, Fl. von Schlesien 224. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXIX. 253. t. 3034. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 1194. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 707. NYMAN, Consp. 361. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 315. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 262. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. II. 60. HOFFMANN, Compositae în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. 5. Abteilung pag. 271. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 282 și Flora Dobrogei 242. GRECESCU, Conspect. fl. României 314 și Suplement 87. *Anthemis Neilreichii* ORTM. în Verhandl. der Zoolog. bot. Gesel. (1852). II. 55. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 344. *Chamaemelum ruthenicum* ALL. apud KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. XIII. 194.—Pe locuri aride, pe lângă drumuri, pe câmp în locuri cultivate și inculte, pe mici coaste, adesea. Țigănia, în câmp pe marginea Sabarului. ☉. Maiu—August.

**Anthemis arvensis** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 894 și ed. 2. (1763). 1261. STURM, Deutschlands Flora Heft 27. (1809). t. 16. DC. Prodr. VI. 6. KOCH, Syn. ed. 2. 414. LEDEB. fl. ross. II. 521. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 152. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XVI. 60. t. 113. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 345. BOISS. fl. orient. III. 301. FIEK, Fl. von Schlesien 224. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXIX. 250. t. 3033. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 1194. COSTE, Fl. Franc. II. 345. ROUY, Fl. Franc. VIII. 234. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 706. NYMAN, Consp. 361. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 314. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 261. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. II. 59. HOFFMANN, Compositae în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. 5. Abteilung pag. 271. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 282. GRECESCU, Conspect. fl. României 314 și Suplement 88. *Chamaemelum arvense* ALL. Fl. Pedem. I.

186. **KRAUSE** în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld XIII. 193. t. 43. — Vulg. Romoniță-de-câmp, Romoniță-proastă. — Pe locuri năsiptoase, pe câmpuri prin sămănături, în livezi, pe marginea drumurilor și prin fânețe sterile. Măgurele, pe locurile năsiptoase de pe marginea Sabarului. ☉. Maiu — Septembrie.

**Anthemis Cotula** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 894 și ed. 2. (1763). 1261. KOCH, Syn. ed. 2. 414. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 153. RCHB. Icon fl. germ. et helv. XVI. 57. t. 109 fig. I. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 345. BOISS. fl. orient III. 315. FIEK, Fl. von Schlesien 224. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXIX. 254. t. 3035. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 1194. COSTE, Fl. Franc. II. 345. ROUY, Fl. Franc. VIII. 237. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 707. NYMAN, Consp. 362. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 314. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 262. HALÁCSY. Conspect. Fl. Graec. II. 64. HOFFMANN, Compositae în ENGLER Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. 5 Abteilung pag. 272. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 283. GRECESCU, Conspect. fl. României 314 și Suplement 88. *Marula Cotula* DC. Prodr. VI. 13. LEDEB. fl. ross. II. 526. *Marula foetida* CASS. Dict. sc. nat. XXIX. (1823). 174. *Marula vulgaris* BLUF. et FINGH. *Chamaemelum Cotula* ALL. Fl. Pedem. I. 186. **KRAUSE** în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. XIII. 194. — Vulg. Fulică, Mărariul-cânelui, Momoriță, Moșețel-prost, Roman, Romoniță-puturoasă. — Pe locuri cultivate și inculte, pe câmpuri prin sămănături, pe lângă locuințe, dărâmături, pe lângă garduri și pe marginea drumurilor, adesea. Mănăstirea Țigănești, pe marginea pădurii «Ciolpani» spre lacul «Bălteni». ☉. Iunie — Octombrie.

**Achillea Millefolium** L. Sp. pl. ed. 1. (1753) 899. și ed. 2. (1763). 1267. STURM, Deutschlands Flora Heft 10. (1801). t. 16. DC. Prodr. VI. 24. KOCH, Syn. ed. 2. 410. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XVI. 69. t. 135. BOISS. fl. orient. III. 342. FIEK, Fl. von Schlesien 223. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXIX. 234. t. 3027. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 1200. COSTE, Fl. Franc. II. 354. ROUY, Fl. Franc. VIII. 246. **KRAUSE** în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. XIII. 216. t. 39. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 709. NYMAN, Consp. 366. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 318. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 262. HOFFMANN, Compositae în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. 5 Abteilung pag. 272. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 279 și Flora Dobrogei 239. GRECESCU, Conspect. fl. României 309 și Suplement 87. — Vulg. Alunele, Coada-șorecelului, Coada-șoafrecelui, Sorocină. — Prin locuri inculte și cultivate, prin livezi, rărișuri, poieni și pe marginea pădurilor, pe locuri cu iarbă pe lângă garduri și pe marginea drumurilor, adesea. Oltenița, pe lângă pădurea de pe marginea Dunării, aproape de gura Argeșului; Mănăstirea Snagov, cătunul Fundu, pe insulă lângă biserică. 4. Iunie — Septembrie. Variază.



β. *collina* BECKER. apud. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 318. GRECESCU, Conspect. fl. României 309 și Suplement 87. *Achillea collina* BECKER apud BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 1200.—București, la «Moara-lui-Ciurel» în lunca Dâmboviței; Ciorogârla, pe marginea pădurii «Cotroceanca»; Călugăreni, Crucea-de-piatră, pe marginea pădurii «Crucea-de-piatră»; Mănăstirea Pasărea, pe marginea pădurii «Pustnicu»; Mănăstirea Țigănești pe marginea pădurii «Ciolpani».

*Achillea pannonica* SCHEELE în Linnaea XVIII. (1844). 471. HEIMERL în A. KERNER, Schedae. fasc. III. 117. No. 992. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 319. GRECESCU, Conspect. fl. României 309 și Suplement 86. *Achillea collina* BECKER. β. *pannonica* SCHEELE apud. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 1200. PORCIUS, Diagnozele 122. *Achillea Millefolium* L. γ. *lanata* KOCH, Syn. ed. 2. 410. FIEK, Fl. von Schlesien 223. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 709. *Achillea Millefolium* L. var. e. *villosa* SCHUR. Enum. pl. Transs. 328.—Pe locuri incolte, pe câmpuri, pe coastele expuse soarelui, în livezi, tufișuri și pe marginea pădurii, adesea. Călugăreni, Crucea-de-piatră, pe coasta la marginea pădurii «Uzun» și în fânețele dela câmp; Chitila, pe marginea drumului; Mănăstirea Pasărea, pe marginea pădurii «Pasărea»; Mănăstirea Căldărușani, în livadia «Pârîta» și pe marginea pădurii «Brânzeasca», frecventă. Ț. Iunie—Septemvrie.

*Achillea asplenifolia* VENTEN. Descr. pl. nouv. du jardin Cels. 95. t. 95. (1800). apud BORBAS în A. KERNER, Schedae fasc. III. pag. 116. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 1198. GRECESCU, Conspect fl. României 309. *Achillea Millefolium* β. *rubra* SADL. Fl. Pest. II. (1826). 286. *Achillea Millefolium* β. *crustata* ROCHER. Pl. rar. Banat. (1828). 71. fig. 65. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 342. *Achillea rosea* DESF. Hort. Paris. ed. 3. (1829). 181. *Achillea tenuis* SCHUR. Enum. pl. Transs. 329. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 318. PORCIUS, Diagnozele 122.—Prin livezi umede, pe lângă lacuri și pâraie în regiunea câmpiilor, frecventă și prin fânețele de pe marginea pădurilor. București, la «Moara-lui-Ciurel» în lunca Dâmboviței; Băcu, pe marginea pădurii «Ileana»; Pâslari spre Pârliți, printre vii; Comana, pe marginea pădurii pe coaste; Mănăstirea Cernica, pe marginea pădurii «Cernica»; Mănăstirea Pasărea, pe lângă lacul «Pasărea» și pe marginea pădurii «Pasărea»; Mănăstirea Țigănești, pe drumul dintre pădurea «Ciolpani» și pădurea «Tâncăbești»; Mănăstirea Snagov, cătunul Fundu, pe insulă la marginea lacului «Snagov». Ț. Iunie—Septemvrie.

*Achillea asplenifolia* VENT. este o plantă nouă pentru Flora regiunii Bucureștilor, căci n'a mai fost menționată până acum de nimenea din această regiune.

*Achillea setacea* W. et KIT. Descr. et icon. pl. rar. Hung. I. (1802). 82. t. 80.

DC. Prodr. VI. 25. RCHB, Icon. fl. germ. et helv. XVI. 70. t. 137. fig. I. BOISS. fl. orient. III. 256. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 1199. NYMAN, Consp. 367. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 319. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 262. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. II. 47. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 280 și Flora Dobrogei 239. GRECESCU, Conspect. fl. României 309 și Suplement 87. *Achillea Millefolium* L. var. *setacea* KOCH, Syn. ed. 2. 411. LEDEB. fl. ross. II. 532. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 162. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 342. FIEK. Fl. von Schlesien 223. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXIX. 237. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 709. PORCIUS, Diagnozele 122. *Achillea setacea* w. et KIT. ca forma II. dela *Achillea Millefolium* L. apud. ROUY, Fl. Franc. VIII. 249. —Pe locuri sterile expuse soarelui, pe coaste în câmpuri pe marginea drumurilor, lângă păduri, adesea. București, la Filaret în câmp, pe marginea drumului de fier; Domnești, Ciutați, în dumbravă; Ciorogârla, pe marginea pădurii «Cotroceanca»; Călugăreni, Crucea-de-piatră, pe marginea pădurii «Crucea-de-piatră» și pe marginea pădurii «Uzun»; Gruiu, pe marginea șoselei București-Oltenița; Chitila, pe marginea pădurii; Mănăstirea Cernica, pe marginea drumului și pe marginea pădurii «Cernica»; Mănăstirea Pasărea, pe marginea pădurii «Pasărea»; Ștefănești spre Dascălu, pe marginea șoselei; Mănăstirea Căldărușani, pe marginea pădurii în livadia «Pârîta». 4. Iunie—August.

***Achillea Neilreichii*** A. KERN. în Oester. Botan. Zeitschrift. XXI. (1871). 141. HEIMERL în A. KERN. Schedae fasc. III. 122. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 320. PORCIUS, Diagnozele 124. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 281 și Flora Dobrogei 239. GRECESCU, Conspect. fl. României 311 și Suplement 87. *Achillea nobilis* L. subspec. *Neilreichii* KERNER apud. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 263. *Achillea nobilis* L.  $\beta$ . *Neilreichii* KERN. apud BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 1198. HALÁCSY, Conspect. fl. Graec. II. 46.—Pe câmpuri incolte și nășipoase, pe coastele colinelor aride expuse soarelui, prin fânețele și tufișurile de pe marginea pădurilor, frecventă. București la Filaret, pe marginea drumului de fier; Domnești, Ciutați în dumbravă; Ciorogârla, pe marginea pădurii «Cotroceanca»; Malul-Spart, pe marginea pădurii «Căscioceanca»; Gogoșari spre Varlam, prin tufișurile de pe marginea sămănăturilor; Pâslari spre Pârliți, printre vii; Călugăreni, Crucea-de-piatră, pe marginea pădurii «Uzun», pe coaste și pe marginea pădurii «Crucea-de-piatră»; Comana, pe coaste; Chitila, pe marginea pădurii; Mănăstirea Cernica, pe marginea drumului, pe câmp; Mănăstirea Pasărea, pe marginea pădurii «Pasărea», frecventă. 4. Iunie—August.

***Achillea crithmifolia*** w. et KIT. Descr. et icon. pl. rar. Hung. I. (1802) 68. t. 66. DC. Prodr. VI. 25. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XVI. 69. t. 134. fig. I. HEUFF. Enum. pl. Banat-Temes. 98. No. 924. NEILR. Diagnosen 67. BOISS. fl. orient. III. 257. SCHUR, Enum. pl. Transs. 330. BECK, Fl. von Nieder-

Oesterreich 1198. PORCIUS, Diagnozele 123. NYMAN, Consp. 367. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 320. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 263. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. II. 47. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 280 și Flora Dobrogei 241. GRECESCU, Conspect. fl. României 310.—Pe coastele expuse soarelui, pe colinele din regiunea inferioară în locuri pietroase uscate și pe marginea pădurilor, adesea. București, la «Moara-lui-Ciurel» pe coastele de pe malurile Dâmboviței; Chitila, pe marginea pădurii, frecventă; Mănăstirea Cernica, pe marginea pădurii «Cernica»; Mănăstirea Pasărea, pe marginea pădurii «Pustnicu» și pe marginea pădurii «Pasărea», abundentă. 4. Iunie—Iulie.

*Achillea crithmifolia* w. et KIT. este o plantă nouă pentru Flora regiunii Bucureștilor, căci nu numai că n'a mai fost menționată până acum de nimeni din această regiune, dar încă regretatul nostru botanist GRECESCU afirmă în l. c., că această interesantă specie a fost observată la noi până acum numai în Oltenia. Prin urmare constatarea acestei plante la București și prin împrejurimi merită o deosebită atențiune.

**Matricaria Chamomilla** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 891. și ed. 2. (1763). 1256. DC. Prodr. VI. 51. KOCH, Syn. ed. 2. 416. LEDEB. fl. ross. II. 545. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 148. RCHB. Icon. fl. germ. et. helv. XVI. 47. t. 106. fig. I. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 347. BOISS. fl. orient. III. 323. FIEK, Fl. von Schlesien 324. HALLIER, Fl. von Deutschld XXIX. 292. t. 3049. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 1201. COSTE, Fl. Franc. II. 343. ROUY, Fl. Franc. VIII. 255. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 710. NYMAN, Consp. 374. SIMONKAI Enum. Fl. Transs. 314. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 271. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. II. 66. HOFFMANN, Compositae în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. 5 Abteilung pag. 277. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 283 și Flora Dobrogei 231. GRECESCU, Conspect. fl. României 315. *Chamomilla vulgaris* GRAY., *Chamomilla officinalis* KOCH. în Linnaea XVII. 45. *Matricaria suaveolens* L. Suec. 297. *Chamaemelum Chamomilla* KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. XIII. 200. t. 45., *Leucanthemum Chamaemelum* LAMK. — Vulg. Mătricea, Morună, Moșițel, Mușățâl, Mușeșel, Romaniță, Romaniță-bună, Romoniță. — Pe locuri cultivate și inculte, pe câmpuri, pe lângă păduri și pe marginea drumurilor, comună. București, pe marginea drumului între Dâmbovița și fabrica de tutun a Regiei; Ciorogârla, pe câmp la marginea sămănăturilor, frecventă; Malul-Spart, prin sămănăturile de lângă podul râului Argeș, abundentă; Mănăstirea Pasărea, prin arăturile din poienile pădurii «Pustnicu», frecventă. ☉. Maiu—August.

**Matricaria inodora** L. Fl. Suec. ed. 2. (1755). 297. DC. Prodr. VI. 52. LEDEB. fl. ross. II. 545. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 149. FIEK, Fl. von Schlesien 224. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 1201. COSTE, Fl. Franc. II. 343. ROUY, Fl. Franc. VIII. 256. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 710. NY-

MAN, Consp. 374. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 314. HOFFMANN, Compositae în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. 5 Abteilung pag. 277. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 284 și Flora Dobrogei 231. GRECESCU, Conspect. fl. României 315. *Chrysanthemum inodorum* L. Sp. pl. ed. 2. (1763). 1253. KOCH, Syn. ed. 2. 419. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXIX. 285. t. 3047. *Pyrethrum inodorum* MOENCH. *Chamaemelum inodorum* VIS. Fl. dalm. II. 85. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XVI. 47. t. 94. fig. I. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 546. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 271. *Chamaemelum inodorum* L. sub *Chrysanthemo* apud BOISS. fl. orient, III. 327. *Tripleurospermum inodorum* SCHULTZ. BIP., *Chamomilla inodora* K. KOCH. — Vulg. Moșițel-prost, Roman, Romaniță-neadevărată, Romaniță-nemirositoare. — Prin sămănături, pe locuri necultivate, prin dărâmături, pe marginea drumurilor, adesea. București, la «Moara-lui-Ciurel», pe marginea Dâmboviței; Roșu lângă București, pe marginea pădurii tăiate; Băcu, pe marginea pădurii «Ileana»; Ciorogârla, pe marginea pădurii «Cotroceanca», frecventă; Comana, pe marginea pădurii; Budești, pe lângă pădurea de pe marginea râului Argeș; Oltenița, pe marginea șoselei și pe lângă pădurea de pe marginea Dunării, aproape de gura Argeșului, abundentă; Chitila, pe marginea pădurii; Mănăstirea Cernica, pe marginea pădurii «Cernica»; Mănăstirea Pasărea, pe marginea șoselei spre Brănești, lângă pădurea «Cernica»; Mănăstirea Căldărușani, pe marginea pădurii «Brânzeasca»; Mănăstirea Țigănești, pe drumul dintre pădurea «Ciolpani» și pădurea «Tâncăbești», frecventă. ☉. Maiu — Septemvrie.

**Chrysanthemum Leucanthemum** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 888 și ed. 2. (1763). 1251. STURM, Deutschlands Flora Heft 2. (1798). t. 11. KOCH, Syn. ed. 2. 416. FIEK, Fl. von Schlesien 226. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXIX. 266. t. 3040. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 1203. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 713. HOFFMANN, Compositae în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV Teil. 5 Abteilung pag. 278. *Leucanthemum vulgare* LAMK. Fl. franç. II. (1778). 137. DC. Prodr. VI. 46. LEDEB. fl. ross. II. 542. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 140. BOISS. fl. orient. III. 325. COSTE, Fl. Franc. II. 341. ROUY, Fl. Franc. VIII. 271. NYMAN, Consp. 371. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 269. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. II. 67. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 284 și Flora Dobrogei 231. GRECESCU, Conspect. fl. României 315 și Suplement 88. *Tanacetum Leucanthemum* SCHULTZ. BIP. Tanacet. (1844). 35. apud RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XVI. 49. t. 97. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 347. *Tanacetum Leucanthemum* L. sub *Chrysanthemo* apud SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 313. *Chamaemelum leucanthemum* KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld XIII. 210. t. 50. — Vulg. Aurată, Mărgărită, Ochiu-boului, Roman, Romoniță-mare, Tătăișe, Tătăiși, Tufănică. — Prin livezi, în rărișuri, poieni și pe marginea pădurilor prin fânețe, adesea. Cio-

rogărta, în pădurea «Cotrocea», abundant; Călugăreni, prin fânețele din câmp, frecvent; Comana, în pădure; Mănăstirea Cernica, pe marginea pădurii «Cernica»; Mănăstirea Pasărea, în pădurea «Pustnicu» și în pădurea «Pasărea», abundant; Mănăstirea Țigănești, în pădurea «Ciolpani», frecvent.

4. Maiu — August.

**Chrysanthemum corymbosum** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 890. KOCH, Syn. ed. 2. 418. FIEK, Fl. von Schlesien 225. HALLIER, Fl. von Deutschld XXIX. 281. t. 3045. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 1204. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 711. HOFFMANN, Compositae în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV Teil. 5 Abteilung pag. 278. *Pyrethrum corymbosum* WILLD. Spec. pl. III. (1800). 2155. DC. Prodr. VI. 57. LEDEB. fl. ross. II. 551. NYMAN, Consp. 372. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 269. BRÂNDZĂ Prodr. fl. române 285 și Flora Dobrogei 230. GRECESCU, Conspect. fl. României 317 și Suplement 88. *Pyrethrum corymbosum* L. sub *Chrysanthemo* apud BOISS. fl. orient. III. 342. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. II. 69. *Tanacetum corymbosum* SCHULTZ BIP. Tanacet. 57. RCHB. Icon fl. germ. et helv. XVI. 53. t. 102. fig. 1. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 349. *Tanacetum corymbosum* L. sub *Chrysanthemo* apud SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 312. *Chrysanthemum corymbiferum* L. Sp. pl. ed. 2. (1763). 1151. *Pyrethrum corymbiferum* SCHRANK. apud ROUY, Fl. Franc. VIII. 262. *Leucanthemum corymbosum* GREN. GODR. Fl. Franc. II. 145. COSTE, Fl. Franc. II. 342. *Chamaemelum corymbosum* KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld XIII. 206. t. 48.—Prin păduri în rărișuri și poieni, prin fânețele de pe marginea pădurilor, adesea. Călugăreni, Crucea-de-piatră, în pădurea «Uzun», frecvent; Comana, prin pădure «La Fântâna-cu-nucu», abundant; Chitila, pe marginea pădurii; Mogoșoaia, în pădurea închisă; Mănăstirea Cernica, în pădurea «Cernica», frecvent; Mănăstirea Pasărea, în pădurea «Pustnicu» și în pădurea «Pasărea», abundant; Mănăstirea Căldărușani, în pădure spre livadia «Pârîta» și pe marginea pădurii «Brânzeasca», frecvent. 4. Iunie—Iulie.

**Chrysanthemum vulgare** BERNH. Verz. Pflanz. Erfurt (1800). 144. apud BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 1204. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 711. HOFFMANN, Compositae în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. 5. Abteilung pag. 278. *Tanacetum vulgare* L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 844 și ed. 2. (1763). 1184. DC. Prodr. VI. 128. KOCH, Syn. ed. 2. 407. LEDEB. fl. ross. II. 601. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 137. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XVI. 54 t. 105. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 349. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXIX. 206. t. 3014. COSTE, Fl. Franc. II. 328. ROUY, Fl. Franc. VIII. 260. NYMAN, Consp. 375. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 312. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 269. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. II. 69. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 278 și Flora Dobrogei 229. GRECESCU, Conspect. fl. României 306.

*Chrysanthemum Tanacetum* KARSCH. apud. FIEK, Fl. von Schlesien 225. *Pyrethrum vulgare* L. sub *Tanaceto* apud. BOISS. fl. orient. III. 352. *Chamaemelum Tanacetum* KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. XIII. 208. t. 47. — Vulg. Buruiană-de-ceas-rău, Fereceă, Iarba-raiului, Măruncă-neagră, Vetrice, Vetricea, Vitriță. — Pe lângă drumuri și garduri, pe câmpuri și prin locuri inculte, pe lângă păduri, pe marginea râurilor în lunci, prin livezi, în locuri umede, frecvent. București, la «Moara-lui-Ciurel» pe marginea Dâmboviței și la Filaret pe marginea drumului de fier; Ciorogârla, pe marginea pădurii «Cotroceanca», frecvent; Budești, pe lângă pădurea de pe marginea râului Argeș, abundant; Mănăstirea Cernica, pe lângă linia forturilor, frecvent; Mănăstirea Pasărea, pe marginea pădurii «Pustnicu»; Mănăstirea Căldărușani, pe marginea pădurii «Brânzeasca»; Mănăstirea Țigănești, pe marginea pădurii «Ciolpani» și pe marginea pădurii «Țigănești», aproape de satul «Țigănești», frecvent. 4. Iulie—Octomvrie.

*Artemisia scoparia* w. et KIT Descr. et icon. pl. rar. Hung. I. (1802). 66. t. 65. DC. Prodr. VI. 99. KOCH, Syn. ed. 2. 405. LEDEB. fl. ross. II. 569. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XVI. 75. t. 146. fig. I. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 352. BOISS. fl. orient. III. 364. FIEK, Fl. von Schlesien 222. HALLIER, Fl. von Detschld. XXIX. 196. t. 3010. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 1208. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. XIII. 186. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 715. NYMAN, Consp. 377. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 311. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 272. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. II. 74. HOFFMANN, Compositae în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. 5 Abteilung pag. 282. BRÂNDZĂ, Prodr. Fl. române 277 și Flora Dobrogei 227. GRECESCU, Conspect. Fl. României 306 și Supplement 86. — Vulg. Pelin-de-mături, Pelin-de-pureci. — Pe locuri năsiptoase, pe câmpuri prin locuri necultivate în pietrișuri, adesea. Măgurele, pe locurile năsiptoase de pe marginea Sabarului; Budești, pe lângă pădurea de pe marginea râului Argeș. ☉. sau ☉. August—Septemvrie.

*Artemisia Santonicum* L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 845. cnf. FRITCSH în A. KERNER, Schedae. VI. pag. 93. No. 2264. GRECESCU, Conspect. fl. României 306 și Supplement 86. *Artemisia salina* WILLD. Spec. pl. III. (1804). 1834. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 311. PORCIUS, Diagnozele 120. *Artemisia maritima* L.  $\gamma$ . *salina* WILLD. apud BRÂNDZĂ, Flora Dobrogei 228. KOCH, Syn. ed. 2. 406. *Artemisia maritima* L.  $\beta$ . *patens* NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 353. *Artemisia maritima* L.  $\beta$ . *typica* BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 1206. *Artemisia pendula* SCHUR. Enum. pl. Transs. 323. — Prin locurile umede sărate numite sărături. Comana, spre Grădiște, prin sărături, frecventă. 4. August—Septemvrie.

**Artemisia annua** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 847 și ed. 2. (1763). 1187. DC. Prodr. VI. 119. LEDEB. fl. ross. II. 592. BOISS. fl. orient III. 371. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. XIII. 183. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 716. NYMAN, Consp. 378. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 310. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 274. HOFFMANN, Compositae în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil 5 Abteilung pag. 282. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 277 ; ContribuȚiuni nouă la Flora României (1889) pag. 15 și Flora Dobrogei 228. GRECESCU, Conspect. fl. României 305. — Vulg. Buruiiană-de-țară, Năfurică, Peli-niță. — Pe lângă garduri și locuințe, prin locuri inculte, dărâmături, pe marginea drumurilor, prin livezi și poieni, adesea. Comana spre Grădiște, pe marginea drumului, frecventă. ☉. Iulie—Septemvrie.

**Artemisia vulgaris** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 848 și ed. 2. (1763). 1188. DC. Prodr. VI. 112. KOCH, Syn. ed. 2. 406. LEDEB. fl. ross. II. 585. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 129. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XVI. 74 t. 147. fig. 1. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 352. BOISS. fl. orient. III. 371. FIEK, Fl. von Schlesien 222. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXIX 198. t. 3011. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 1206. COSTE, Fl. Franc. II. 332. ROUY, Fl. Franc. VIII. 290. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. XIII. 181. t. 35. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 715. NYMAN, Consp. 378. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 311. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 273. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. II. 73. HOFFMANN, Compositae în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. 5 Abteilung pag. 282. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 277 și Flora Dobrogei 228. GRECESCU, Conspect fl. României 277 și Supplement 85. — Vulg. Pelin-negru, Pelinariță. — Pe locuri inculte, dărâmături, pe câmpuri, lângă drumuri și pe marginea pădurilor, adesea. Călugăreni, Crucea-de-piatră, în pădurea «Crucea-de-piatră», pe lângă «Șipot», frecventă; Budești, lângă pădurea de pe marginea râului Argeș; Mănăstirea Pasărea, pe marginea pădurii «Pustnicu»; Mănăstirea Căldărușani, pe marginea pădurii «Moara-Săracă»; Mănăstirea Țigănești, pe marginea pădurii «Ciolpanii». 4. Iulie—Septemvrie.

**Artemisia pontica** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 847 și ed. 2. (1763). 1187. DC. Prodr. VI. 109. KOCH, Syn. ed. 2. 404. LEDEB. fl. ross. II. 580. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XVI. 73 t. 150 fig. III. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 351. BOISS. fl. orient III. 369. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXIX. 187 t. 3007. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 1207. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. XIII. 181. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 715. NYMAN, Consp. 378. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 310. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 273. HOFFMANN, Compositae în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. 5 Abteilung pag. 282. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 276 și Flora Dobrogei 227. GRECESCU, Conspect fl. României 304 și Supplement 85. — Vulg. Pelin, Pelin-mic, Peli-niță. — Prin fânețe și pășuni uscate, pe dealuri aride și câmpii sterile, pe

locuri năsipose și pietroase, în tufișuri și pe marginea pădurilor, adesea. Comana spre Grădiște, pe locuri sărate, frecventă. 4. Iulie — Septemvrie.

**Artemisia austriaca** JACQ. Fl. austr. I. (1773). 61. t. 100. DC. Prodr. VI. 112. KOCH, Syn. ed. 2. 404. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XVI. 74. t. 143. fig. II. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 351. LEDEB. fl. ross. II. 583. BOISS. fl. orient. III. 369. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXIX. 190. t. 3008. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 1207. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. XIII. 182. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 715. NYMAN, Consp. 378. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 310. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 273. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 276 și Flora Dobrogei 227. GRECESCU, Conspect fl. României 304 și Suplement 85. *Artemisia orientalis* WILLD., *Artemisia repens* PALL. — Vulg. Pelin. — Pe câmpuri, pe dealuri în locuri năsipose sau pietroase și uscate, pe lângă păduri și pe marginea drumurilor, frecventă. București, la «Moara lui Ciurel», pe marginea drumului; Chitila, pe marginea drumului, abundentă; Mănăstirea Cernița, pe marginea pădurii; Mănăstirea Pasărea, pe marginea pădurii «Pasărea», frecventă; Tâncăbești, pe marginea șoselei spre Țigănești, frecventă. 4. Iulie — Septemvrie.

**Arthemisia Absinthium** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 848 și ed. 2. (1763). 1188. DC. Prodr. VI. 125. KOCH, Syn. ed. 2. 401. LEDEB. Fl. ross. II. 598. GREC. GODR. Fl. Franc. II. 126. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XVI. 70 t. 138 fig. I. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 350. BOISS. fl. orient. III. 373. FIEK, Fl. von Schlesien 222. HALLIER. Fl. von Deutschld. XXIX. 173. t. 3001. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 1205. COSTE. Fl. Franc. II. 330. ROUY, Fl. Franc. VIII. 279. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. XIII. 180 t. 31. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 711. NYMAN, Consp. 376. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 310. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 274. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. II. 72. HOFFMANN, Compositae în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. 5 Abteilung pag. 282. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 275 și Flora Dobrogei 226. GRECESCU, Conspect. fl. României 303. *Absinthium vulgare* GAERTN., *Absinthium officinale* BROT. — Vulg. Pelin, Pelin-alb, Pelin-bun, Pelin-adevărat. — Prin locuri necultivate și aride, pe dealuri, câmpuri, livezi, pe marginea drumurilor, pe lângă locuințe, garduri, prin vii, pe marginea pădurilor și pe malul râurilor, comun. Ciorogârla, pe marginea pădurii «Cotroceanca»; Malul-Spart, la marginea pădurii «Căsioreanca»; Călugăreni, Crucea-de-piatră, pe marginea pădurii «Uzun»; Gruiu, pe marginea șoselei București — Oltenița, abundent; Oltenița, lângă pădurea de pe marginea Dunării, aproape de gura Argeșului; Chitila, pe marginea pădurii, frecvent; Mănăstirea Căldărușani, pe marginea pădurii «Brânzeasca»; Mănăstirea Țigănești, pe marginea pădurii «Ciolpani», spre lacul «Bălteni» și pe drumul dintre pădurea «Ciolpani» și pădurea «Tâncăbești», frecvent. 4. Iulie — Septemvrie.



**Tussilago Farfara** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 865 și ed. 2. (1763). 1214. STURM, Deutschlands Flora Heft 2. (1798). t. 10. DC. Prodr. V. 208. KOCH, Syn. ed. 2. 383. LEDEB. fl. ross. II. 470. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 91. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XVI. 5 t. 13. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 326. BOISS. fl. orient. III. 377. FIEK, Fl. von Schlesien 209. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXIX 57. t. 2961. COSTE, Fl. Franc. II. 287. ROUY, Fl. Franc. VIII. 344. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 725. NYMAN, Consp. 397. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 298. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 284. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. II. 11, HOFMANN, Compositae în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. 5 Abteilung pag. 290. fig. 133. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 261 și Flora Dobrogei 229. GRECESCU, Conspect. fl. României 289. *Tussilago vulgaris* LAMK. *Tussilago generalis* KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. 99. t. 52. *Farfara radiata* GILIB. — Vulg. Podbal, Podbeal, Podval. — Pe locuri argiloase, calcaroase și umede, pe lângă pâraie, pe coaste și maluri rupte, pe arături umede și pe marginea drumurilor, adesea. București, la «Moara lui Ciurel». spre Satu-nou pe marginea Dâmboviței, frecvent; Mănăstirea Cernica, pe coaste aproape de localitatea «La-Anini», abundent; Periș, pe marginea drumului de fier, în locuri argiloase umede; Crivina, pe locuri umede. 4. Martie — Aprilie.

*Tussilago-Farfara* L. este o plantă nouă pentru Flora regiunii Bucureștilor, căci n'a mai fost citată până acum de nimeni din această regiune.

**Petasites officinalis** MOENCH. Meth. (1794). 568. KOCH, Syn. ed. 2. 383. LEDEB. fl. ross. II. 468. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 89. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 324. BOISS. Fl. orient. III. 377. FIEK, Fl. von Schlesien 209. HALLIER Fl. von Deutschld. XXIX. 60. t. 2962. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 1209. COSTE, Fl. Franc. II. 287. ROUY, Fl. Franc. VIII. 346. KRAUSE în LUTZ. Sturms Fl. von Deutschld. XIII. 104. t. 53. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 726. NYMAN, Consp. 397. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 298. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 284. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. II. 11. HOFFMANN, Compositae în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. 5 Abteilung pag. 290. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. Române 261. GRECESCU, Conspect. fl. României 289 și Supplement 81. *Petasites vulgaris* DESF. Fl. Atl. II. (1798). 270. DC. Prodr. V. 206. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XVI. 4. t. 10. *Tussilago Petasites* L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 866 și ed. 2. (1763). 1215. (planta cu flori hermafrodite) și *Tussilago hybrida* L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 866 și ed. 2. (1763). 1214. (planta cu flori feminine). — Vulg. Brustur, Brustur-dulce, Buedea-ciumei, Cap-talan, Căptălaci, Cucuruz, Cucuruzi, Rădăcina-ciumei, Sudoarea-lap telui. — Prin locuri umede, pe lângă pâraiele din păduri. Crivina, pe locuri umede. (legit. EM. C. TEODORESCU). 4. Martie — Aprilie.

**Doronicum hungaricum** RCHB. fil. Icon. fl. germ. et helv. XVI. 34. t. 65.

fig. I. HEUFF. Enum. pl. Banat. — Temes. 101. No. 948. NEILR. Diagnosen 72. BOISS. fl. orient. III. 381. NYMAN, Consp. 350. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 321. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 251. PORCIUS, Diagnozele 128. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 288 și Flora Dobrogei 232. GRECESCU, Conspect. fl. României 318. *Doronicum plantagineum* BMGT. et plur. Auct. non L. *Doronicum longifolium* JANKA în Linnaea XXX. (1859 și 1860). 577. non RCHB.—Prin păduri și tufișuri, în regiunea dealurilor și a câmpiilor, adesea. București, Colentina, în pădurea «Andronache»; Mănăstirea Cernica, în pădurea «Cernica», frecvent; Mănăstirea Pasărea, în pădurea «Pustnicu», abundent; Călugăreni, Crucea-de-piatră, în pădurea „Crucea-de-piatră”; Comana, în pădure. 4. Aprilie — Maiu.

**Cineraria procera** GRISEB. Spicil. Fl. rumel. et bithyn. II. (1844). 219. NYMAN, Consp. 351. GRECESCU, Conspect. fl. României 320. *Senecio procerus* GRISEB. apud. BOISS. fl. orient III. 413. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 259. —Prin păduri și tufișuri. Comana, în tufișurile de pe marginea pădurii, nu tocmai frecventă. 4. Maiu.

**Senecio vulgaris** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 867 și ed. 2. (1763). 1216. DC. Prodr. VI. 341. KOCH, Syn. ed. 2. 425. LEDEB. fl. ross. II. 628. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 111. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XVI. 35. t. 68. fig. I. NEILR. Fl. von. Nieder-Oesterreich 364. BOISS. fl. orient. III. 386. FIEK, Fl. von Schlesien 228. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXIX. 385. t. 3084. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 1220. COSTE, Fl. Franc. II. 302. ROUY, Fl. Franc. VIII. 342. KRAUSE, în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld XIII. 84. t. 58. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 721. NYMAN, Consp. 358. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 326. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 253. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. II. 86. HOFFMANN, Compositae în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. 5 Abteilung pag. 297. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 288. GRECESCU, Conspect. fl. României 321. — Vulg. Cel-pierit, Cruceliță, Cruciuliță, Petimbrosă, Spălăcioasă. — Pe locuri năsiptoase inculte sau cultivate, pe marginea drumurilor, pe lângă garduri și pe câmp, adesea. București, la Cotroceni pe marginea Grădinii botanice; București, la «Moara-lui-Ciurel» pe marginea Dâmboviței. ☉. Martie — Octomvrie.

**Senecio vernalis** W. et KIT. Descr. et icon. pl. rar. Hung. I. (1802). 23. t. 24. DC. Prodr. VI. 345. KOCH, Syn. ed. 2. 426. LEDEB. fl. ross. II. 630. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XVI. 33. t. 68. fig. II. BOISS. fl. orient. III. 389. FIEK, Fl. von Schlesien 229. HALLIER, Fl. von Deutschld. 393. t. 3087. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld XIII. 81. t. 60. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 722. NYMAN, Consp. 357. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 327. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 253. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. II. 85. HOFFMANN, Compositae în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. 5 Ab-

teilung pag. 297. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 289 și Flora Dobrogei 220. GRECESCU, Conspect. fl. României 321. — Vulg. Cel-pierit, Cruceliță, Cruciuliță, Petimbroadă, Spălăcioasă. — Prin locuri cu iarbă, năsi-poase și argiloase, prin arături, prin vii, pe marginea drumurilor, pe lângă păduri, adesea. Ciorogârla, pe marginea pădurii «Cotroceanca»; Pâslari spre Pârliți, printre vii, frecvent; Comana, pe marginea pădurii; Chitila, pe marginea pădurii, adesea; Mănăstirea Cernica, «La-Anini», pe coaste; Mănăstirea Pasărea, pe marginea drumului de fier, aproape de halta «Pasărea»; Mănăstirea Căldărușani, pe marginea drumului spre «Moara-Săracă»; Mănăstirea Țigănești, pe marginea pădurii «Țigănești», aproape de satul Țigănești. ☉. Aprilie—Maiu.

**Senecio erucifolius** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 869. No. 15. cnf. Errata (*erucifolia*) și ed. 2. (1763). 1218. KOCH, Syn. ed. 2. 427. LEDEB. fl. ross. II. 633. (*erucaefolius*). GREN. GODR. Fl. Franc. II. 116. RCHB. Icon. fl. germ. et. helv. XVI. 38 t. 75. fig. I. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 365. BOISS. fl. orient. III. 391. FIEK, Fl. von Schlesien 229. HALLIER, Fl. von Deutschld XXIX. 401. t. 3090. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 1221. COSTE, Fl. Franc. II. 304. ROUY, Fl. Franc. VIII. 333. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. XIII. 75. fig. 7 delă pag. 76. GARCKE, III. Fl. von Deutschld 722. NYMAN, Consp. 356. VELENOVSKY Fl. Bulg. 253. HALÁCSY, Consp. Fl. Graec. II. 83. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 289 și Flora Dobrogei 221. GRECESCU, Conspect. fl. României 321 și Suplement 91 *Senecio erucifolius* HUDS. apud. HOFFMANN, Compositae în ENGLER. I. c. *Senecio tenuifolius* JACQ, Fl. austr. III. 42. t. 278. DC. Prodr. VI. 351. pro. var.  $\beta$ . *Senecionis erucaefolii* HUDS. — Vulg. Bătătarnică, Bătătarniță, Petimbroadă. — Prin tufișuri pe marginea pădurilor, prin locuri umede, pe lângă vii, în livezi și pe câmpuri prin mărcinișuri, adesea. Ciorogârla, pe marginea pădurii «Cotroceanca», abundant; Comana, spre stația «Mihaiu-Bravul», pe marginea pădurii, frecvent; Mănăstirea Cernica, pe câmpia de lângă linia forturilor, frecvent; Mănăstirea Țigănești, pe marginea pădurii «Ciolpani», abundant. 4. Iulie—August.

**Senecio Jacobaea** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 870. și ed. 2. (1763). 1219. DC. Prodr. VI. 350. KOCH, Syn. ed. 2. 427. LEDEB. fl. ross. II. 635. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 115. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XVI. 38. t. 73. fig. II. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 366. BOISS. fl. orient. III. 392. FIEK, Fl. von Schlesien 229. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXIX. 404. t. 3091. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 1222. COSTE, Fl. Franc. II. 304. ROUY, Fl. Franc. VIII. 335. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. XIII. 79. t. 61. GARCKE, III. Fl. von Deutschld 722. NYMAN, Consp. 355. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 328. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 254. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. II. 83. HOFFMANN, Compositae în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. 5. Abteilung pag. 297. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 290. GRECESCU, Cons-

pect. fl. României 322. — Prin livezi, rărișuri, poieni și pe marginea pădurii, adesea. Jilava, pe marginea tufișurilor; Călugăreni, Crucea-de-piatră, pe marginea pădurii «Uzun» și pe marginea pădurii «Crucea-de-piatră»; Comana, pe marginea pădurii; Mănăstirea Pasărea, pe marginea pădurii «Cernica», lângă șoseaua ce duce la «Brănești» și pe marginea pădurii «Pasărea», frecvent; Mănăstirea Căldărușani, în curtea mănăstirii și pe marginea pădurii «Brânzeasca», abundant; Mănăstirea Țigănești, pe marginea pădurii «Ciolpani», frecvent. ☉. Iulie—August.

**Senecio erraticus** BERTOL. Amoën. ital. III. (1819). 92 și 214. DC. Prodr. VI. 349. KOCH, Syn. ed. 2. 428. LEDEB. fl. ross. II. 634. GREIN. GODR. Fl. Franc. II. 115. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XVI. t. 73. fig. I. BOISS. fl. orient. III. 392. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXIX. 409. t. 3093. COSTE, Fl. Franc. II. 304. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 723. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 254. HOFFMANN, Compositae în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. 5. Abteilung pag. 297. GRECESCU, Conspect. fl. României 322. *Senecio erraticus* BERTOL, ca formă dela specia *Senecio Jacobaea* L. apud ROUY, Fl. Franc. VIII. 337. *Senecio Jacobaea* L.  $\gamma$ . *erraticus* BERTOL. apud NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 367. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 1222. *Senecio Barbareaefolius* KROCKER (*Barbareaefoliis*). Fl. Siles. II. (1790). 421. apud FIEK, Fl. von Schlesien 229. NYMAN, Consp. 355. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 328. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. II. 84.—Prin livezi umede pe marginea pădurilor, în tufișuri pe locuri umede. București, la «Moara-lui-Ciurel», pe locurile umede de pe marginea Dâmboviței; Măgurele, pe locurile umede de pe marginea Sabarului, frecvent; Călugăreni, Crucea-de-piatră, pe locurile umede din lunca Călniștei, pe marginea pădurii «Crucea-de-piatră» și pe locurile umede dela «Șipot», frecvent; Budești, în pădurea de pe marginea râului Argeș; Băneasa, pe marginea Colentinei în locuri umede; Mănăstirea Țigănești, pe drumul dintre pădurea «Ciolpani» și pădurea «Tâncăbești», frecvent. ☉. Iulie—August.

Această plantă este nouă pentru Flora regiunii Bucureștilor, căci n'a mai fost citată până acum de nimeni din această regiune.

**Senecio Biebersteinii** LINDEMANN, Prodr. Fl. Cherson. (1872) 113 și Flora Chersonensis I. (1881). 327. pro var. *S. Doriae*. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 329. PORCIUS, Diagnozole 132. GRECESCU, Supplement la Conspectul Florei României 91. *Senecio macrophyllus* GRECESCU et Auct. Transs. non M. BIEB. *Senecio Doria* BRÂNDZĂ, Prodr. Fl. române 291. non L. — Prin livezi umede, în locuri joase, mlaștini cu păpuriș, printre arături, prin fânețele și pășunile umede și pe colinele ierboase din regiunea inferioară. Oltenița, pe locurile umede de pe marginea șoselei spre București, nu tocmai frecvent. 4. Iulie — August.

*Senecio Biebersteinii* LINDEMANN n'a mai fost citat de nimenea până acum din regiunea Bucureștilor.

*Senecio tomentosus* HOST. Fl. Austr. II. (1831). 476. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 330. GRECESCU, Conspect. fl. României 322 și Suplement 91. *Senecio paludosus* L.  $\gamma$ . *tomentosus* KOCH, Syn. ed. 2. 431. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XVI. 41. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXIX. 434. *Senecio paludosus* L.  $\gamma$ . *hypoleucus* LEDEB. fl. ross. II. 640. LINDEMANN. Fl. Cherson. I. 327. *Senecio auratus* DC. Prodr. VI. 348. NYMAN, Consp. 353. *Senecio Sadleri* LANG. în SADLER, Fl. Comit. Pest. (1840). 403. *Senecio aureus* GEORGI, Beschreib. des russ. Reichs. III. 1243. non L. *Cineraria aurea* L. Sp. pl. ed. 2. (1763). 1244. *Senecio paludosus* BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 291 și Flora Dobrogei 221. non L. — Pe locurile umede mlăștinoase, prin luncile de pe marginea râurilor, nu tocmai frecvent. Călugăreni, Crucea-de-piatră, în pădurea «Crucea de piatră», pe locurile umede dela «Șipot», rar. 4. Iunie — Iulie.

*Senecio tomentosus* HOST. eră cunoscută la noi până acuma numai din locurile umede mlăștinoase de lângă Galați și din bălțile Dunării din Dobrogea; prin urmare constatarea acestei rari și interesante plante și în regiunea Bucureștilor, la Călugăreni, merită o deosebită atențiune.

*Echinops sphaerocephalus*. L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 814 și ed. 2. (1763). 1314. DC. Prodr. VI. 524. KOCH, Syn. ed. 2. 452. LEDEB. fl. ross. II. 655. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 201. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XV. 1. t. 3. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 374. BOISS. fl. orient III. 438. FIEK, Fl. von Schlesien 232. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXX. 43. t. 3108. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 1224. COSTE, Fl. Franc. II. 361. ROUY, Fl. Franc. VIII. 357. KRAUSE, în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. XIV. 11. fig. 1. dela pag. 12. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 748. NYMAN, Consp. 399. VELENOVSKY. Fl. Bulg. 285. HALLÁCSY, Conspect. Fl. Graec. II. 89. HOFFMANN, Compositae în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. 5 Abteilung pag. 314. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 292 și Flora Dobrogei 203. GRECESCU, Conspect. Fl. României 325 și Suplement 92. *Echinops multiflorus* LAMK. — Vulg. Ariciu, Căpățânoasă, Măciuca-ciobanului, Rostogol, Scaiu, Scaiu rotunjor, Scăiete. — Prin rășișuri, poieni și pe marginea pădurilor prin fânețe în tufișuri, adesea. Călugăreni, Crucea-de-piatră, pe marginea pădurii «Uzun», frecvent; Comana, în tufișurile de pe marginea pădurii; Mănăstirea Pasărea, pe marginea pădurii «Pasărea», frecvent. 4. Iulie — August.

*Xeranthemum annuum*  $\alpha$  L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 857 și ed. 2. (1763). 1201 KOCH, Syn. ed. 2. 476. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 374. BOISS. fl. orient III. 444. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXX. 185 t. 3169. BECK, Fl.

von Nieder-Oesterreich 1225. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. XIV. 9. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 735. HOFFMANN, Compositae în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. 5 Abteilung pag. 315. NYMAN, Consp. 401. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 333. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 289. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. II. 93. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 307 și Flora Dobrogei 205. GRECESCU, Conspect Fl. României 326 și Suplement 92. *Xeranthemum radiatum* LAMK. Fl. Franç. II. 48. DC. Prodr. VI. 528. LEDEB. fl. ross. II. 658. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XV. 3. t. 6. fig. II. — Vulg. Cununițe, Imortele, Măturici, Plevaiță, Plevaițe, Pleviță, Plevițe, Tavnică, Tavniță. — Pe locurile sterile dela câmp, pe marginea sămănăturilor, prin fânețele de pe colinele năsiptoase și pietroase, pe marginea pădurilor, adesea. Cățelu, pe lângă linia forturilor; Mănăstirea Cernica, pe câmpia de lângă linia forturilor; Mănăstirea Pasărea, pe marginea pădurii «Cernica», spre șoseaua ce duce la «Brănești» și pe marginea pădurii «Pasărea»; Jilava, pe marginea șoselei; Gogoșari spre Varlam, prin tufișurile de pe marginea sămănăturilor, abundent; Budeni, spre Varlam în câmp, pe marginea drumului; Călugăreni, pe marginea șoselei București-Giurgiu, frecvent, și pe marginea pădurii «Uzun», abundent; Comana, pe coaste la marginea pădurii; Gruiu, pe marginea șoselei București spre Oltenița, abundent. ☉. Iunie — August.

*Xeranthemum cylindraceum* SIBTH. et SM. Fl. Graec. Prodr. II. (1813). 172. DC. Prodr. VI. 529. KOCH, Syn. ed. 2. 476. LEDEB. fl. ross. II. 659. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 282. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XV. 4. t. 7. BOISS. fl. orient III. 416. COSTE, Fl. Franc. II. 405. ROUY, Fl. Franc. VIII. 371. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. XIV. 9. NYMAN, Consp. 402. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 333. HALÁCSY, Conspect Fl. Graec. II. 93. HOFFMANN, Compositae în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. 5 Abteilung pag. 315. BRÂNDZĂ, Prodr. Fl. române 307 și Flora Dobrogei 206. GRECESCU, Conspect. fl. României 326. *Xeranthemum inapertum* DC. non WILLD. *Xeroloma foetidum* CASS. — Pe locuri sterile, prin fânețele uscate, pe colinele năsiptoase și pietroase expuse soarelui, pe câmp la marginea sămănăturilor, pe marginea pădurilor, adesea împreună cu specia precedentă, însă mai târzie. Călugăreni, Crucea-de-piatră, pe marginea pădurii «Crucea-de-piatră», frecvent; Comana, pe marginea pădurii pe lângă drumul de fier, abundent; Mănăstirea Pasărea, pe marginea pădurii «Pasărea», frecvent; Mănăstirea Căldărușani, Gagu-Merișeasca, pe marginea pădurii «Brânzeasca», destul de frecvent; Mănăstirea Țigănești, pe marginea pădurii «Ciolpani,» adesea. ☉. Iulie — August.

*Carlina brevibracteata* ANDRAE. Bot. Zeit. XIII. (1855). 313, pro var. *C. longifoliae*. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 342. PORCIUS, Diagnozele 141.

GRECESCU, Conspect. fl. României 327. *Carlina brevibracteata* SIMK. apud GRECESCU, Supplement la Conspect. fl. României 92. *Carlina longifolia* RCHB. f. *brevibracteata* ANDRAE apud BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 1227. *Carlina longifolia* FUSS. în BMGT. Mant. (1846). 72. non RCHB. *Carlina nebrodensis* AUCT. TRANS. non GUSS. în DC. Prodr. VI. 546, *Carlina intermedia* SCHUR. Enum. pl. Transs. 413.— Prin rărișuri, poieni și pe marginea pădurilor în tufișuri, adesea. Mănăstirea Căldărușani, pe marginea pădurii «Moara-Săracă» și prin rărișurile și poienile din pădurea «Brânzeasca», frecventă; Periș, lângă gară pe marginea tufișurilor, adesea (legit A. PROCOPIANU). ☉. Iulie—August.

**Arctium Lappa** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 816 și ed. 2. (1763). 1143.  $\alpha$ . WILLD. Spec. pl. III. 1631. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 1228. GARCKE, III. Fl. von Deutschld 736. HOFFMANN, Compositae în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. 5 Abteilung pag. 318. *Arctium majus* BERNH. Verz. Pflanz. Erfurt. (1800). 154. apud ROUY, Fl. Franc. IX. 94. SCHKUHR. Handb. III. 49. NYMAN, Consp. 402. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. XIV. 15. t. 15. fig. 2. *Lappa officinalis* ALL. Fl. Pedem. I. 145. (1785). RCHB. Icon. fl. germ. et. helv. XV. 54. 81. fig. II. FIEK, Fl. von Schlesien 242. COSTE, Fl. Franc. II. 404. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 340. *Lappa major* GAERTN. Fruct. II. (1791). 379. t. 162. DC. Prodr. VI. 661. KOCH, Syn. ed. 2. 463. LEDEB. fl. ross. II. 748. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 280. BOISS. fl. orient. III. 457. HALLIER, Fl. von Deutschld XXX. 119. t. 3138. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 290. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. II. 101. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 298 și Flora Dobrogei 207. GRECESCU, Conspect. fl. României 327 și Supplement 92. *Lappa communis* Coss. et. GERM.  $\alpha$ . *major* NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 395. *Lappa glabra* LAMK.  $\beta$ . *major* în Encycl. Méth. I. (1783). 377. — Vulg. Brustur, Brusture, Lăpuc, Lipan. — Pe locuri necultivate, pe lângă garduri și drumuri, prin dărâmături și pe marginea pădurilor, adesea. Oltenița, în pădurea de pe marginea Dunării, aproape de gura Argeșului; Mănăstirea Pasărea, pe marginea pădurii «Pasărea»; Mănăstirea Snagov, pe insulă prin dărâmăturile zidurilor mănăstirii. ☉. Iulie—August.

**Arctium tomentosum** SCHRANK, apud HOFFMANN, Compositae în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. 5. Abteilung pag. 318. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld XIV. 14. t. 16. fig. 2. GARCKE, III. Fl. von Deutschld 737. SCHKUHR, Handb. III. 49. t. 227. NYMAN, Consp. 402. *Arctium tomentosum* MILL. Gard. Diet. VIII. No. 3. (*tomentosis*), (1768). apud BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 1228. ROUY, Fl. Franc. IX. 96. *Arctium Bardana* WILLD. Spec. pl. III. (1800). 1632. *Arctium Lappa*  $\beta$ . L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 816 și ed. 2. (1763). 1143. *Lappa tomentosa* LAMK. Fl. franç II. (1778). 37. DC. Prodr. VI. 661. KOCH, Syn. ed. 2. 463. LEDEB. fl. ross. II. 749. GREN.

GODR. Fl. Franc. II. 281. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XV. 54. t. 80. fig. II. BOISS. fl. orient. III. 457. FIEK, Fl. von Schlesien 243. COSTE, Fl. Franc. II. 404. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 341. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 290. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 298 și Flora Dobrogei 207. GRECESCU, Conspect. fl. României 327 și Suplement 93. *Lappa tomentosa* ALL. apud HALLIER, Fl. von Deutschld. XXX. 121. t. 3139. *Lappa communis* COSS. et GERM. γ. *tomentosa* NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 395.—Vulg. Brustur, Brusture, Lipan.—Pe locuri necultivate, prin dărâmături pe lângă garduri și drumuri, pe marginea pădurilor și tufişurilor, adesea împreună cu specia precedentă. București, la «Moara-lui-Ciurel» în lunca Dâmboviței; Comana, spre stația «Mihaiu-Bravul», pe marginea pădurii, frecvent. ☉. Iulie—August.

× **Arctium ambiguum** ČELAK. sub *Lappa* apud BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 1228. *Arctium Lappa* × *tomentosum*. *Lappa ambigua* ČELAK. (*major* × *tomentosa*). Prodr. Fl. Boh. (1872). 249. PORCIUS, Diagnozele 141. *Lappa intermedia* PORCIUS. Distr. Năseud. 113. *Lappa major* × *tomentosa* HAUSSKN. în Oest. Bot. Zeit. (1864). 206. *Lappa major* β. *arachnoidea* OPIZ.—Capitulii de mărimea celor dela *Arctium Lappa* L., însă puțin arachnoideu-păroși (mai puțin decât la *Arctium tomentosum* SCHRANK.), cei terminali (1—4) îndesuiți. Squamele interne purpurii, mai lat-lanceolate, acuminate cu vârful încârligat și numai cele mai interne au vârful puțin curbat.—Sporadic între părinți. Mănăstirea Țigănești, pe drumul dintre pădurea «Ciolpani» și pădurea «Tâncăbești,» rară. ☉. Iulie—August.

Această plantă este nouă pentru Flora României.

**Arctium minus** SCHRANK. apud HOFFMANN, Compositae în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. 5 Abteilung pag. 318. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. XIV. 14. t. 16. fig. 1. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 737. *Arctium minus* BERNH. Verz. Pflanz. Erfurt. (1800). 154. apud BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 1228. ROUY, Fl. Franc. IX. 95. SCHKUHR, Handb. III. 49. t. 227. NYMAN, Consp. 402. *Lappa minor* DC. Fl. franç. IV. (1805). 77. DC. Prodr. VI. 661. KOCH, Syn. ed. 2. 463. LEDEB. fl. ross. II. 748. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 280. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XV. 53. t. 80. fig. I. FIEK, Fl. von Schlesien 243. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXX. 115. t. 3136. COSTE, Fl. Franc. II. 404. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 290. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 298 și Flora Dobrogei 207. GRECESCU, Conspect. fl. României 327 și Suplement 93. *Lappa minor* SCHKUHR. Handb. III. (1808). 49 sub *Arctio* apud BOISS. fl. orient. III. 457. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 340. *Lappa minor* BERNH. apud, HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. II. 102. *Lappa glabra* LAMK. var. α. în Eeycl. méth. I. 377. *Lappa communis* COSS. et GERM. β. *minor* NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 395.—Vulg.



Brustur, Brusture, Lipan. — Pe locuri necultivate, pe câmpuri, pe lângă drumuri, prin dărâmături și pe marginea pădurilor, adesea împreună cu speciile precedente. Budești, lângă pădurea de pe marginea râului Argeș; Mănăstirea Țigănești, pe marginea pădurii «Ciolpani» și pe drumul dintre pădurea «Ciolpani» și pădurea «Tâncăbești», frecvent. ☉. Iulie—August.

**Carduus acanthoides.** L. Sp. pl. ed. 1 (1753). 821. ed. 2. (1763). 1150. DC. Prodr. VI. 623. KOCH, Syn. ed. 2. 459. LEDEB. fl. ross. II. 719. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 231. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XV. 94. t. 142. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 384. BOISS. Fl. orient. III. 518. FIEK, Fl. von Schlesien 240. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXX. 96. t. 3128. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 1236. ROUY, Fl. Franc. IX. 78. KRAUSE în LUTZ, Sturms von Deutschld. XIV. 62. t. 9. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 738. NYMAN, Consp. 412. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 337. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 301. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. II. 104. HOFFMANN, Compositae în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. 5 Abteilung pag. 322. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 296 și Flora Dobrogei 217. GRECESCU, Conspect. fl. României 328 și Suplement 93. — Vulg. Scaiu, Scăiete, Schin, Spin. — Pe câmpuri, pe locuri cultivate și inculte, pe lângă drumuri, prin dărâmături și pe marginea pădurilor, adesea. Ciorogârla, pe marginea pădurii «Cotroceanca»; Mănăstirea Pasărea, pe marginea pădurii «Pasărea»; Mănăstirea Țigănești, pe marginea pădurii «Ciolpani». ☉. Iulie — August.

**Carduus crispus** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 821 și ed. 2. (1763). 1150. DC. Prodr. VI. 623. KOCH, Syn. ed. 2. 460. LEDEB. fl. ross. II. 720. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 230. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XV. 94. t. 149. fig. I. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 384. BOISS. fl. orient. III. 520. FIEK, Fl. von Schlesien 240. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXX. 99. t. 3129. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 1235. COSTE, Fl. Franc. II. 381. ROUY, Fl. Franc. IX. 77. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. XIV. 64. t. 10. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 738. NYMAN, Consp. 413. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 339. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 300. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. II. 105. HOFFMANN, Compositae în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. 5 Abteilung pag. 322. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 297. GRECESCU, Conspect. fl. României 329 și Suplement 93. — Prin locuri umede în tufișuri, pe lângă drumuri și garduri, prin livezi, pe marginea râurilor în lunci și pe marginea pădurilor, adesea. Periș, lângă gară prin tufișuri, în locuri umede, (legit. A. PROCOPIANU). ☉. Iulie — August.

**Carduus nutans** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 821 și ed. 2. (1763). 1150. DC. Prodr. VI. 621. KOCH, Syn. ed. 2. 462. LEDEB. fl. ross. II. 718. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 231. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XV. 93. t. 146. fig. I. și II. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 383. BOISS. Fl. orient. III. 515. FIEK, Fl.

von Schlesien 240. HALLIER, Fl. von Deutchld. XXX. 111. t. 3134. COSTE, Fl. Franc. II. 382. ROUY, Fl. Franc. IX. 89. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. XIV. 67 t. 13. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 739. NYMAN, Consp. 411. SIMONKAI, Fnum. Fl. Transs. 340. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 299. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. II. 102. HOFFMANN, Compositae în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. 5 Abteilung pag. 322. BRÂNDZĂ, Prodr. Fl. române, 297. GRECESCU, Conspect. fl. României 329. — Vulg. Ciulin, Scaiu, Scăiete, Schin, Spin. — Prin livezi și pășuni uscate, pe locuri necultivate, pe lângă drumuri și câmpuri, pe marginea pădurilor, adesea. Călugăreni, Crucea-de-piatră, pe marginea pădurii «Uzun»; Comana, pe marginea pădurii; Chitila, pe marginea drumului; Mănăstirea Pasărea, pe marginea pădurii «Pasărea», frecvent. ☉. Iunie — August.

**Cirsium Sintenisii** FREYN, Ueber neue und bemerkenswerthe orientalische Pflanzenarten în «Bulletin de l'Herbier Boissier». III. (1895). pag. 466. GRECESCU, Conspect fl. României 331. *Cirsium Boissieri* FREYN et BOBNM. in exiccatis (non HAUSSKN). Pe câmpuri în locuri deschise, pe dealuri argilo-cretoase și pe marginea pădurilor. Mănăstirea Căldărușani, pe marginea pădurii «Brânzeasca». ☉. Iulie — August.

**Cirsium lanceolatum** SCOP. Fl. Carn. ed. 2 II. (1772). 130. No. 1007. DC. Prodr. VI. 636. KOCH, Syn. ed. 2. 452. LEDEB. Fl. ross. II. 726. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 209. RCHB. Icon. fl. germ. et. helv. XV. 60 t. 95. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 388. FIEK, Fl. von Schlesien 233. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXX. 46. t. 3109. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 1237. COSTE, Fl. Franc. II. 371. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 741. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 295. HOFFMANN, Compositae în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil 5. Abteilung, pag. 322. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 293 și Flora Dobrogei 218. GRECESCU, Conspect. fl. României 333 și Supplement 94. *Cirsium lanceolatum* L. sub *Carduo* apud BOISS. fl. orient. III. 538. NYMAN, Consp. 406. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 333. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. II. 112. *Cirsium lanceolatum* HILL. apud ROUY, Fl. Franc. IX. 20. *Carduus lanceolatus* L. Sp. pl. ed. 1. (1753) 821 și ed. 2. (1763). 1149. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. XIV. 59. t. 1. *Cnicus lanceolatus* WILD. Prodr. Fl. Berol. 259. *Eriolepis lanceolata* CASS. Dict. sc. nat. 41. (1826). 331. — Vulg. Scaiu, Scăiete, Crăpușnic, Ghimpe. — Prin locuri inculte, pe lângă drumuri, prin dărâmături și pe marginea pădurilor, adesea. Ciorogârla, pe marginea pădurii «Cotroceanca», frecvent; Budești, în pădurea de pe marginea râului Argeș; Mănăstirea Pasărea, pe marginea pădurii «Pustnicu»; Mănăstirea Țigănești, pe drumul dintre pădurea «Ciolpani» și pădurea «Tâncăbești», frecvent. ☉. Iunie — Septembrie.

**Cirsium pannonicum** GAUD. Fl. Helv. VI. (1833). 363. DC. Prodr. VI. 645.

KOCH, Syn. ed. 2. 453. LEDEB. fl. ross. 741. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XV. 61. t. 98. fig. II. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 390. FIEK, Fl. von Schlesien 235. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXX. 57. t. 3113. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 1243. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld 742. NYMAN, Consp. 409. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 297. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 294 și Flora Dobrogei 219. GRECESCU, Conspect fl. României 335 și Suplement 94. *Cirsium Pannonicum* L. FIL. (sub *Carduo*), apud BOISS. Fl. orient. III. 541. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 335. *Carduus pannonicus* L. FIL. Supl. (1781) 348. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. XIV. 53. *Carduus serratuloides* JACQ., *Cirsium serratuloides* SCOP. Fl. Carn. ed. 2. II. (1772). 127. — Prin livezi și văi umede, umbroase și pe marginea pădurilor. Mănăstirea Pasărea, în pădurea «Pasărea», frecvent. 4. Iunie — Iulie.

*Cirsium arvense* SCOP. Fl. Carn. ed. 2. II. (1772). 126. KOCH, Syn. ed. 2. 457. LEDEB. fl. ross. II. 734. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 226. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XV. 67. t. 111. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 391. FIEK, Fl. von Schlesien 236. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXX. 87. t. 3124. BECK, Fl. von Nied.-Oesterreich 1239. COSTE, Fl. Franc. II. 374. ROUY, Fl. Franc. IX. 65. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 743. NYMAN, Consp. 410. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 298. HOFFMANN, Compositae în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. 5 Abteilung pag. 322. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 296 și Flora Dobrogei 219. GRECESCU, Conspect fl. României 336 și Suplement 95. *Cirsium arvense* L. sub *Serratula* apud BOISS. fl. orient. III. 552. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 337. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. II. 118. *Serratula arvensis* L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 820 și ed. 2. (1763). 1149. *Carduus arvensis* SMITH. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. XIV. 54. t. 8. *Cnicus arvensis* BERNH. — Vulg. Pălămidă, Polomidă, Scăiete. — Prin sămănături și pe marginea drumurilor, adesea; Oltenița, pe marginea șoselei spre București, frecvent; Cernica, pe câmpie, adesea; Chitila, prin sămănăturile de pe marginea pădurii, abundent. 4. Iunie — August. Variază.

Var.  $\gamma$ . *incanum* FISCHER (pro specie). apud FIEK, Fl. von Schlesien 236. LEDEB. fl. ross. II. 735. GRECESCU, Conspect. fl. României 336. *Cirsium incanum* FISCH. apud DC. Prodr. VI. 643. *Cirsium arvense* SCOP.  $\delta$ . *vestitum* KOCH l. c. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 296. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XV. t. 111 fig. III. *Cirsium arvense* SCOP. c. *argenteum* VEST. (pro specie) apud GARCKE, l. c. — Mănăstirea Căldărușani, prin sămănăturile de pe marginea pădurii Brânzeasca.

*Onopordon Acanthium*. L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 827 și ed. 2. (1763). 1158. DC. Prodr. VI. 618. KOCH, Syn. ed. 2. 462. LEDEB. fl. ross. II. 716. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 204. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XV. 55. t. 82. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 383. BOISS. fl. orient. III. 559. FIEK, Fl. von Schlesien

242. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXX. 123. t. 3140. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 1251. COSTE, Fl. Franc. II. 364. ROUY, Fl. Franc. IX. 5. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld XIV. 72. t. 14. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 744. NYMAN, Consp. 402. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 340. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 290. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. II. 121. HOFFMANN, Compositae în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. 5 Abteilung pag. 324. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 298 și Flora Dobrogei 204. GRECESCU, Conspect. fl. României 336 și Suplement 95. *Acanos Spina* SCOP. Fl. Carn. ed. 2. II. (1772). 132. No. 1013. *Onopordon acanthifolia* GILIB. — Vulg. Ciulin, Ghimpe-mare, Scaiu, Scaiu-măgăresc, Scăiete, Scăiete-muced. — Pe locuri incolte și aride, pe lângă locuințe, prin dărâmături și pe marginea drumurilor, adesea. Domnești, Ciutați, pe marginea drumului. ☉. Iunie—August.

**Jurinea mollis** RCHB. Fl. germ. excurs. (1831). 290. DC. Prodr. VI. 676. KOCH, Syn. ed. 2. 467. LEDEB. fl. ross. II. 766. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XV. 49. t. 77. fig. I. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 397. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXX. 145. t. 3152. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 1253. NYMAN, Consp. 415. HOFFMANN, Compositae în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. 5. Abteilung. pag. 321. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 300 și Flora Dobrogei 216. GRECESCU, Conspect. fl. României 337 și Suplement 95. *Jurinea mollis* L. sub *Carduo* apud BOISS. fl. orient. 575. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. II. 127. *Carduus mollis* L. Sp. pl. ed. 2. (1763). 1156. *Serratula transsilvanica* SPRENG. Syst. veg. III. (1826). 388. *Jurinea transsilvanica* SPRENG. apud SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 344. *Serratula blanda* M. BIEB. Fl. Taur. — Cauc. III. (1819). 549. — Pe coastele colinelor aride, prin poieni, rărișuri și pe marginea pădurilor în tufișuri, adesea. Comana, pe coaste la marginea pădurii, frecventă; Mănăstirea Pasărea, pe marginea pădurii Pustnicu și pe marginea pădurii «Pasărea»; frecventă. 4. Maiu—Iunie.

**Serratula tinctoria** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 816 și ed. 2. (1763). 1144. DC. Prodr. VI. 667. KOCH, Syn. ed. 2. 466. LEDEB. fl. ross. II. 755. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 268. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XV. 45. t. 71. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 396. BOISS. fl. orient. III. 585. FIEK, Fl. von Schlesien 243. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXX. 138. t. 3147. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 1254. COSTE, Fl. Franc. II. 400. ROUY, Fl. Franc. IX. 105. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld XIV. 18. t. 19. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 744. NYMAN, Consp. 417. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 343. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 303. HOFFMANN, Compositae în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. 5. Abteilung pag. 326. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 300. GRECESCU, Conspect. fl. României 338. *Carduus tinctorius* SCOP. Fl. Carn. ed. 2. II. (1772). 132. — Vulg. Galbinare, Pălămidă, Pălămida-boian-giilor. — Prin livezi, poieni, rărișuri și pe marginea pădurilor, prin fâna-

tele umede, în tufișuri, adesea. Mănăstirea Cernica, pe marginea pădurii «Cernica» spre șoseaua ce duce la «Brănești»; Mănăstirea Pasărea, în pădurea «Pustnicu» și pe marginea pădurii «Pasărea», frecventă; Mănăstirea Căldărușani, pe marginea pădurii «Moara-Săracă» și prin poienile din pădurea «Brânzeasca», abundentă; Mănăstirea Țigănești, pe marginea pădurii «Ciolpani», frecventă. 4. Iulie — Septembrie.

Prin împrejurimile Bucureștilor nu crește decât numai forma cu foile aproape întregi, adică var. *integrifolia* WALLR.

**Centaurea stenolepis** A. KERN. Oester. bot. Zeit. XXII. (1872). 45. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 1257. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 347. PORCIUS, Diagnosele 145. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 306. HAYEK, Die Centaurea-Arten Österreich-Ungarns 161. Tafel XII. fig. 3. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 303 și Flora Dobrogei 213. GRECESCU, Conspect. fl. României 341 și Suplement 96. *Centaurea cirrhata* RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XV. t. 31. BOISS. fl. orient. III. 631. — Prin livezi, în fânețe și pășuni, prin rășișuri, poieni și pe marginea pădurilor, mai cu samă în regiunea câmpiilor, adesea. Călugăreni, Crucea-de-piatră, pe marginea pădurii «Uzun» și în pădurea Crucea-de-piatră, frecventă; Mănăstirea Pasărea, pe marginea pădurii «Cernica», lângă șoseaua ce duce la «Brănești» și pe marginea pădurii «Pasărea», abundentă; Mănăstirea Căldărușani, pe marginea pădurii «Moara-Săracă», frecventă. 4. Iulie—August.

**Centaurea Cyanus** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 911 și ed. 2. (1763). 1289. STURM, Deutschlands Flora Heft. 4. (1798). t. 13. DC. Prodr. VI. 578. KOCH, Syn. ed. 2. 472. LEDEB. fl. ross. II. 698. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 251. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XV. 22. t. 37. fig. I. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 380. BOISS. fl. orient. III. 634. FIEK, Fl. von Schlesien 246. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXX. 169. t. 3163. COSTE, Fl. Franc. II. 388. ROUY, Fl. Franc. IX. 145. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. XIV. 42. t. 26. GARCKE, III, Fl. von Deutschld. 746. NYMAN, Consp. 424. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 348. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 308. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. II. 139. HOFFMANN, Compositae, în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. 5. Abteilung pag. 330. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 303 și Flora Dobrogei 209. GRECESCU, Conspect. fl. României 341 și Suplement 96. *Cyanus arvensis* MOENCH. Meth. 561. *Jacea segetum* LAMK. Fl. franç. II. 54. — Vulg. Albastră, Albăstreă, Albăstriță, Corobațică, Dioc, Floarea-grăului, Floarea-paiului, Ghioc, Măturică, Sglăvoc, Vinețele. — Prin sămănăturile de pe câmp, pe locuri aride și pietroase, pe marginea drumurilor, adesea. Ciorogârla, pe marginea șoselei prin sămănături, frecventă; Măgurele, prin sămănături; Comana, prin sămănături; Chitila, pe marginea șoselei și prin sămănături, abundentă; Cățelu, pe lângă linia

fortului; Mănăstirea Cernica, prin sămănăturile de pe marginea șoselei și pe lângă pădurea «Cernica»; Mănăstirea Pasărea, pe marginea pădurii «Pustnicu», prin sămănăturile de pe marginea șoselei dintre «Cozieni» și «Pântelimon» și pe marginea pădurii «Pasărea», prin sămănături, abundentă; Mănăstirea Căldărușani, pe marginea drumului spre «Moara-Săracă». ☉. Maiu—Iulie.

**Centaurea spinulosa** ROCHEL. Pl. Banat. rar. (1828). 76. t. XXXVI. fig. 76. DC. Prodr. VI. 572. HEUFFEL, Enum. pl. Banat. Temes. 107. No. 1012. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XV. t. 44. fig. III. HAYEK, Die Centaurea-Arten Oesterreich-Ungarns. 37. t. II. fig. 8. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 349. GRECESCU, Conspect. fl. României 344. BRÂNDZĂ, Flora Dobrogei 211. *Centaurea Scabiosa* L.  $\delta$ . *spinulosa* KOCH, Syn. ed. 2. 473. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XV. pag. 26. *Centaurea Scabiosa* L.  $\beta$ . *spinulosa* BOISS. fl. orient. III. 656. *Centaurea Scabiosa* L.  $\delta$ . *spinulosa* ROCHEL. (pro specie) apud FIEK, Fl. von Schlesien 245. HALLIER, Fl. von Deutschld XXX. 174. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 304. *Centaurea Scabiosa* L. b. subspecia *spinulosa* ROCHEL. apud VELENOVSKY, Fl. Bulg. 323. — Vulg. Ciolobot, Sglăvoc. — Pe coline aride, în câmp pe lângă drumuri, prin rășișuri, poieni și pe marginea pădurilor, în fânețe sterile, adesea. Ciorogârla, pe marginea pădurii «Cotroceanca»; Pâslari-Pârliți, printre vii, frecventă; Călugăreni, Crucea-de-piatră», pe marginea pădurii «Uzun» și pe marginea pădurii «Crucea-de-piatră»; Comana, spre stația «Mihaiu-Bravul», pe marginea pădurii; Mănăstirea Pasărea, pe marginea pădurii «Pustnicu» și pe marginea pădurii «Pasărea»; Mănăstirea Căldărușani, pe marginea drumului spre «Moara-Săracă», pe lângă pădurea «Moara-Săracă» și pe marginea pădurii «Brânzeasca», abundentă. 4. Iulie — August.

**Centaurea orientalis** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 913 și ed. 2. (1763). 1291. DC. Prodr. VI. 587. LEDEB. fl. ross. II. 707. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XV. 38. t. 59. fig. I. BOISS. fl. orient III. 666. exclus. syn. BESSER. NYMAN, Consp. 428. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 350. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 323. PORCIUS, Diagnosele 148. HOFFMANN, Compositae în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. 5 Abteilung pag. 331. LINDEMANN, Fl. Cherson. I. 357. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 306 și Flora Dobrogei 212. GRECESCU, Conspect. fl. României 343 și Suplement 97. HAYEK, Die Centaurea-Arten Oesterreich-Ungarns 60. Tafel V. fig. 4. *Cyanus orientalis* BMGT. Enum. stirp. Transs. III. (1816). 78. — Pe coline nășipoase, prin fânețe sterile, pe marginea arăturilor prin tufișuri, adesea. Budeni, prin tufișurile de pe marginea arăturilor, frecventă pe marginea drumului spre Vârlam; Comana, pe marginea pădurii, frecventă. 4. Iunie—Iulie.

**Centaurea micrantha** GMELIN, Reise durch Russland, I. (1770). 135. t. XXIII. apud HAYEK, Die Centaurea Arten Oesterreich-Ungarns 92. Tafel VIII.

fig. 9. *Centaurea Biebersteinii* DC. apud SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 350. PORCIUS, Diagnozele 147. *Centaurea maculosa* LAMK. apud BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 305 și Flora Dobrogei 211. GRECESCU, Conspect. fl. României 346 și Suplement 97. — Prin fânețe sterile, pe dealuri aride, pe locuri năsi-poase și pietroase, lângă drumuri și pe marginea pădurilor, adesea. Ciorogârla, pe marginea pădurii «Cotroceanca»; Băcu, pe marginea pădurii «Ileana»; Calugăreni, Crucea-de-piatră, pe marginea pădurii «Uzun» și pe marginea pădurii «Crucea-de-piatră», frecventă; Gruiu, pe marginea șoselei București-Oltenița; Budești, pe marginea pădurii de lângă râul Argeș; Chitila, pe marginea pădurii; Băneasa lângă București, pe marginea șoselei; Mănăstirea Cernica, pe marginea șoselei; Mănăstirea Pasărea, pe marginea pădurii «Cernica» lângă șoseaua ce duce la «Brănești» și pe marginea pădurii «Pasărea», frecventă; Mănăstirea Căldărușani, pe marginea șoselei; Mănăstirea Țigănești, pe marginea șoselei dintre satul «Țigănești» și drumul spre «Ciolpani», frecventă ☉. sau 4. Iulie—Septembrie.

*Centaurea jurineaefolia* BOISS. Diagn. pl. nov. seria II. fasc. 3. (1856). 73. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 313. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 305 și Flora Dobrogei 215. GRECESCU, Conspect. fl. României 348 și Suplement 97. *Centaurea rutifolia* SIBTH. et SM. var. cnf. BOISS. fl. orient. III. 643 in notta. — Vulg. Măturele. — Pe câmpuri, coaste în locuri aride prin mărăcinișuri și tufișuri, prin rărișuri, poieni și pe marginea pădurilor în fânețe, adesea. Mihaiu-Bravul spre Comana, pe marginea pădurii; Mănăstirea Pasărea, pe marginea pădurii «Pasărea», frecventă; Mănăstirea Căldărușani, pe marginea pădurii «Brânzeasca» și prin poieni, frecventă. ☉. Iulie — August.

*Centaurea solstitialis* L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 917 și ed. 2. (1763). 1297. DC. Prodr. VI. 594. KOCH, Syn. ed. 2. 475. LEDEB. Fl. ross. II. 710. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 263. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XV. 41. t. 64. fig. I. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 382. BOISS. fl. orient. III. 685. FIEK, Fl. von Schlesien 246. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXX. 179. t. 3167. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 1256. COSTE, Fl. Franc. II. 396. ROUY, Fl. Franc. IX. 164. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. XIV. 25. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 748. HAYEK, Die *Centaurea*-Arten Oesterreich-Ungarns. 18. Tafel II. fig. 3. NYMAN, Consp. 430. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 350. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 325. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. II. 161. HOFFMANN, Compositae în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. 5. Abteilung pag. 331. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 306 și Flora Dobrogei 215. GRECESCU, Conspect. fl. României 348 și Suplement 98. *Calcitrapa solstitialis* LAMK., *Cyanus solstitialis* PRESL. *Leucantha cyanifolia* GRAY. — Vulg. Scaiu-galben, Pălămidă. — Prin locuri sterile, ruderales și inculte, pe marginea sămănăturilor și a drumurilor, pe coline aride, adesea. Calugăreni, Crucea-de-piatră, pe marginea pădurii

«Uzun»; Comana, pe marginea drumului; Gruiu, pe marginea șoselei București-Oltenița; Oltenița, pe marginea șoselei; Băneasa lângă București, pe marginea șoselei; Mănăstirea Pasărea, pe marginea pădurii «Pasărea»; Ștefănești spre Dascălu, pe marginea șoselei; Mănăstirea Țigănești, pe marginea șoselei dintre satul Țigănești și drumul la «Ciolpani», abundentă; Mănăstirea Snagov, pe marginea drumului. ☉. rar ☉. Iulie — Septemvrie.

**Centaurea Calcitrapa** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 917 și ed. 2. (1763). 1297. STURM, Deutschlands Flora Heft 4 (1798). t. 15. DC. Prodr. VI. 597. KOCH, Syn. ed. 2. 475. LEDEB. fl. ross. II. 711. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 261. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XV. 42. t. 67. fig. I. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 382. BOISS. fl. orient. III. 689. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXX. 182. t. 3168. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 1257. COSTE, Fl. Franc. II. 396. ROUY, Fl. Franc. IX. 166. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. XIV. 27. t. 28. GARCKE, III. Fl. von Deutschld 747. NYMAN, Consp. 431. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 350. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 325. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. II. 162. HOFFMANN, Compositae în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. 5 Abteilung pag. 331. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 306 și Flora Dobrogei 214. GRECESCU, Conspect. fl. României 349 și Suplement 98. HAYEK, Die Centaurea-Arten Oesterreich-Ungarns 11. Tafel I. fig. 3. *Calcitrapa stellata* LAMK., *Calcitrapa Hypophaestum* GAERTN. BMGT. Enum. stirp. Transs. III. (1816). 69 *Hypophaestum vulgare* GRAY. — Vulg. Ghimpe, Pasul-drochiei, Scaiu-ghimpos, Scaiete. — Prin locuri sterile, ruderales, pe câmpuri năsiptoase, pe marginea sămănăturilor și a drumurilor, adesea. Mănăstirea Caldărușani, pe marginea șoselei; Periș, lângă gară, pe marginea drumurilor, frecventă ☉. Iulie — Septemvrie.

**Centaurea iberica** TREV. în SPRENG. System. III. (1826). 406. DC. Prodr. VI. 597. LEDEB. fl. ross. II. 711. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XV. 43. t. 67. fig. II. BOISS. fl. orient. III. 690. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. XIV. 28. NYMAN, Consp. 431. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 351. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 326. HALÁCSY, Consp. Fl. Graec. II. 163. PORCIUS, Diagnozele 148. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 306; Contribuțiuni nouă la Flora României (1889). pag. 17. și Flora Dobrogei 214. GRECESCU, Conspect. fl. României 349. HAYEK, Die Centaurea-Arten Oesterreich-Ungarns, 13. Tafel I. fig. 4. *Calcitrapa iberica* TREV. apud SCHUR, Enum. pl. Transs. 409. — Pe coline aride, câmpuri năsiptoase, pe marginea drumurilor în locuri necultivate, adesea. Călugăreni, Crucea-de-piatră, pe marginea șoselei; Comana, spre Grădiște, pe marginea drumului; Oltenița, pe marginea șoselei și pe lângă pădurea de pe marginea Dunării, aproape de gura Argeșului, abundentă. ☉ Iulie — Septemvrie.

*Centaurea iberica* TREV. seamănă foarte mult cu congenera sa *Centaurea Calcitrapa* L., de care se deosebește numai prin capitulele mai mari și prin



achenele cu papus ; la *Centaurea Calcitrapa* L. achenele sunt fără papus. Din cauza acestei mari asemănări, trebuie să admitem că ambele aceste specii derivă din una și aceeași formă primordială.

**Carthamus lanatus** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 830 și ed. 2. (1763). 1163. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XV. 9. NEILR. fl. von Nieder-Oesterreich 376. BOISS. fl. orient III. 706. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 1264. ROUY, Fl. Franc. IX. 179. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. XIV. 30. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 745. NYMAN, Consp. 419. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 345. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 303. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. II. 167. HOFFMANN, Compositae în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil 5. Abteilung pag. 332. *Kentrophyllum lanatum* DC. et DUBY. Bot. Gall. I. (1828). 293. apud DC. Prodr. VI. 610. KOCH, Syn. ed. 2. 468. LEDEB. fl. ross. II. 714. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 265. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXX. 151. t. 3155. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 301 și Flora Dobrogei 216. GRECESCU, Conspect. fl. României 349 și Suplement 98. *Carduncellus lanatus* MORIS. apud RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XV. t. 15 fig. II. *Centaurea lanata* DC. Fl. Franc. IV. 102. *Hohenwartha gymnogyna* VEST. în Flora (1820). pag. 1. *Atractylis lanata* SCOP. Fl. Carn. ed. 2. II. (1772). 134. No. 1016.—Vulg. Pîntenoagă.— Pe câmpuri în locuri năsiptoase, pe coline aride, în tufișuri și pe marginea drumurilor, adesea. Băneasa lângă București, la capătul șoselei Kiselef pe coastele uscate de pe marginea Colentinei; frecvent; Chitila, pe marginea drumului, adesea; Călugăreni, Crucea-de-piatră, pe coastele dealurilor, pe marginea șoselei spre Giurgiu, pe lângă pădurea «Uzun» și pe lângă pădurea «Crucea-de-piatră», abundant. ☉. Iulie — August.

**Cichorium Intybus** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 813. și ed. 2. (1763). 1142. DC. Prodr. VII. sectio. 1. 84. KOCH, Syn. ed. 2. 478. LEDEB. fl. ross. II. 774. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 286. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 400. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XIX. 4. t. 6. fig. II. BOISS. fl. orient. III. 715. FIEK, Fl. von Schlesien 247. HALLIER, Fl. von. Deutschld. XXX. fig. 193. t. 3173. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 1266. COSTE, Fl. Franc. II. 409. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. XIV. 182. t. 30. ROUY, Fl. Franc. X. 41. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 749. NYMAN, Consp. 472. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 352. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 363. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. II. 177. HOFFMANN, Compositae în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. 5. Abteilung pag. 356. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 308 și Flora Dobrogei 188. GRECESCU, Conspect. fl. României 352. — Vulg. Cicoare, Cicoare-de-vară, Cicorie.— Prin locuri necultivate, pe câmpii, fânețe, pășuni, pe lângă drumuri și pe marginea pădurilor, adesea. Domnești, Ciutați în dumbravă; Cioarăra, pe marginea șoselei; Călugăreni, Crucea-de-piatră, pe marginea pădurii «Uzun» și pe marginea pădurii «Crucea-de-piatră», frecvent; Gruiu,

pe marginea șoselei spre Oltenița ; Oltenița, pe marginea șoselei portului ; Mănăstirea Căldărușani, pe marginea pădurii «Brânzeasca» ; Mănăstirea Țigănești, pe drumul dintre pădurea «Ciolpani» și pădurea «Tâncăbești». 4 . Iunie — Septembrie.

**Lapsana communis.** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 811 și ed. 2. (1763). 1141. DC. Prodr. VII. sectio 1. 76. KOCH, Syn. ed. 2. 477. LEDEB. fl. ross. II. 770. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 291. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 399. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XIX. 2. t. 2 fig. II. BOISS. fl. orient. III. 720. FIEK, Fl. von Schlesien 247. HALLIER, Fl. von Deutschld XXX. 187. t. 3170. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 1267. COSTE, Fl. Franc. II. 410. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. XIV. 177. t. 29. ROUY, Fl. Franc. X. 43. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 749. NYMAN, Consp. 474. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 351. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 364. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. II. 182. HOFFMANN, Compositae în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. 5 Abteilung pag. 357. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 308. și Flora Dobrogei 189. GRECESCU, Conspect. fl. României 351 și Supplement 98. — Vulg. Iarbă-de-sgaibă, Iarba-sgaibei, Salata-cânelui, Sgrăbunțică. — Prin locuri umbroase, pe lângă ziduri și garduri, prin tufișuri și păduri, adesea. Domnești, Ciutați în dumbravă ; Giorogârla, în pădurea «Cotroceanca» ; Călugăreni, Crucea-de-piatră, în pădurea «Uzun» și în pădurea «Crucea-de-piatră» ; Comana, în pădure ; Mănăstirea Pasărea, în pădurea «Pasărea», frecventă ; Mănăstirea Căldărușani, în pădurea «Brânzeasca» ; Mănăstirea Țigănești, în pădurea «Ciolpani», adesea. ☉. Iulie — August.

**Pieris hieracioides.** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 792 și ed. 2. (1763). 1115. DC. Prodr. VII. sectio 1. pag. 128. KOCH, Syn. ed. 2. 484. LEDEB. fl. ross. II. 798. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 303. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 404. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XIX. 11. t. 24. BOISS. fl. orient. III. 734. FIEK, Fl. von Schlesien 249. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXX. 212. t. 3182. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 1268. COSTE, Fl. Franc. II. 420. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. XIV. 87. t. 34. ROUY, Fl. Franc. X. 23. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 785. NYMAN, Consp. 466. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 354. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 359. HOFFMANN, Compositae în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. 5. Abteilung pag. 364. BRÂNDZĂ, Prodr. Fl. române 310 și Flora Dobrogei 193. GRECESCU, Conspect. fl. României 354 și Supplement 99. — Vulg. Iarbă-găii, Amăruță. — Prin livezi, în locuri necultivate, pe lângă drumuri, pe câmpuri, prin rășișuri, poieni și pe marginea pădurilor, în fânețe prin tufișuri, adesea. Giorogârla, pe marginea pădurii «Cotroceanca», frecvent ; Malul-Spart, în pădurea «Căscioceanca» ; Călugăreni, Crucea-de-piatră, pe marginea pădurii «Uzun» ; Mănăstirea Căldărușani, în pădurea «Brânzeasca», la marginea despre Gagu-Merișeasca, frecvent ;

Mănăstirea Țigănești, pe drumul dintre pădurea «Ciolpani» și pădurea «Tân-căbești, adesea. ☉. și 4. Iunie — Septembrie.

**Crepis rhoeadifolia.** M. BIEB. Fl. Taur. Cauc. II. (1808). 259. KOCH, Syn. ed. 2. 500. FIEK, Fl. von Schlesien 257. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 1270. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. XIV. 130. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 778. NYMAN, Consp. 458. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 362. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 333. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 319 și Flora Dobrogei 199. GRECESCU, Conspect. fl. României 361 și Suplement 101. *Barkhausia rhoeadifolia* M. BIEB. Fl. Taur. Cauc. III. (1819). 538. DC. Prodr. VII. sectio 1. pag. 158. LEDEB. fl. ross. II. 819. *Crepis foetida* L. γ. *hispida* BISHOFF apud RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XIX. 41. t. 83. fig. III. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXX. 301. ROUY, Fl. Franc. IX. 212. — Vulg. Barbalupului. — Pe locuri năsipose, pe câmpuri prin miriști, pe coline aride și pietroase, pe lângă locuințe și pe marginea drumurilor, adesea. București la Filaret, în câmp pe marginea drumului de fier; Băcu la Arcuda, pe lângă filtre; Măgurele, pe locurile năsipose de pe marginea Sabarului; Călugăreni, Crucea-de-piatră, pe marginea pădurii «Uzun»; Gruiu, pe marginea șoselei București spre Oltenița, frecvent; Băneasa, la capătul șoselei Kiselef, pe marginea Colentinei; Mănăstirea Cernica, pe marginea pădurii «Cernica», spre șoseaua ce duce la «Brănești»; Mănăstirea Căldărușani, pe marginea pădurii «Moara-Săracă»; Mănăstirea Țigănești, pe marginea pădurii «Ciolpani», abundent. ☉. Iunie — August.

**Crepis setosa** HALLER fil. în ROEM. Arch. I. 2. (1797). 1. KOCH, Syn. ed. 2. 502. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 331. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 421. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XIX. 42. t. 84. fig. I. BOISS. fl. orient. III. 853. FIEK, Fl. von Schlesien 257. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXX. 304. t. 3222. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 1270. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. XIV. 129. t. 52. fig. a. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 778. NYMAN, Consp. 459. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 362. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 334. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. II. 228. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 319. GRECESCU, Conspect. fl. României 361 și Suplement 101. *Crepis setosa* ROEM. apud COSTE, Fl. Franc. II. 442. *Barkhausia setosa* DC. Prodr. VII. sectio 1. pag. 155. LEDEB. fl. ross. II. 819. ROUY, Fl. Franc. IX. 214. *Crepis hispida* W. et KIT. Descr. et icon. pl. rar. Hung. I. (1802). 42. t. 43. — Vulg. Gălbenuși, Iarba-găinilor. — Pe câmpuri prin miriști, pe marginea drumurilor și pe lângă garduri, prin fânețe sterile în locuri năsipose, adesea. Măgurele lângă Sabar, pe marginea sămănăturilor; Cățelu, pe lângă linia forturilor. ☉. Iunie — Iulie.

**Crepis biennis** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 807 și ed. 2. (1763). 1136. DC. Prodr. VII. sectio 1. pag. 163. KOCH, Syn. ed. 2. 504. LEDEB. fl. ross. II.

823. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 337. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 422. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XIX. 43. t. 88. BOISS. fl. orient. III. 848. FIEK, Fl. von Schlesien 257. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXX. 316. t. 3228. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 1272. COSTE, Fl. Franc. II. 446. ROUY, Fl. Franc. IX. 229. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. XIV. 123. t. 54. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 776. NYMAN, Consp. 456. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 364. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 336. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. II. 223. HOFFMANN, Compositae în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. 5. Abteilung pag. 374. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 320. GRECESCU, Conspect. fl. României 362 și Suplement 101. *Hieracium bienne* KARSCH.— Prin fânețe și tufişuri umede, pe marginea pădurilor, pe câmpuri, livezi, coaste și pe lângă drumuri, adesea. Mănăstirea Țigănești, pe drumul dintre pădurea «Ciolpani» și pădurea «Tâncăbești». ☉. Iunie—August.

**Hieracium Pilosella** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 800 și ed. 2. (1763). 1125. STURM, Deutschlands Flora Heft 27. (1809). t. 14. KOCH, Syn. ed. 2. 509. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 430. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XIX. 52. t. 107. FIEK, Fl. von Schlesien 260. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXX. 346. t. 3241. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 1279. ROUY, Fl. Franc. IX. 236. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. XIV. 149. t. 56. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 751. NYMAN, Consp. 454. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 365. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 337. HOFFMANN, Compositae în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. 5. Abteilung pag. 379. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 321 și Flora Dobrogei 201. GRECESCU, Conspect. fl. României 364 și Suplement 102.— Vulg. Culeușul-vacii, Gâlbeioare, Hulteni-oală, Hultenioară, Iarba-ieretei, Opintie, Roscob, Urechea-șoarecelui, Urechea-șoarecului, Vulturică, Vulturoancă.— Prin pășuni uscate, prin rărișuri, poieni și pe marginea pădurilor, pe coline, de preferință în terenuri năsiptoase și pietroase, adesea. Ciorogârla, prin rărișurile din pădurea «Cotroceanca», frecvent; Tântava, în pădurea «Tântava»; Călugăreni, Crucea-de-piatră, pe marginea pădurii «Uzun»; Comana, pe marginea pădurii; Mănăstirea Cernica, în pădurea «Cernica» la margine, cam în dreptul șoselei ce duce la «Cozieni»; Mănăstirea Pasărea, în pădurea «Pasărea», abundant; Mănăstirea Căldărușani, pe marginea pădurii «Moara-Săracă», pe marginea pădurii «Brânzeasca» și în livadia «Pârîta, frecvent; Mănăstirea Țigănești, în pădurea «Ciolpani», frecvent. 4. Maiu — Septemvrie. Specie polimorfă, cu numeroase forme și varietăți.

**Hieracium Auricula** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 800 și ed. 2. (1763). 1126. DC. Prodr. VII. sectio 1. pag. 201. exclus. variet. KOCH, Syn. ed. 2. 511. LEDEB. fl. ross. II. 847. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 349. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 431. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XIX. 56. t. 114. fig.

II. BOISS. fl. orient. III. 861. FIEK, Fl. von Schlesien 261. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXX. 358. t. 3246. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 1283. COSTE, Fl. Franc. II. 459. ROUY, Fl. Franc. IX. 240. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. XIV. 150. t. 57. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 752. NYMAN, Consp. 453. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 366. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. II. 234. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 322 și Flora Dobrogei 201. GRECESCU, Conspect. fl. României 366 și Suplement 104. *Hieracium Auricula* LAMK. et DC. apud HOFFMANN, Compositae în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. 5 Abteilung pag. 379. *Hieracium dubium* SMITH. Fl. Brit. II. 828. *Hieracium dubium* L. apud STURM, Deutschlds Flora Heft 37. (1814). t. 7.—Prin fânețe și pășuni uscate, în livezi, poieni și pe marginea pădurilor prin tufişuri. Mănăstirea Țigănești, în pădurea «Ciolpani», destul de frecvent. 4. Iulie — Septembrie.

*Hieracium Auricula* L. este o plantă nouă pentru Flora regiunii Bucureștilor, căci n'a mai fost citată până acum de nimeni din această regiune.

*Hieracium Bauhini* SCHULT. Observ. Bot. (1809). 164. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 368. PORCIUS, Diagnozele 177. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 340. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. II. 236. GRECESCU, Conspect. fl. României 368 și Suplement 105. *Hieracium Bauhini* BESS. Prim. Fl. Galiz. II. (1809). 149. apud BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 1284. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XIX. t. 122. *Hieracium praealtum* VILL. β. *Bauhini* KOCH, Syn. ed. 2. 513. FIEK, Fl. von Schlesien 262. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXX. 365. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 323. *Hieracium magyaticum* NAEG. et PETER. Hier. I. 566.—Prin livezi și pășuni, pe coastele dealurilor, în rărișuri, poieni și pe marginea pădurilor, adesea. Ciorogârla, pe marginea pădurii «Cotrocenca», prin lăstari, abundent; Malul-Spart, în pădurea «Căscioareanca», prin rărișuri și poieni; Comana, pe marginea pădurii, frecvent; Mănăstirea Cernica, în pădurea «Cernica» la margine, cam în dreptul șoselei ce duce la «Cozieni», frecvent. 4. Maiu—Iulie.

*Hieracium pannonicum* (*Hieracium magyaticum-echioides*) NAEG. et PETER. Hier. I. (1885) 749. PORCIUS, Diagnozele 181. GRECESCU. Conspect. fl. României 369 și Suplement 105. *Hieracium auriculoides* LÁNG. apud BECK. Fl. von Nieder-Oesterreich 1284.—Prin livezi și pășuni uscate, prin rărișuri, poieni și pe marginea pădurilor, adesea. Mănăstirea Cernica, în pădurea «Cernica», frecvent; Mănăstirea Pasărea, în pădurea «Pasărea», adesea; Mănăstirea Căldărușani, pe marginea pădurii spre livadia Pârîta, frecvent; Mănăstirea Țigănești, în pădurea «Ciolpani». 4. Maiu — Iunie.

*Hieracium cymosum* L. Sp. pl. ed. 2. (1763). 1126. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 352. FIEK, Fl. von Schlesien 263. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 1281. COSTE, Fl. Franc. II. 460. ROUY, Fl. Franc. IX. 245. KRAUSE în LUTZ, Sturms

Fl. von Deutschld. XIV. 153. t. 61. GARCKE, III Fl. von Deutschld. 755. NYMAN, Consp. 452. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 369. HALÁCSY Conspect. Fl. Graec. II. 234. HOFFMANN, Compositae în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. 5 Abteilung pag. 379. BRANDZĂ, Prodr. fl. române 323. GRECESCU, Conspect. fl. României 369 și Suplement 105. *Hieracium Nestleri* VILL. apud KOCH, Syn. ed. 2. 514. LEDEB. fl. ross. II. 849. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XIX. 60. t. 125. fig. I.—Prin livezi, în fânețele uscate de pe coline, prin rărișuri, poieni și pe marginea pădurilor, adesea. Comana, pe marginea pădurii, frecvent. 4. Maiu — Iulie.

**Hieracium boreale** FRIES. Novit. ed. 2. (1828). 161. apud. KOCH, Syn. ed. 2. 529. LEDEB. fl. ross. II. 854. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 385. RCHB. Icon. fl. germ. et-helv. XIX. 85. t. 180—182. FIEK, Fl. von Schlesien 282. HAL-LIER, Fl. von Deutschld. XXX. 420. t. 3281. COSTE, Fl. Franc. II. 478. ROUY, Fl. Franc. IX. 383. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld XIV. 144. NYMAN, Consp. 438. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 376. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 353. HOFFMANN, Compositae-Hieracium, PETER în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. 5 Abteilung pag. 385. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 325. GRECESCU, Conspect. fl. României 374 și Suplement 107. *Hieracium silvestre* TAUSCH. apud GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 772. *Hieracium commutatum* BECKER., *Hieracium sabaudum* L.  $\beta$ . *silvestre* TAUSCH. apud BECK. Fl. von Nieder-Oesterreich 1308.—Prin păduri în tufișuri, adesea. Roșu, în pădurea Roșu; Mănăstirea Pasărea, pe marginea pădurii «Pustnicu» și în pădurea «Pasărea», frecvent; Mănăstirea Căldărușani, în pădurea «Brânzeasca», frecvent; Mănăstirea Țigănești, în pădurea Ciolpani. 4. Iulie — August.

$\beta$ . **chlorocephalum** UECHTR. apud. FIEK, Fl. von Schlesien 283. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 376.—Squamele capitulelor chiar uscate sunt verzi, cele interne sunt adesea la vârf roșii-brunii. — Ciorogârla, în pădurea «Cotroceanca».

**Hypochoeris maculata** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 810 și ed. 2. (1763). 1140. KOCH, Syn. ed. 2. 491. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 294. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 411. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XIX. 21. t. 45. fig. I. BOISS. fl. orient. III. 784. HALLIER, Fl. von. Deutschld XXX. 246. t. 3198. BECK. Fl. von Nieder-Oesterreich 1310. COSTE, Fl. Franc. II. 414. ROUY, Fl. Franc. X. 38. GARCKE, III Fl. von Deutschld. 785. NYMAN, Consp. 470. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 358. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 361. HOFFMANN, Compositae în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. 5 Abteilung pag. 362. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 314 și Flora Dobrogei 189. GRECESCU, Conspect. fl. României 350 și Suplement 98. *Achyrophorus maculatus* SCOP. Fl. Carn. ed. 2. II. (1772). 116. DC. Prodr. VII. sectio 1. pag. 93. LEDEB. fl. ross. II. 776. FIEK, Fl. von Schlesien 251. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl.

von Deutschld. XIV. 80.— Pe coline aride și pietroase, în livezi, prin rărișuri, poieni și pe marginea pădurilor, adesea. Mănăstirea Pasărea, în pădurea «Pustnicu» și în pădurea «Pasărea», frecvent. 4. Maiu—Iunie.

**Leontodon autumnale** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 798 și ed. 2. (1763). 1123. BOISS. fl. orient. III. 729. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXX. 198. t. 3175.

**Leontodon autumnalis** L. apud KOCH, Syn. ed. 2. 480. LEDEB. fl. ross. II. 778. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 297. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 402. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XIX. 8. t. 15. fig. II. FIEK, Fl. von Schlesien 248. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 1311. COSTE, Fl. Franc. II. 417. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. XIV. 82. t. 33. ROUY, Fl. Franc. X. 27. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 786. NYMAN, Consp. 469. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 352. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 360. HOFFMANN, Compositae în ENGLER, Natürl. Pflanzenfamilien IV. Teil. 5. Abteilung, pag. 363. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 309. GRECESCU, Conspect. fl. României 352 și Supplement 98. *Apargia autumnalis* HOFFM., *Hedypnois autumnalis* HUDS., *Oporina autumnalis* DON.— Prin livezi în fânețe și pășuni, pe marginea pădurilor, pe lângă drumuri, în locuri deschise, aride, adesea până sus în regiunea subalpină. București, pe marginea Dâmboviței spre «Moara-lui-Ciurel», frecvent. 4. Iulie—Octombrie.

**Leontodon hispidus** L. apud RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XIX. 9. t. 17. fig. I și t. 18. FIEK, Fl. von Schlesien 248. BECK, Fl. von Nied.-Oester. 1312. COSTE, Fl. Franc. II. 418. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. XIV. 83. GARCKE. Ill. Fl. von Deutschld. 787. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 353. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. II. 185. HOFFMANN, Compositae în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. 5. Abteilung pag. 363. GRECESCU, Conspect. fl. României 353 și Supplement 99. *Leontodon hispidum* α. L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 799 și ed. 2. (1763). 1124. *Leontodon hastilis* L. apud KOCH, Syn. ed. 2. 481. LEDEB. fl. ross. II. 780. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXX. 202. t. 3177. *Leontodon proteiformis*. VILL. apud GREN. GODR. Fl. Franc. II. 299. ROUY, Fl. Franc. X. 30. *Hedypnois hispida* SMITH., *Apargia hispida* HOST.— Vulg. Potcapu-călugărilor. — Prin livezi, în pășuni și fânețe, pe locuri pietroase până sus în regiunea alpină, adesea. București, la «Moara-lui-Ciurel» în lunca Dâmboviței; Ciorogârla, în pădurea «Cotrocenca» prin poieni și rărișuri, frecvent; Băcu, pe marginea pădurii «Ileana»; Domnești, Ciutați în dumbravă; Călugăreni, Crucea-de-piatră, pe marginea păduri «Uzun»; Comana, pe marginea pădurii; Chitila, pe marginea pădurii, frecvent; Mănăstirea Pasărea, în pădurea «Pasărea»; Mănăstirea Căldărușani, pe marginea pădurii «Moara-Săraacă» și pe marginea pădurii «Brânzeasa», frecvent; Mănăstirea Țigănești, pe marginea pădurii «Ciolpani», frecvent. 4. Iulie—August.

**Taraxacum serotinum.** POIR. în LAMK. Encycl. méth. Suppl. IV. (1816). 420 și în Sadl. Fl. Pest. II. (1826). 243. DC. Prodr. VII. sectio 1. pag. 147. LEDEB. fl. ross. II. 811. KOCH, Syn. ed. 2. 493. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 412. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XIX. 24 t. 51. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXX. 258. t. 3202. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 1314. COSTE Fl. Franc. II. 430. NYMAN, Consp. 436. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 332. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 314; Contribuțiuni nouă la Flora României, (1889). pag. 17 și Flora Dobrogei 195. GRECESCU, Conspect. fl. României 356. și Suplement 100. *Taraxacum serotinum* POIR. ca subsp. dela *Taraxacum officinale* WEB. apud ROUY, Fl. Franc. IX. 191. *Taraxacum officinale* W. et KIT. sub *Leontodonte*, apud BOISS. Fl. orient. III. 786. SIMONKAI. Enum. Fl. Transs. 358. *Leontodon serotinum* W. et KIT. Descr. et icon. pl. rar. Hung. II. (1805). 119. t. 114.—Pe locuri uscate năsipose, pe colinele calcaroase și năsipose, în pășuni, nu tocmai adesea. Călugăreni, Crucea-de-piatră, pe marginea pădurii «Uzun» și pe coastele dealurilor, frecvent; Comana, la marginea pădurii, pe coaste, frecvent. 4. Iulie — Septemvrie.

**Taraxacum officinale** WIGG. Prim. Fl. Holst. (1780). 56. KOCH, Syn. ed. 2. 492. LEDEB. fl. ross. II. 812. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 316. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 411. RCHB. Icon. Fl. germ. et helv. XIX. 25. t. 53, 54, și 55. BOISS. fl. orient. III. 787. FIEK, Fl. von Schlesien 252. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXX. 253 t. 3201. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 1315. COSTE, Fl. Franc. II. 428. ROUY, Fl. Franc. IX. 185. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 783. NYMAN, Consp. 437. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 358. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 331. HALÁCSY, Consp. Fl. Graec. II. 201. HOFFMANN, Compositae în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. 5 Abteilung pag. 370. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 314 și Flora Dobrogei 194. GRECESCU, Conspect. fl. României 357. și Suplement 100. *Taraxacum vulgare* SCHRANK. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. XIV. 161. t. 41. *Taraxacum dens leonis* DESF., *Leontodon Taraxacum* L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 798. și ed. 2. (1763). 1122.  $\alpha$ . *Hedypnois Taraxacum* SCOP. Fl. Carn. ed. II. (1772). 99. — Vulg. Curugăinii, Păpădeă, Păpădie, Papalungă, Părăsita-găinilor. — Prin fânețe, pășuni, locuri cultivate și inculte, grădini, pe lângă locuințe, prin dărâmături, adesea. Ciorogârla, pe marginea pădurii «Cotroceanca»; Călugăreni, în pădurea «Dadilov»; Chitila, pe marginea pădurii spre baltă; Ciocănești, în pădurea «Popeasca» și în pădurea «Ciocănești», frecvent; Mănăstirea Pasărea, în pădurea «Pustnicu»; Căciulați, în pădurea «Cort» 4. Aprilie — Septemvrie. Variază.

**Chondrilla juncea** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 796 și ed. 2. (1763). 1120. DC. Prodr. VII. sectio 1. pag. 142. KOCH, Syn. ed. 2. 493. LEDEB. fl. ross. II. 808. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 314. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 413.



RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XIX. 23. t. 49. și t. 50. fig. II. BOISS. fl. orient. III. 792. FIEK, Fl. von Schlesien 253. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXX. 260. t. 3203. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 1316. COSTE, Fl. Franc. II. 427. ROUY, Fl. Franc. IX. 183. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. XIV. 158. t. 42. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 784. NYMAN, Consp. 436. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 359. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 331. HALÁCSY, Conspect Fl. Graec. II. 204. HOFFMANN, Compositae în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. 5. Abteilung pag. 370. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române. 315. și Flora Dobrogei 194. GRECESCU, Conspect. fl. României 358 și Supplement 100. — Vulg. Amețeala-oilor, Răsfug. — Prin locuri inculte, năsipose, pe lângă drumuri, pe câmp, în locuri aride, pe coline pietroase și pe marginea pădurilor, adesea. Călugăreni, Crucea-de-piatră, pe marginea pădurii «Uzun», pe coaste, frecvent; Comana spre Grădiște, pe marginea drumului de fier; Mihaiu Bravul spre Comana, pe coastele uscate de pe marginea drumului de fier; Cățelu, pe linia forturilor; Mănăstirea Căldărușani, pe marginea pădurii «Moara-Săracă»; Mănăstirea Țigănești, pe marginea pădurii «Ciolpani». ☺ și 4. Iulie — August.

*Lactuca muralis* FRESEN. Taschenb. (1832). 484 apud KOCH, Syn. ed. 2. 496. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 321. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXX. 278. t. 3211. COSTE, Fl. Franc. II. 431. NYMAN, Consp. 435. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 329. HOFFMANN, Compositae în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. 5. Abteilung pag. 372. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 317 și Flora Dobrogei 195. GRECESCU, Conspect. fl. României 359 și Supplement 100. *Lactuca muralis* LESSING. apud FIEK, Fl. von Schlesien 255. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschland 781. *Lactuca muralis* E. MEY. apud ROUY, Fl. Franc. IX. 195. *Lactuca muralis* DC. Prodr. VII. sectio 1. pag. 139. LEDEB. Fl. ross. II. 807. *Lactuca muralis* GAERTN. Fruct. II. t. 158. fig. 5 apud NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 415. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 1319. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. XIV. 104. fig. 3 dela pag. 105. *Lactuca muralis* L. sub *Prenanthe* apud BOISS. fl. orient. III. 817. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 360. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. II. 213. *Prenanthes muralis* L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 797. și ed. 2. (1763). 1121. *Chondrilla muralis* LAMK. Encycl. II. 78. *Mycelis angulosa* CASS. *Mycelis muralis* RCHB. Fl. germ. 272. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XIX. 31. t. 66. *Cicerbita muralis* WALLR. *Phoenixopus muralis* KOCH, Syn. ed. 1. 430. — Vulg. Crestățeà, Susaiu-de-pădure, Susaiu-pădureț, Susaiu-săibatic, Tâlhăreà. — Prin păduri umbroase, adesea. Comana, în pădure; Mănăstirea Cernica, în pădurea «Cernica»; Mănăstirea Țigănești, în pădurea «Ciolpani». 4. Iulie — August.

*Lactuca muralis* FRESEN. este nouă pentru Flora regiunii Bucureștilor, căci n'a mai fost citată până acuma de nimeni din această regiune.

**Lactuca Chaixii** VILL. Dauph. III. (1779). 154. t. 32 apud DC. Prodr. VII. sectio 1. pag. 138. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 320. COSTE, Fl. Franc. II. 432. ROUY, Fl. Franc. IX. 194. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 360. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. II. 209. GRECESCU, Conspect. fl. României 359. *Lactuca sagittata* w. et KIT. Descr. et icon. pl. rar. Hung. I. (1802). 1. t. 1. KOCH, Syn. ed. 2. 496. LEDEB. fl. ross. II. 804. BOISS. fl. orient. III. 807. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXX. t. 3212. II. NYMAN, Consp. 435. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 329. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 317. *Lactuca quercina*  $\beta$ . *integrifolia* BISCH. apud RCHB. Icon fl. germ. et helv. XIX. 32. t. 69. fig. II. *Lactuca quercina* L. b. *sagittata* w. et KIT. apud GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 781. — Vulg. Crestățeă, Susaiu, Tâlhăreă. — Prin păduri și tufișuri. Comana, prin tufișuri în pădure. ☉. Iulie — August.

**Lactuca saligna** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 796 și ed. 2. (1763). 1119. DC. Prodr. VII. sectio 1. pag. 136. KOCH, Syn. ed. 2. 495. LEDEB. fl. ross. II. 804. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 319. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 416. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XIX. 33. t. 69. fig. I. BOISS. Fl. orient. III. 810. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXX. 269. t. 3207. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 1320. COSTE, Fl. Franc. II. 431. ROUY, Fl. Franc. IX. 197. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. XIV. 110. t. 46. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 781. NYMAN, Consp. 435. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 360. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 329. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. II. 211. HOFFMANN, Compositae în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. 5. Abteilung pag. 371. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 316 și Flora Dobrogei 196. GRECESCU, Conspect. fl. României 359 și Suplement 101. — Prin locuri inculte, pe câmpuri, grâne, miriști, pe lângă garduri și drumuri, pe locuri năsiptoase și pietroase, prin vie, pe coastele dealurilor și pe marginea pădurilor, adesea. Ciorogârla, pe marginea pădurii «Cotroceanca»; Călugăreni, Crucea-de-piatră, pe marginea pădurii «Uzun» și pe marginea șoselei; Mănăstirea «Pasărea», pe marginea pădurii «Pasărea»; Ștefănești spre Dascălu, pe marginea șoselei. ☉. Iulie — August.

**Lactuca Scariola** L. Sp. pl. ed. 2. (1763). 1119. DC. Prodr. VII. sectio 1. pag. 137. KOCH, Syn. ed. 2. 495. LEDEB. fl. ross. II. 805. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 319. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XIX. 33. t. 70. fig. I. și II. FIEK, Fl. von Schlesien 254. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXX. 271. t. 3208. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 1320. COSTE, Fl. Franc. II. 432. ROUY, Fl. Franc. IX. 198. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. XIV. 108. t. 45. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 780. NYMAN, Consp. 435. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 360. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 329. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. II. 210. HOFFMANN, Compositae în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. 5. Abteilung pag. 371. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 316 și Flora Dobrogei

196. GECESCU, Conspect. fl. României 359. *Lactuca Scariola* MORIS. apud NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 416. *Lactuca verticalis* GATER.— Prin locuri inculte și pietroase, pe coline aride, pe lângă garduri, ziduri vechi, pe lângă arături, prin miriști, pe marginea drumurilor, pe lângă păduri, adesea. Cio-rogârla, pe marginea pădurii «Cotroceanca»; Gruiu, pe marginea șoselei București spre Oltenița; Oltenița, pe marginea șoselei portului; Mănăstirea Păsărea, pe marginea pădurii «Cernica», lângă șoseaua ce duce la Brănești și pe lângă pădurea «Pasărea». ☉. Iulie — August.

***Sonchus oleraceus***. L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 794 și ed. 2. (1763). 1116. variet.  $\alpha$ . și  $\beta$ . KOCH, Syn. ed. 2. 497. LEDEB. fl. ross. II. 833. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 324. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 417. BOISS. fl. orient. III. 795. FIEK, Fl. von Schlesien 255. HALLIER, Fl. von Deutschld XXX. 290. t. 3216. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 1321. COSTE, Fl. Franc. II. 435. ROUY, Fl. Franc. IX. 204. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. XIV. 113. t. 49. NYMAN, Consp. 434. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 327. HALÁCSY, Consp. Fl. Graec. II. 206. HOFFMANN, Compositae în ENGLR, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. 5 Abteilung pag. 371. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 318 și Flora Dobrogei 197. GRECESCU, Conspect. fl. României 360. *Sonchus oleraceus* WALLR. Sched. crit. (1822). 431. apud RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XIX. 28 t. 59. fig. I. *Sonchus laevis* L. pro variet. *S. oleracei* apud SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 361. *Sonchus ciliatus* LAMK. Fl. franc. II. (1778). 87. DC. Prodr. VII. sectio 1. pag. 185. *Sonchus laevis* VILL. Hist. pl. Dauph. III. (1789). 158. *Hieracium oleraceum* SCOP. Fl. Carn. ed. 2. II. (1778). 110. No. 975. — Vulg. Susai u, Susa n. — Prin locuri cultivate și necultivate, prin vii, grădini, prin arături, pe locuri sterile pietroase și năsipose, pe lângă drumuri, adesea. Oltenița, în pădurea de pe marginea Dunărei, prin năsip aproape de gura Argeșului. ☉. Iunie — Septembrie.

***Sonchus asper*** VILL. Hist. pl. Dauph. III. (1789). 158. KOCH, Syn. ed. 2. 497. LEDEB. fl. ross. II. 834. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 324. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 418. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XIX. 28. t. 59. fig. II. și t. 60. BOISS. fl. orient. III. 796. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXX. 293. t. 3217. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 327. HOFFMANN, Compositae în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. 5. Abteilung pag. 371. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române. 318 și Flora Dobrogei 197. GRECESCU, Conspect. fl. României 360. *Sonchus asper* M. BIEB. Fl. Taur. Cauc. III. (1819). 526. *Sonchus asper* L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 794 și ed. 2. (1763). 1117. ca varietate dela *Sonchus oleraceus*. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 361. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. II. 207. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 1321. *Sonchus asper* HILL. apud ROUY, Fl. Franc. IX. 203. *Sonchus asper* ALL. apud FIEK, Fl. von Schlesien 255. COSTE, Fl. Franc. II. 436. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. XIV. 113

t. 50. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 779. NYMAN, Consp. 434. *Sonchus fallax* WALLR.—Vulg. Susaiu, Susan.—Prin locuri cultivate și necultivate, prin grădini, vii, pe arături, pe locuri sterile năsiptoase și pietroase, pe marginea drumurilor, pe lângă păduri, adesea. Domnești, Ciutași, pe marginea drumului spre dumbravă, frecvent; Mănăstirea Țigănești, pe drumul dintre pădurea «Ciolpani» și pădurea «Tâncăbești». ☉. Iunie — Septembrie.

*Sonchus arvensis* L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 793 și ed. 2 (1763). 1116. DC. Prodr. VII. sectio 1. pag. 187. KOCH, Syn. ed. 2. 498. LEDEB. fl. ross. II. 835. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 326. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 418. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XIX. 29. t. 61. fig. 1. BOISS. fl. orient. III. 798. FIEK, Fl. von Schlesien 255. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXX. 295. t. 3218. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 1322. COSTE, Fl. Franc. II. 437. KRAUSE în LUTZ, Sturms. Fl. von Deutschld. XIV. 112. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 779. NYMAN, Consp. 433. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 361. VLENOVSKY, Fl. Bulg. 328. HOFFMANN, Compositae în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. 5. Abteilung. 371. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 318 și Flora Dobrogei 197. GRESCU, Conspect. fl. României 360 și Suplement 101. *Sonchus vulgaris* ROUY subspecies *S. arvensis* L. apud ROUY, Fl. Franc. IX. 205. *Hieracium arvense* SCOP. Fl. Carn. ed. 2. II. (1772). 110. No. 974. — Vulg. Iarba-îepurilor, Susaiu, Susan, Tâlhăreă. — Prin sămănături, pe marginea câmpurilor, prin vii și tușuri, prin livezi și locuri umede, pe lângă drumuri, adesea. Măgurele, pe locurile umede de pe marginea Sabarului, frecvent; Budești, în pădurea de pe marginea râului Argeș; Oltenița, în pădurea de pe marginea Dunării, aproape de gura Argeșului; Chitila, pe marginea pădurii; Mănăstirea Țigănești, pe marginea pădurii «Ciolpani» și pe drumul dintre pădurea «Ciolpani» și pădurea «Tâncăbești»; Mănăstirea Snagov, pe insulă, în dreptul cătunului Fundu, pe lângă zidurile mănăstirii, frecvent. 4. Iulie — August.

β. *uliginosus* M. BIEB. apud. FIEK. Fl. von Schlesien 256. GRESCU, Conspect. fl. României 360 și Suplement 101. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 361. *Sonchus uliginosus* M. BIEB. Fl. Taur. Cauc. II. (1808). 238 și III. (1819) 525. DC. Prodr. VII. sectio 1. pag. 186. LEDEB. fl. ross. II. 834. NYMAN, Consp. 433. VLENOVSKY, Fl. Bulg. 328. *Sonchus glaber* SCHULT., *Sonchus intermedius* TREV. *Sonchus arvensis* L. γ. *laevipes* KOCH, Syn. ed. 2. 498. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XIX. pag. 29. t. 61. fig. II. BOISS. fl. orient. III. 798. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 326. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXX. 296. ROUY, l. c. BRÂNDZĂ, Flora Dobrogei 198. — Măgurele, pe locurile umede de pe marginea Sabarului, împreună cu forma tipică; Chitila, pe marginea pădurii; Mănăstirea Țigănești, pe marginea lacului «Bălteni», frecvent și pe lo-

curile umede de pe drumul dintre pădurea «Ciolpani» și pădurea «Tâncăbești», împreună cu forma tipică.

**Tragopogon pratense** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). și ed. 2. (1763). 1109. DC. Prodr. VII. sectio 1. pag. 113. BOISS. fl. orient. III. 747. NYMAN, Consp. 463. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 356. BRÂNDZĂ, Prodr. Fl. române 311. *Tragopogon pratensis* L. apud KOCH, Syn. ed. 2. 486. LEDEB. fl. ross. II. 785. GREN, GODR. Fl. Franc. II. 310. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 406. RCHB. Icon. fl. germ. et. helv. XIX. 18. t. 38. FIEK, Fl. von Schlesien 250. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXX. 218. t. 3185. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 1323. COSTE, Fl. Franc. II. 425. ROUY, Fl. Franc. X. 2. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 790. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. II. 194. HOFFMANN, Compositae în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. 5 Abteilung pag. 365. BRÂNDZĂ, Flora Dobrogei 190. GRECESCU, Conspect. fl. României 354. — Vulg. Barba-caprei, Țâța-caprei. — Prin livezi, în poieni, rărișuri și pe marginea pădurilor, pe câmpuri și pe marginea drumurilor, adesea. Comana, pe marginea pădurii; Cățelu, pe linia forturilor; Mănăstirea Căldărușani, în pădurea «Brânzeasca» prin rărișuri, poieni și pe marginea pădurii, frecvent și în livadia «Pârîta»; Mănăstirea Țigănești, pe drumul dintre pădurile «Ciolpani» și «Tâncăbești» și pe marginea pădurii «Ciolpani» în grădina mănăstirii. ☉. Maiu — August.

β. **tortilis** MEY. KOCH, Syn. ed. 2. 486. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XIX. 18. t. 38. fig. II. b. GRECESCU, Conspect. fl. României 354. — Mănăstirea Cernica, în pădurea «Cernica», la margine cam în dreptul șoselei ce duce la «Cozieni».

**Tragopogon orientale** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 789 și ed. 2. (1763). 1109. BOISS. fl. orient. III. 747. NYMAN, Consp. 463. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 311. *Tragopogon orientalis* L. apud KOCH, Syn. ed. 2. 486. LEDEB. fl. ross. II. 786. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 311. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XIX. 18. t. 39. fig. I. FIEK, Fl. von Schlesien 250. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXX. 220. t. 3186. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 354. HOFFMANN, Compositae în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. 5 Abteilung, pag. 365. BRÂNDZĂ, Flora Dobrogei 190. GRECESCU, Conspect. fl. României 354. *Tragopogon orientalis* L. ca subspecie dela *T. pratensis* L. apud ROUY, Fl. Franc. X. 4. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 356. *Tragopogon pratensis* L. α. *orientalis* L. apud BECK. Fl. von Nieder-Oesterreich 1323. *Tragopogon pratensis* L. β. *orientalis* L. apud HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. II. 194. *Tragopogon pratensis* L. c. *orientalis* L. apud GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 790. — Vulg. Barba-caprei, Țâța-caprei. — Prin livezi, în rărișuri, poieni și pe marginea pădurilor, pe câmpuri, pe lângă drumuri, adesea împreună cu specia precedentă. Ciorogârla, în pădurea «Cotroceanca», în poieni și ră-

rișuri frecvent; Călugăreni, Crucea-de-piatră, pe marginea pădurii «Uzun»; Mănăstirea Căldărușani, pe marginea pădurii «Moara-Săracă». ☉. Maiu—August.

NEILREICH în Flora von Nieder-Oesterreich pag. 406 zice, cu drept cuvânt, că *Tragopogon orientalis* L. este o specie dubioasă.

**Tragopogon major** JACQ Fl. austr. I. 19. t. 29. KOCH, Syn. ed. 2. 485. LEDEB. fl. ross. II. 784. GREIN. GODR. Fl. Franc. II. 312. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 406. RCHB. Icon. fl. germ. et. helv. XIX. 18. t. 37. fig. II. și III. FIEK, Fl. von Schlesien 249. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXX. 216. t. 3184. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 1323. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. XIV. 96. t. 36. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 791. ROUY, Fl. Franc. X. 5. HOFFMANN, Compositae în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. 5. Abteilung, pag. 365. BRÂNDZĂ, Flora Dobrogei 190. GRECESCU, Conspect. fl. României 354. *Tragopogon majus* JACQ. apud DC. Prodr. VII. sectio 1. pag. 112. BOISS. Fl. orient. III. 747. NYMAN Consp. 463. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 356. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. II. 195. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 311. — Vulg. Barba-caprei, Floare-de-câmp-galbenă, Salată-de-iarnă, Țâța-caprei. — Prin fânțe sterile, coline aride năsipose, pe marginea pădurilor, de preferință în teren calcaros. Comana, pe marginea pădurii. ☉. Maiu—Iulie.

var. **campestris** BESS. *Tragopogon campestris* BESS. Enum. (1822). 84. DC. Prodr. VII. sectio 1. pag. 114. LEDEB. fl. ross. II. 784. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 355. VELENOVSKY. Fl. Bulg. 356. GRECESCU, Conspect. fl. României 355. *Tragopogon majus* JACQ. β. *stenophyllum* BOISS. fl. orient. III. 747. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 311. — Călugăreni, Crucea-de-piatră, pe marginea pădurii «Uzun»; Comana, pe marginea pădurii; Mănăstirea Cernica, în pădurea «Cernica», la margine cam în dreptul șoselei ce duce la «Cozieni».

**Tragopogon porrifolium** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 789 și ed. 2. (1763). 1110. DC. Prodr. VII. sectio 1. pag. 113. BOISS. fl. orient. III. 745. NYMAN, Consp. 462. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 355. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 311. *Tragopogon porrifolius* L. apud KOCH, Syn. ed. 2. 485. LEDEB. fl. ross. II. 785. GREIN. GODR. Fl. Franc. II. 312. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 406. RCHB. Icon. fl. germ. et. helv. XIX. 17. t. 36. fig. II. și III. FIEK, Fl. von Schlesien 249. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXX. 214. t. 3183. COSTE, Fl. Franc. II. 425. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. XIV. 96. t. 35. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 791. ROUY, Fl. Franc. X. 6. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. II. 192. HOFFMANN, Compositae în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. 5. Abteilung pag. 365. — Prin livezi, în rărișuri, poieni și pe marginea pădurilor, rar. Mănăstirea Cernica, în pădurea «Cernica» prin rărișuri la margine, cam în dreptul șoselei ce duce la Mănăstirea Pasărea prin Cozieni, rar. ☉. Maiu—Iulie.

*Tragopogon porrifolium* L. este o plantă foarte rară, căci până acum eră cunoscută la noi numai din Moldova inferioară; prin urmare constatarea acestei interesante plante în Flora regiunii Bucureștilor merită o deosebită atențiune.

**Scorzonera laciniata** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 791 și ed. 2. (1763). 1114. BOISS. fl. orient. III. 757. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 1325. GARCKE, III Fl. von Deutschld. 790. ROUY, Fl. Franc. X. 16. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 358. HOFFMANN, Compositae în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. 5. Abteilung, pag. 365. *Scorzonera octangularis* WILLD., *Podospermum laciniatum* DC. Fl. franç. IV. (1805). 62. KOCH, Syn. ed. 2. 489. LEDEB. fl. ross. II. 782. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 309. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 410. RCHB. Icon. fl. germ. et. helv. XIX. 16. t. 35. fig. I. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXX. 238. t. 3195. COSTE, Fl. Franc. II. 424. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. XIV. 91. t. 39. fig. 1. NYMAN, Consp. 465. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 313 și Contribuțiuni nouă la Flora României (1889) 17. GRECESCU, Conspect. fl. României 356 și Supplement 100. *Podospermum laciniatum* L. sub *Scorzonera* apud SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 357. HALÁC Y, Conspect. Fl. Graec. II. 200. — Prin livezi umede, prin lunci în fânețe pe locuri sărate. Comana, prin fânețele umede de pe marginea râului Neajlov; Călugăreni, Crucea-de-piatră, pe marginea pădurii «Uzun» în locuri umede. ☉. Maiu — Iulie.

**Scorzonera hispanica** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 791 și ed. 2. (1763). 1112. DC. Prodr. VII. sectio. 1. pag. 120. KOCH, Syn. ed. 2. 488. LEDEB. fl. ross. II. 794. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 308. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 408. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XIX. 15. t. 33. BOISS. fl. orient. III. 767. FIEK, Fl. von Schlesien 250. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXX. 231. t. 3191. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 1326. COSTE, Fl. Franc. II. 424. KRAUSE în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. XIV. 92. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 789. ROUY, Fl. Franc. X. 12. NYMAN, Consp. 463. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 355. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 359. HOFFMANN, Compositae în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien IV. Teil. 5. Abteilung, pag. 366. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 312 și Flora Dobrogei 192. GRECESCU, Conspect. fl. României 355 și Supplement 99. — Pe coline ierboase expuse soarelui, prin rărișuri, poieni și pe marginea pădurilor în fânețe prin tufișuri, adesea. Mănăstirea Pasărea, prin poienile din pădurea «Pasărea»; Mănăstirea Căldărușani, pe marginea pădurii «Brânzeasca», nu tocmai frecvent. 4. Maiu—Iulie. Variază.

În regiunea noastră am aflat exemplare cu foile late, ovale sau elongat-lanceolate, la vârf lungacuminate.

*Scorzonera hispanica* L. se cultivă adesea ca plantă culinară pentru rădăcina sa comestibilă și este cunoscută sub numirea de: Salsifi, Scorzonera sau Salată-de-iarnă.

## BIBLIOGRAFIE

(Suplement).

---

- BECK, DR. GÜNTHER. — Inulae Europae. Die Europäischen Inula-Arten. Besonders abgedruckt aus dem XLIV. Bande d. Denkschr. der math. naturw. Classe der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Wien 1881.
- BOISSIER, ED. — Flora orientalis, sive enumeratio plantarum in oriente a Grecia et Aegypto ad Indiae fines hucusque observatarum. Vol. III. Genavae et Basileae 1875.
- CANDOLLE, AUG. PYR. DE. — Prodrômus Systematis naturalis regni vegetabilis, sive enumeratio contracta ordinum, generum specierumque plantarum hucusque cognitarum. Pars. V. Parisiis (1836). VI (1837). VII (1838). VIII (1844). IX (1845). X (1846). XI (1847). XII (1848).
- COSTE, L'ABBÉ H. — Flore descriptive et illustrée de la France, de la Corse et des contrées limitrophes. Tome II. Paris 1903. Tome III. Paris 1906.
- ENGELMANN, GEORG. — Generis Cuscutae species secundum ordinem systematicum dispositae. Berolini 1860.
- ENGLER und PRANTL. — Die natürlichen Pflanzenfamilien IV. Teil. Abteilung 1 și 2. Leipzig 1897. Abteilung 3. Leipzig 1897. Abteilung 4 și 5. Leipzig 1897.
- HALÁCSY, E. de. — Conspectus Florae Graecae. Volumen II. Lipsiae 1902 și volumen III. Lipsiae 1904.
- HALLIER, DR. ERNST. — Flora von Deutschland. 5-te Auflage. Band XVII· XVIII XIX. Gera-Untermhaus 1884. Band XXIX și XXX. Gera-Untermhaus 1887.
- HAYEK, DR. AUGUST von. — Die Centaurea-Arten Oesterreich-Ungarns. Besonders abgedruckt aus dem LXXII. Bande d. Denkschr. der math. naturw. Classe der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Wien 1901.
- KERNER, ANT. — Monographia Pulmonariarum. Oeniponte 1878.
- LUTZ, DR. K. G. — J. Sturms Flora von Deutschland in Abbildungen nach der Natur. Zweite, umgearbeitete Auflage von *Ernst H. L. Krause*, Stuttgart. Band X (1903). XI (1903). XIII (1905). XIV (1906).



- NAGELI, C. v. UND A. PETER. — Die Hieracien Mittel-Europas. Monographische Bearbeitung der Piloselloiden mit besonderer Berücksichtigung der mitteleuropäischen Sippen. München 1885.
- PANȚU, ZACH. C. — Contribuțiuni nouă la Flora Ceahlăului. București 1911.
- PAX, F. und R. KNUTH. — *Primulaceae* în ENGLER, Das Pflanzenreich, Heft 22. Leipzig 1905.
- REICHENBACH, LUD. — Icones florum germanicae et helveticae. Vol. XV (1853). XVI (1854). XVII (1855). XIX (1860) și XX. Lipsiae 1862.
- ROUY, G. — Flore de France ou description des plantes qui croissent spontanément en France, en Corse et en Alsace-Lorraine. Tome VIII (1903). IX (1905). X (1908) și XI. Paris 1909.
- SCHRADER, HENRIC ADOLPH. — Monographia generis Verbasci. Sectio I. Gottingae 1813. Sectio altera 1822 et Icones ad Schraderi Monograph. gen. Verbasci.

# INDICE ALFABETIC

DE

FAMILIILE ȘI GENURILE CUPRINSE ÎN PĂRȚILE I, II, III și IV.

- |                               |                                |                              |
|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| <i>Absinthium</i> IV. 126.    | ANTHEMIS IV. 116.              | BERULA III. 85.              |
| ABUTILON III 56.              | ANTHERICUM I. 64.              | <i>Betonica</i> IV. 43.      |
| ACER III. 51.                 | ANTHOXANTHUM I. 27.            | BETULACEAE III.              |
| ACERACEAE III. 51.            | ANTHRISCUS III. 79.            | BIDENS IV. 114.              |
| ACHILLEA IV. 118.             | APOCYNACEAE IV. 10.            | BORRAGINACEAE                |
| <i>Achyrophorus</i> IV. 148.  | ARACEAE I. 58.                 | BRACHYPODIUM I               |
| ADONIS II. 54.                | ARALIACEAE III. 76.            | BRASSICA II. 67.             |
| ADOXA IV. 95.                 | ARCTIUM IV. 133.               | BRIZA I. 40.                 |
| ADOXACEAE IV. 95.             | ARENARIA II. 29.               | BROMUS I. 43.                |
| AEGOPODIUM III. 83.           | ARISTOLOCHIA II. 14.           | BRUNELLA IV. 36              |
| AGRIMONIA II. 87.             | ARISTOLOCHIACEAE II. 13.       | BUNIAS II. 74.               |
| AGROSTEMMA II. 32.            | ARTEMISIA IV. 124.             | BUNLEURUM III. 8             |
| AGROSTIS I. 32.               | ARUM I. 58.                    | BUTOMACEAE I. 2              |
| AJUGA IV. 28.                 | ARUNDO I. 35.                  | BUTOMUS I. 24.               |
| ALDROVANDA II. 75.            | ASARUM II. 13.                 | *                            |
| <i>Alectorolophus</i> IV. 80. | ASCLEPIADACEAE IV. 11.         | CALAMAGROSTIS I              |
| ALISMA I. 23.                 | <i>Asclepias</i> IV. 11.       | CALAMINTHA IV. 4             |
| ALISMATACEAE I. 23.           | ASPARAGUS I. 76.               | <i>Calcitrapa</i> IV. 142    |
| ALLIARIA II. 66.              | ASPERUGO IV. 17.               | CALLITRICHACEAE              |
| ALLIUM I. 67.                 | ASPERULA IV. 85.               | CALLITRICHE III. 4           |
| ALNUS II. 6.                  | ASPIDIUM I. 9.                 | CALTHA II. 42.               |
| ALOPECURUS I. 31.             | ASPLENIUM I. 9.                | CALYSTEGIA IV. 11.           |
| ALTHAEA III. 57.              | ASTER IV. 105.                 | CAMELINA II. 71.             |
| ALYSSUM II. 68.               | <i>Asterocephalus</i> IV. 100. | CAMPANULA IV. 10             |
| AMARANTHACEAE II. 23.         | ASTRAGALUS III. 18.            | CAMPANULACEAE IV             |
| AMARANTHUS II. 23.            | ATRIPLEX II. 22.               | CAMPHOROSMA II. 8            |
| AMARYLLIDACEAE I. 79.         | AVENA I. 34.                   | CANNABIS II. 11.             |
| ANACARDIACEAE III. 48.        | *                              | CAPRIFOLIACEAE IV. 93.       |
| ANAGALLIS IV. 6.              | BALLOTA IV. 42.                | CAPESELLA II. 73.            |
| ANCHUSA IV. 18.               | <i>Barkhausia</i> IV. 145.     | CARDAMINE II. 62.            |
| ANDROPOGON I. 27.             | BECKMANNIA I. 30.              | <i>Carduncellus</i> IV. 143. |
| ANDROSACE IV. 4.              | BERBERIDACEAE II. 55.          | CARDUUS IV. 135.             |
| ANEMONE II. 45.               | BERBERIS II. 55.               | CAREX I. 51.                 |
| ANGELICA III. 87.             | BERTEROA II. 69.               | CARLINA IV. 132.             |

- CARPINUS II. 5.  
 CARPESMIUM IV. 114.  
 CARTHAMUS IV. 143.  
 CARYOPHYLLACEAE II. 25.  
 CATABROSA I. 41.  
 CAUCALIS III. 80.  
 CELASTRACEAE III. 49.  
 CENTAUREA IV. 139.  
 CEPHALANTHERA I. 89.  
 CEPHALARIA IV. 97.  
 CERASTIUM II. 27.  
 CERATOPHYLLACEAE II. 41  
 CERATOPHYLLUM II. 41.  
 CERINTHE IV. 26.  
 CHAEROPHYLLUM III. 78.  
*Chaiturus* IV. 42.  
*Chamaemelum* IV. 116.  
*Chamomilla* IV. 121.  
 CHELIDONIUM II. 55.  
 CHENOPODIACEAE II. 20.  
 CHENOPODIUM II. 20.  
 CHONDRILLA IV. 150.  
 CHORISPORA II. 59.  
 CHRYSANTHEMUM IV. 122.  
 CICHORIUM IV. 143.  
 CINERARIA IV. 128.  
 CIRCAEA III. 74.  
 CIRSIIUM IV. 136.  
 CLADIUM I. 50.  
 CLEMATIS II. 46.  
*Clinopodium* IV. 50.  
 COMANDRA II. 12.  
 COMPOSITAE IV. 104.  
 CONIUM III. 81.  
 CONVALLARIA I. 78.  
 CONVULVULACEAE IV. 11.  
 CONVULVULUS IV. 12.  
*Conyza* IV. 110.  
 CORNACEAE III. 91.  
 CORNUS III. 91.  
 CORONILLA III. 20.  
 CORONOPUS II. 74.  
*Corvisartia* IV. 109.  
 CORYDALIS II. 57.  
 CORYLUS II. 6.  
 COTINUS III. 48.  
 CRASSULACEAE II. 77.  
 CRATAEGUS II. 79.  
 CREPIS IV. 145.  
 CROCUS I. 80.  
 CRUCIFERAE II. 59.  
 CRYPISIS I. 31.  
 CUCUBALUS II. 36.  
 CUSCUTA IV. 13.  
*Cyanus* IV. 139.  
*Cynanchum* IV. 11.  
 CYNODON I. 30.  
 CYNOGLOSSUM IV. 15.  
 CYPERACEAE I. 47.  
 CYPERUS I. 47.  
 CYTISUS III. 3.  
 \*  
 DACTYLIS I. 37.  
 DATURA IV. 60.  
 DAUCUS III. 90.  
 DELPHINIUM II. 44.  
 DENTARIA II. 63.  
 DIANTUS II. 38.  
 DICTAMNUS III. 40.  
 DIGITALIS IV. 77.  
 DIOSCOREACEAE I. 80.  
 DIPSACACEAE IV. 97.  
 DIPSACUS IV. 98.  
 DORONICUM IV. 127.  
 DORYCNIUM III. 16.  
 DRABA II. 70.  
 DRACOCEPHAUM IV. 33.  
 DROSERACEAE II. 75.  
 \*  
*Ebulum* IV. 93.  
 ECHINOPS IV. 131.  
 ECHINOSPERMUM IV. 16.  
 ECHIUUM IV. 26.  
 ELATINACEAE III. 63.  
 ELATINE III. 63.  
 ELATINOIDES IV. 63.  
 EPILOBIUM III. 70.  
 EPIFACTIS I. 88.  
 EQUISETACEAE I. 11.  
 EQUISETUM I. 11.  
 ERAGROSTIS I. 37.  
 ERIGERON IV. 106.  
 ERODIUM III. 38.  
*Ervum* III. 29.  
 ERYNGIUM III. 77.  
 ERYSIMUM II. 67.  
 ERYTHRAEA IV. 8.  
 EUCLIDIUM II. 75.  
 EUPATORIUM IV. 104.  
 EUPHORBIA III. 42.  
 EUPHORBACEAE III. 42.  
*Euphrasia* IV. 79.  
 EVONYMUS III. 49.  
 \*  
 FAGACEAE II. 7.  
 FAGUS II. 7.  
 FALCARIA III. 83.  
*Farfara* IV. 127.  
 FERULAGO III. 87.  
 FESTUCA I. 42.  
 FILAGO IV. 108.  
 FRAGARIA II. 81.  
 FRAXINUS IV. 7.  
 FUMARIA II. 59.  
 \*  
 GAGEA I. 65.  
 GALANTHUS I. 79.  
 GALEGA III. 18.  
*Galeobdolon* IV. 39.  
 GALEOPSIS IV. 40.  
 GALINSOGA IV. 115.  
 GALIUM IV. 88.  
 GENISTA III. 3.  
 GENTIANA IV. 9.  
 GENTIANACEAE IV. 8.  
 GERANIACEAE III. 35.  
 GERANIUM III. 35.  
 GEUM II. 86.  
 GLADIOLUS I. 82.  
 GLAUCIUM II. 56.  
*Glechoma* IV. 35.  
 GLECOMA IV. 35.  
 GLYCERIA I. 41.  
 GLYCYRRHIZA III. 20.  
 GNAPHALUM IV. 109.  
 GRAMINEAE I. 26.  
 GRATIOLA IV. 66.  
 GUTTIFERAE III. 60.  
 GYPSOPHILA II. 37.  
 \*  
 HALORRHAGACEAE III. 75  
*Halorrhagidaceae* III. 75.  
 HEDERA III. 76.  
 HELEOCHARIS I. 50.

- HELIOTROPIUM IV. 15.  
 HERACLEUM III. 90.  
 HERNIARIA II. 30.  
 HESPERIS II. 64.  
 HIBISCUS III. 60.  
 HIERACIUM IV. 146.  
 HIMANTOGLOSSUM I. 86.  
 HIPPURIDACEAE III. 76.  
 HIPPURIS III. 76.  
 HOLOSTEUM II. 28.  
 HORDEUM I. 46.  
 HUMULUS II. 11.  
 HYDROCHARIS I. 26.  
 HYDROCHARITACEAE I. 24.  
 HYOSCYAMUS IV. 57.  
 HYPERICUM III. 60.  
 HYPOCHAERIS IV. 148.  
 \*  
 INULA IV. 109.  
 IRIDACEAE I. 80.  
 IRIS I. 81.  
 ISOPYRUM II. 43.  
 \*  
 JUNCACEAE I. 61.  
 JUNCUS I. 61.  
 JURINEA IV. 138.  
 \*  
 KNAUTIA IV. 99.  
 KOELERIA I. 36.  
 \*  
 LABIATAE IV. 28.  
 LACTUCA IV. 151.  
 LAMIUM IV. 37.  
*Lampsa* IV. 144.  
*Lappa* IV. 133.  
 LAPSANA IV. 144.  
 LATHRAEA IV. 82.  
 LATHYRUS III. 30.  
 LAVATERA III. 57.  
 LEGUMINOSAE III. 3.  
 LEMNA I. 59.  
 LEMNACEAE I. 59.  
 LENTIBULARIACEAE IV. 83.  
 LEONTODON IV. 149.  
 LEONURUS IV. 41.  
 LEPIDIUM II. 72.  
*Leucanthemum* IV. 122.  
 LEUCOÏUM I. 79.
- LIGUSTRUM IV. 7.  
 LILIACEAE I. 64.  
 LILIUM I. 70.  
 LIMNANTHEMUM IV. 10.  
 LIMODORUM I. 90.  
 LINACEAE III. 38.  
 LINARIA IV. 64.  
*Linosyris* IV. 106.  
 LINUM III. 38.  
 LISTERA I. 91.  
 LITHOSPERMUM IV. 24.  
 LILIUM I. 46.  
 LORANTHACEAE II. 13.  
 LOTUS III. 16.  
 LUZULA I. 64.  
 LYCHNIS II. 35.  
 LYCIUM IV. 56.  
 LYCOPUS IV. 52.  
 LYSIMACHIA IV. 4.  
 LYTHRACEAE III. 68.  
 LYTHRUM III. 68.  
 \*  
 MALVA III. 59.  
 MALVACEAE III. 56.  
 MARRUBIUM IV. 32.  
 MARSILIA I. 10.  
 MARSILIACEAE I. 10.  
*Maruta* IV. 118.  
 MATRICARIA IV. 121.  
 MEDICAGO III. 5.  
 MELAMPYRUM IV. 80.  
 MALANDRYUM II. 36.  
 MELICA I. 35.  
 MELILOTUS III. 7.  
 MELISSA IV. 48.  
 MENTHA IV. 53.  
 MENYANTHES IV. 9.  
 MERCURIALIS III. 42.  
 MILIUM I. 30.  
 MOEHRINGIA II. 29.  
 MORACEAE II. 11.  
*Moschatellina* IV. 95.  
 MUSCARI I. 75.  
*Mycelis* IV. 151.  
 MYOSOTIS IV. 21.  
 MYOSURUS II. 47.  
 MYRIOPHYLLUM III. 75.  
 \*
- NAJADACEAE I. 21.  
 NAJAS I. 21.  
 NASTURTIIUM II. 60.  
 NECTAROSCORDIUM I. 70.  
 NEOTTIA I. 92.  
 NEPETA IV. 34.  
 NIGELLA II. 43.  
 NONNEA IV. 20.  
 NUPHAR II. 40.  
 NYMPHAEA II. 40.  
 NYMPHAEACEAE II. 40.  
 \*  
 ODONTITES IV. 79.  
 OENANTHE III. 86.  
 OENOTHERA III. 73.  
 OENOTHERACEAE III. 70.  
 OLEACEAE IV. 7.  
*Onagra* III. 74.  
*Onagraceae* III. 70.  
 ONOBRYCHIS III. 21.  
 ONONIS III. 4.  
 ONOPORDON IV. 137.  
 OPHIOGLOSSACEAE I. 10.  
 OPHIOGLOSSUM I. 10.  
 ORCHIDACEAE I. 82.  
 ORCHIS I. 82.  
 ORIGANUM IV. 51.  
 ORLAYA III. 91.  
 ORNITHOGALUM I. 72.  
 OROBANCHACEAE IV. 82.  
 OROBANCHE IV. 82.  
*Orobis* III. 33.  
 ORYZA I. 26.  
 \*  
 PAEONIA II. 41.  
 PANICUM I. 28.  
 PAPAVER I. 56.  
 PAPAVERACEAE II. 55.  
 PARIETARIA II. 12.  
 PARIS I. 78.  
 PASTINACA III. 89.  
 PETASITES IV. 127.  
 PEUCEDANUM III. 88.  
*Phelipaea* IV. 82.  
 PHLEUM I. 32.  
 PHLOMIS IV. 37.  
 PHYSALIS IV. 57.  
 PHYTOLACCA II. 24.

- PHYTOLACCACEAE II. 24.  
 PICRIS IV. 144.  
 PIMPINELLA III. 84.  
 PIRUS II. 77.  
 PISUM III. 35.  
 PLANTAGINACEAE IV. 83.  
 PLANTAGO IV. 83.  
 PLATANThERA I. 86.  
 PLUMBAGINACEAE IV. 7.  
 POA I. 38.  
*Podospermum* IV. 157.  
 POLYCNEMUM II. 20.  
 POLYGALA III. 40.  
 POLYGALACEAE III. 40.  
 POLYGONACEAE II. 14.  
 POLYGONATUM I. 76.  
 POLYGONUM II. 16.  
 POLYPODIACEAE I. 9.  
 POPULUS II. 3.  
 PORTULACA II. 24.  
 PORTULACACEAE II. 24.  
 POTAMOGETON I. 16.  
 POTAMOGETONACEAE I. 16.  
 POTENTILLA II. 82.  
*Prenanthes* IV. 151.  
 PRIMULACEAE IV. 4.  
*Prunella* IV. 36.  
 PRUNUS II. 89.  
*Psyllium* IV. 85.  
*Pulegium* IV. 54.  
 PULICARIA IV. 112.  
 PULMONARIA IV. 20.  
*Pyrethrum* IV. 122.  
 \*  
 QUERCUS II. 7.  
 \*  
 RANUNCULACEAE II. 41.  
 RANUNCULUS II. 47.  
 RESEDA II. 75.  
 RESEDACEAE II. 75.  
 RHAMNACEAE III. 53.  
 RHAMNUS III. 53.  
 RHINANTHUS IV. 80.  
*Rhus* III. 48.  
 ROSA II. 87.  
 ROSACEAE II. 77.  
 RUBIACEAE IV. 85.  
 RUBUS II. 80.  
 RUMEX II. 14.  
 RUSCUS I. 76.  
 RUTACEAE III. 40.  
 \*  
 SAGITTARIA I. 23.  
 SALICACEAE II. 3.  
 SALIX II. 4.  
 SALVIA IV. 46.  
 SALVINIA I. 10.  
 SALVINIACEAE I. 10.  
 SAMBUCUS IV. 93.  
 SANGUISORBA II. 87.  
 SANICULA III. 78.  
 SANTALACEAE II. 12.  
 SAPONARIA II. 39.  
 SCABIOSA IV. 99.  
 SCILLA I. 71.  
 SCIRPUS I. 48.  
 SCLERANTHUS II. 31.  
 SCLEROCHLOA I. 38.  
 SCORZONERA IV. 157.  
 SCROPHULARIA IV. 65.  
 SCROPHULARIACEAE IV. 60.  
 SCUTELLARIA IV. 31.  
 SEDUM II. 77.  
 SENECIO IV. 128.  
 SERRATULA IV. 138.  
 SESSELI III. 85.  
 SIDERITIS IV. 33.  
 SILENE II. 32.  
 SINAPIS II. 68.  
 SISYMBRIUM II. 65.  
 SIUM III. 84.  
 SOLANACEAE IV. 56.  
 SOLANUM IV. 58.  
 SOLIDAGO IV. 105.  
 SONCHUS IV. 153.  
 SPARGANIACEAE I. 14.  
 SPARGANIUM I. 14.  
 SPERGULARIA II. 30.  
 SPIRODELA I. 60.  
 STACHYS IV. 43.  
 STAPHYLEA III. 50.  
 STAPHYLEACEAE III. 50.  
 STATICE IV. 7.  
 STELLARIA II. 25.  
 STENOPHRAGMA II. 66.  
 STIPA I. 30.  
*Stupa* I. 31.  
 SYMPHYTUM IV. 17.  
 \*  
 TAMUS I. 80.  
*Tanacetum* IV. 122.  
 TARAXACUM IV. 150.  
 TEUCRIUM IV. 30.  
 THALICTRUM II. 53.  
 THESIUM II. 13.  
 THLASPI II. 71.  
 THYMUS IV. 52.  
 TILIA III. 55.  
 TILIACEAE III. 55.  
 TORDYLIUM III. 90.  
 TORILIS III. 80.  
 TRAGOPOGON IV. 155.  
 TRAPA III. 70.  
 TRIBULUS III. 40.  
 TRIFOLIUM III. 8.  
 TRIGONELLA III. 5.  
*Tripolium* IV. 106.  
 TRITICUM I. 45.  
 TUNICA II. 37.  
 TURRITIS II. 61.  
 TUSSILAGO IV. 127.  
 TYPHA I. 13.  
 TYPHACEAE I. 13.  
 \*  
 ULMACEAE II. 9.  
 ULMARIA II. 86.  
 ULMUS II. 9.  
 UMBELLIFERAE III. 77.  
 URTICA II. 11.  
 URTICACEAE II. 11.  
 UTRICULARIA IV. 83.  
 \*  
 VACCARIA II. 37.  
 VALERIANA IV. 96.  
 VALERIANACEAE IV. 95.  
 VALERIANELLA IV. 95.  
 VALLISNERIA I. 24.  
 VERBASCUM IV. 60.  
 VERBENA IV. 28.

VERBENACEAE IV. 28.  
 VERONICA IV. 67.  
 VIBURNUM IV. 94.  
 VICIA III. 21.  
 VINCA IV. 10.  
 VINCETOXICUM IV. 11.  
 VIOLA III. 63.

VIOLACEAE III. 63.  
 VISCARIA II. 32.  
 VISCUM II. 13.  
 VITACEAE III. 54.  
 VITIS III. 54.

WOLFFIA I. 60.  
 \*  
 XANTHIUM IV. 113.  
 XERANTHEMUM IV. 131.  
 \*  
 ZANNICHELLIA I. 20.  
 ZYGOPHYLLACEAE III. 40.

**VERIFICAT**  
 1987

BIBLIOTECA  
 CENTRALA  
 UNIVERSITARA  
 BUCURESTI

**VERIFICAT**  
 2017

**VERIFICAT**  
 2007